







50369/B

Ex Bibliotheca Calvetiana.

Medicine Observations

1789

CHIRURGIE

ET

DES

LES MALADIES

VENÉRIENNES

OBSERVATIONS

PRATIQUES

SUR

LES MALADIES

VÉNÉRIENNES.

55450
OBSERVATIONS
PRATIQUES
SUR
LES MALADIES
VÉNÉRIENNES,

*Traduites de l'Anglois de M. SVÉDIAUR,
Docteur-en Médecine,*

Par M. GIBELIN, Docteur en Médecine, Membre
de la Société Médicale de Londres, &c.

*Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti, si non, his utere mecum.*

HORAT.



A P A R I S,

Chez CUCHET, Libraire, rue & hôtel
Serpente.

M. D C C. L X X V.

Avec Approbation & Privilege du Roi.





A M O N S I E U R
P O N T I E R,

Docteur en Médecine, Membre
du College de Chirurgie, Lieu-
tenant du Premier Chirurgien
du Roi, &c. à Aix en Pro-
vence.

M O N S I E U R,

*C'est à la reconnoissance & à
l'amitié, que j'ai fait hommage de*

mes productions précédentes ; je viens aux mêmes titres vous offrir un nouvel Ouvrage , dont personne n'est mieux en état que vous de reconnoître l'utilité.

Le nombre infini de victimes que vous avez arrachées à la mort , pendant le cours d'une longue & heureuse pratique dans toutes les branches de la Médecine ; l'estime & la confiance sans bornes de vos Concitoyens ; le cas que font de vous tous les Maîtres de l'Art ; vos talens & vos lumieres , qui vous ont procuré de si grands avantages : tels sont les justes sujets de louange sur

DÉDICATOIRE. vii

lesquels j'aimerois à insister, si je ne craignois de blesser votre modestie. Mais votre amitié pour moi m'autorise du moins à exposer ici les motifs de ma reconnoissance.

Vos soins, vraiment paternels, m'ont rendu jusqu'à trois fois une Épouse chérie, à qui la Nature a refusé la douceur d'être mere, en lui imposant les incommodités & les dangers de trois grossesses fâcheuses. Vous l'avez délivrée à chaque fois; & je vous dois sa vie. Vous m'accordez une nouvelle grace en me permettant de publier un

vii] ÉPITRE DÉDICATOIRE.

*bienfait dont il m'est impossible de
m'acquitter.*

*Je suis, avec une vénération &
un attachement sans bornes ,*

M O N S I E U R ,

Votre très-humble & très-
obéissant serviteur.

G I B E L I N , D. M.

Paris , Novembre 1784.



P R É F A C E

DU TRADUCTEUR.

L'OUVRAGE dont nous présentons la traduction au Public est le fruit des observations d'un Praticien des plus distingués. M. Svédiaur jouit de la plus grande considération à Londres; il a de la réputation à Paris même, où il a passé une partie de l'année dernière; nous savons qu'il est très-versé dans la Chymie; & le tableau qu'il a donné des diverses préparations de mercure qu'on peut employer dans les maladies vénériennes, en est une preuve suffisante. Aussi a-t-il apporté dans l'étude &

x P R É F A C E.

dans le traitement de ces maladies cet esprit d'observation, cette délicatesse de jugement, & cette fécondité en ressources, que les Médecins ne peuvent puiser que dans la culture des sciences naturelles.

L'objet que M. Svédiaur s'est proposé dans cette production n'a pas été de donner un traité élémentaire & complet sur ces maladies. Il a voulu seulement faire servir à l'instruction publique les observations qu'il a eu occasion de faire sur les affections vénériennes les plus *opiniâtres* & les plus *invétérées*, ainsi que l'annonce le titre de son livre dans l'original. Il a dû cependant dire un mot de

chacune des modifications moins graves par lesquelles cette maladie doit passer avant d'arriver à ses plus fâcheux périodes, & c'est ce qui nous a engagés à intituler simplement cet Ouvrage: *Observations sur les Maladies vénériennes.*

L'Auteur n'est pas de la même opinion que le célèbre Astruc touchant l'époque de la première invasion des maladies vénériennes en Europe. Mais comme il se fonde principalement sur des pièces découvertes par le Docteur Hensler, qui n'ont point encore été publiées, il nous permettra de nous en tenir toujours au sentiment d'Astruc, qui nous paroît jusqu'ici le plus probable.

xij *P R É F A C E.*

Ce n'est point par des raisonnemens & par des systêmes que M. Svédiaur s'est expliqué sur toutes les autres questions relatives au virus vénérien. Il n'y a répondu que d'après l'expérience & l'observation; & il est resté dans le doute toutes les fois qu'il n'a pu les résoudre par cette voie. C'est ainsi qu'il doute si le virus vénérien peut être absorbé dans le systême, sans avoir donné des signes extérieurs de sa présence; si ce virus affecte dans le corps quelque autre fluide que le mucus & la lymphe; & si l'enfant peut en être infecté avant sa naissance, ou à l'instant de sa conception, dans le ventre de la mere.

Enflammé du desir d'être utile à ses semblables , M. Svédiaur s'est permis quelques sorties contre la barbarie de certains Gouvernemens, qui refusent un asyle & les secours de l'Art aux Pauvres attaqués de la maladie vénérienne. Nous avons laissé subsister , dans notre traduction , ces invectives dictées par le zele le plus louable, parce que nous croyons qu'on ne sauroit trop répandre des idées propres à détruire les restes de rigorisme fanatique , qui subsistent encore dans certaines provinces de France ; & qui s'opposent au bonheur du genre humain, en arrêtant les progrès des sciences & de la philosophie.

La gonorrhée a été un des principaux objets des recherches de l'Auteur. Nous n'avons trouvé dans aucun de ceux qui l'ont précédé, rien de plus méthodique, de plus précis, & de plus clair que les notions qu'il présente sur cette maladie, si simple & si légère en apparence, & qui fait cependant tous les jours le désespoir des malades & l'opprobre de l'Art. Sa théorie sur la cause des gonorrhées, sur les différens déplacemens du siége des écoulemens gonorrhœïques, & sur les symptômes qui les accompagnent, est prouvée de la manière la plus évidente par ses observations, & par une expérience qui doit suffire pour assurer à M. Svédiaur le

rang le plus distingué parmi les vrais amis de l'humanité. Il n'a pas craint de se soumettre aux plus cruelles douleurs pour démontrer l'existence des gonorrhées produites par d'autres causes que le virus vénérien.

D'autres Praticiens avoient sans doute observé des écoulemens produits par le virus dartreux ; mais on n'avoit pas prouvé que la seule application d'un stimulus quelconque pouvoit procurer une gonorrhée. L'Auteur exige avec raison que ce stimulus soit de force suffisante, car on observe souvent que des substances capables de picotter jusqu'à un certain point le gland & les parties voisines , ne sont point

propres à produire cet effet (1).

M. Svédiaur s'élève contre l'opinion qui distingue le virus gonorrhœique du virus vénérien, & qui heureusement est bien loin de prévaloir en France; mais on ne sauroit trop défendre la vérité contre les attaques insidieuses de l'erreur. Il a cependant distingué d'une manière précise les gonorrhées capables de donner la vérole,

(1) Nous avons observé à plusieurs reprises, chez une femme irréprochable, un écoulement blanc, d'une nature si acrimonieuse, que toutes les fois que son mari l'approchoit dans cet état, il en éprouvoit une cuisson très-forte au gland & à l'intérieur du prépuce; de sorte qu'il ne faisoit point difficulté d'avouer que la peine surpassoit le plaisir, quoique celui-ci fût assaisonné par tout ce que l'amour réciproque peut avoir de plus délicat & de plus attrayant; & cependant jamais cet homme n'a éprouvé le moindre vestige d'écoulement gonorrhœique.

de celles qui n'en font jamais suivies; & l'on sent combien cette distinction est nécessaire dans la pratique. Enfin il a répandu le plus grand jour sur une matière qui, après avoir été l'objet des recherches de tous ceux qui ont écrit sur les maladies vénériennes, étoit néanmoins encore très-obscur.

Nous ne doutons point que les jeunes Praticiens ne lisent avec plaisir & avec fruit les instructions que donne M. Svédiaur sur la manière d'administrer les injections. Mais il a imaginé depuis, pour cet effet, un petit instrument composé d'une bouteille de gomme élastique, à laquelle s'adaptent diverses petites canules d'ivoire propre

xviii *P R É F A C E.*

tionnées au diametre & à la forme de l'orifice de l'uretre. Cette espece de feringue a l'avantage sur les autres, de pouvoir être facilement ménagée d'une seule main par le malade, pendant qu'il tient sa verge de l'autre (1). M. Svédiaur en a fait faire aussi de la même matiere, pour les femmes; & ces nouvelles feringues remplissent bien mieux les vues qu'on se propose dans les injections, que toutes celles dont on s'est servi jusqu'à présent, & qui n'ont presque fait

(1) Nous avons eu l'occasion de voir un de ces instrumens chez un Savant distingué (M. Faujas de Saint-Fond), qui ne néglige aucun moyen de se rendre utile à ses concitoyens. Il a fait venir de Londres une de ces feringues, pour servir de modele à un Artiste, qui les exécute maintenant à Paris dans la dernière perfection.

que décréditer un genre de secours auquel les Praticiens auroient cependant grand tort de renoncer.

La tumeur des testicules est, comme on fait, un des accidens qui accompagnent le plus fréquemment les gonorrhées. L'Auteur prouve d'une manière évidente que ces tumeurs sont communément sympathiques, & que la matière de la gonorrhée n'a pas besoin pour les produire de se porter, comme on l'avoit cru jusqu'à lui, dans le scrotum. Il suffit qu'elle s'arrête aux orifices des canaux excrétoires de la semence, pour occasionner, par l'irritation qu'elle y cause, cette tuméfaction. On la dissipe en effet en appliquant à la

verge , & non pas au scrotum même , des médicamens propres à calmer l'irritation , & à faire reprendre au virus le siege qu'il occupoit auparavant. L'Auteur a éprouvé dans ce cas les meilleurs effets de l'usage de l'opium ; & l'on n'en fera point étonné , si l'on fait attention combien l'opium est efficace dans les affections sympathiques.

M. Svédiaur a éprouvé & a recommandé avec sa franchise ordinaire , l'inoculation du virus vénérien dans l'uretre , lorsque tous les autres moyens de rétablir une gonorrhée supprimée n'ont eu aucun succès. Les Praticiens ont vu quelquefois des dysuries vénériennes , qui n'ont pu être guéries qu'au

moyen d'une nouvelle gonorrhée, que les malades ont prise après avoir essuyé un traitement aussi ennuyeux qu'inutile. Mais je ne sache pas qu'on eût essayé, avant l'Auteur, d'introduire exprès une parcelle de nouveau virus vénérien dans la fosse naviculaire, pour rappeler dans cet endroit l'ancien virus, dont le déplacement avoit produit les symptômes fâcheux qui suivent ordinairement la répercussion ou la suppression des gonorrhées.

On suivra certainement avec plaisir M. Svédiaur dans les détails de sa théorie des translations du virus vénérien dans toute la longueur de l'uretre jusqu'au

xxij *P R É F A C E.*

col de la vessie ; & l'on verra qu'il en a prouvé la vérité par les succès de la méthode curative qu'elle lui a suggérée.

Le virus vénérien immédiatement appliqué , par les approches d'une personne infectée , aux parties qui ne sont point couvertes de l'épiderme , produit ou des ulcères ou des gonorrhées , suivant la quantité de mucus qui peut naturellement aborder dans ces parties ; mais il arrive quelquefois que l'épiderme ne défend pas suffisamment des atteintes du virus les parties qu'elle recouvre. Aussi a-t-on vu des Chirurgiens & des Sages-Femmes recevoir l'infection vénérienne à travers les tégumens ,

P R É F A C E. xxiiij

& se trouver attaqués d'ulceres vénériens aux mains ou aux bras, sans qu'il y ait eu auparavant aucune solution de continuité. L'Auteur observe que dans ces cas la maladie est infiniment plus grave que dans les cas ordinaires; & c'est probablement parce que le virus a dû se trouver alors dans un état de concentration extraordinaire, qui l'a mis en état d'entamer la peau (1).

(1) On a eu à Paris en dernier lieu l'exemple d'une femme qui ayant été chargée pendant un certain tems du soin d'un enfant vérolé, dont l'urine perçoit quelquefois les langes, & atteignoit jusqu'au bras sur lequel elle le portoit, fut attaquée d'un ulcere vénérien des plus formidables dans cette partie. On le méconnut d'abord; mais les symptomes qui se déclarerent bientôt aux parties génitales, ne laisserent aucun doute sur sa nature. C'est, pour le dire en passant, sur cette femme qu'on a fait l'essai de la *saponaire* pour le traitement

M. Svédiaur a examiné au flambeau de l'observation la nature des différens bubons vénériens. Il a prouvé par des raisons puisées dans l'Anatomie la plus fine, combien l'on est dans l'erreur lorsqu'on prétend les guérir ou les soulager par des frictions mercurielles faites sur le bubon même. Il a cherché à détruire encore un préjugé qui regne assez généralement à ce sujet: bien des gens croient qu'il est toujours plus avantageux de faire suppurer les bubons vénériens que de les résoudre. M. Svédiaur prouve le contraire par le raisonnement & par l'expérience.

de la maladie vénérienne. Je dois laisser aux personnes de l'Art qui ont fait cette expérience, le soin d'en publier les résultats.

Enfin après avoir donné un grand nombre d'observations intéressantes & de préceptes utiles, sur la nature & sur le traitement des affections vénériennes particulières, l'Auteur passe à l'examen de la vérole proprement dite, qui en est le complément, & qui les renferme toutes. Il est d'opinion, avec tous les meilleurs Praticiens de l'Europe, que le mercure est le vrai spécifique pour cette maladie, de même que le quinquina l'est pour les fièvres intermittentes. Quant à la manière d'agir de cette substance métallique, M. Svédiaur n'est point d'accord avec les différens Auteurs qui ont expliqué son action, les uns par sa pesanteur

xxvj *P R É F A C E.*

spécifique, les autres par sa qualité astringente, &c. Il pense que la chymie fournit une explication plus satisfaisante, qu'il ne propose néanmoins que comme une hypothèse plausible, qui n'est point démontrée par les faits. Il est donc porté à supposer que le mercure s'unit avec le virus vénérien, à la manière des sels de nature opposée, par une affinité chymique, ou attraction élective, qui réunissant ces deux substances, en forme un nouveau composé neutre auquel il ne reste aucune des propriétés qu'elles avoient auparavant. Tous les phénomènes que présente l'application du mercure dans ces maladies, s'expliquent avec la plus grande faci-

lité dans cette hypothese ; malgré cela , M. Svédiaur ne fait point difficulté d'avouer, que son opinion n'est qu'une conjecture qui n'est pas mieux démontrée que les autres.

Les Amateurs de la Chymie verront avec plaisir le tableau que l'Auteur a dressé de toutes les préparations mercurielles qu'on a imaginées & proposées jusqu'à ce jour pour le traitement des maladies vénériennes , ainsi que l'examen analytique qu'il donne de leurs vertus respectives. Nous sommes éloignés de croire qu'il ait tout dit, & qu'il n'y ait plus rien à faire sur ce sujet ; mais nous pensons avec M. Svédiaur , que le grand point de la difficulté dans le traitement

xxviiij *P R É F A C E.*

de ces maladies gît moins dans la connoissance d'un remede plus efficace , que dans celle de la nature de la maladie & de ses nombreuses modifications.

Parmi les différentes manieres d'administrer le mercure, la méthode des frictions est celle que l'Auteur préfère. Il exige la plus grande attention dans le choix du mercure , qui est sujet à être sophistiqué dans le commerce , & que tout Praticien doit ou purifier ou revivifier lui-même du cinabre.

Il s'éleve fortement contre la *salivation*, & donne d'excellentes raisons contre cette pratique, qui heureusement a depuis quelque

tems fait place, en France, à la méthode plus douce & plus sûre de l'*extinction*. Mais nous croyons néanmoins que les raisons qu'il oppose à une pratique abandonnée, pourront encore être utiles, en aidant à faire revenir de leur préjugé les Praticiens qui peuvent encore tenir à l'ancienne méthode.

En recherchant les différentes causes qui empêchent certaines affections vénériennes de céder au mercure, M. Svédiaur s'est assuré qu'il faut le plus souvent s'en prendre à l'impureté du mercure, ou au mauvais choix de sa préparation, ou à la manière dont il a été administré. Aussi lui est-il arrivé quelquefois de guérir avec de

xxx *P R É F A C E.*

nouveau mercure , des affections vénériennes invétérées , que les malades attribuoient à l'énorme quantité qu'ils en avoient déjà prise ; au lieu que ce minéral n'avoit fait , pour ainsi-dire , que passer dans leur corps , ou n'y avoit causé que du trouble sans toucher à la cause réelle de leur maladie.

Après avoir dit un mot de quelques remèdes végétaux qu'on a cru pouvoir substituer au mercure , l'Auteur s'occupe des différentes espèces de maladies vénériennes secondaires qui exigent un traitement particulier ; & il insiste surtout sur ces affections , qui étant dégénérées de leur nature primitive ont pris un caractère qui pa-

roît répugner à l'usage du mercure. Ce remede, bien loin de les guérir, semble leur être aussi contraire qu'il l'est à celles qui sont évidemment dues à l'usage imprudent qu'on a fait de ce minéral. L'Auteur a trouvé que dans la plupart de ces cas, les remedes toniques & fortifiants sont les mieux indiqués & les plus efficaces.

M. Svédiaur termine son Ouvrage par des observations sur les maladies vénériennes déguisées, & sur celles qui paroissent ou qui sont vraiment incurables par le mercure. Nous croyons que les Praticiens applaudiront à sa maniere d'envisager ces affections, & qu'ils approuveront les différens

xxxij *P R É F A C E.*

moyens curatifs qu'il propose pour les guérir.

Nous avons suivi jusqu'ici l'Auteur presque pas à pas ; mais nous sommes bien éloignés de nous flatter d'avoir donné une idée suffisante de son excellent Ouvrage. Notre tâche sera remplie , si le précis qu'on vient de lire fait désirer aux gens de l'Art de le mieux connoître ; & si l'on trouve , comme nous avons lieu de l'espérer , que notre traduction est exacte , & qu'elle est écrite avec la clarté qu'exigent les productions de ce genre.



AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

DE L'AUTEUR (1).

L'AUTEUR de cet Ouvrage a eu soin d'examiner tout ce qu'on a écrit sur les maladies vénériennes depuis Astruc jusqu'à ce jour; & il se flatte que les observations qu'il donne au Public ne paroîtront pas superflues aux personnes qui sont le mieux instruites sur cette matiere.

Si quelques - uns des Lecteurs étoient étonnés de certaines méthodes pratiques qui sont recommandées dans cet Ouvrage, l'Auteur les prie de vouloir bien, avant

(1) Le vrai nom de l'Auteur est *Schwediaver*, mais il nous a priés lui-même de l'écrire en François *Svédiar*, pour en rendre la prononciation plus facile.

xxxiv *Avertissement de l'Auteur.*

de le condamner, prendre la peine de les éprouver de bonne foi; & s'ils découvrent qu'elles soient erronées, de publier, comme il l'a fait, un détail pur & simple de leurs expériences, sans se prévaloir de théories qui ne soient pas fondées sur des faits, ou de conjectures plausibles qui n'aient pas été confirmées par des observations & des expériences répétées. Tout homme qui fait des découvertes tendantes à soulager l'humanité souffrante est obligé, par ce qu'il doit à la Société, de leur donner toute la publicité possible. Telle a été de tous les tems la façon de penser de l'Auteur; & tel est le motif qui l'a déterminé à publier ses Observations.

T A B L E

D E S C H A P I T R E S.

CHAP. I. <i>Observations sur la contagion vénérienne, & sur les différentes apparences des maladies syphilitiques en général.</i>	Page 1
CHAP. II. <i>De la Gonorrhée virulente.</i>	25
CHAP. III. <i>Des Gonorrhées habituelles.</i>	69
TABLEAU NOSOLOGIQUE, &c.	92
CHAP. IV. <i>De la Tumeur vénérienne des testicules.</i>	95
CHAP. V. <i>De l'inflammation & de l'induration de la glande prostrate.</i>	113
CHAP. VI. <i>De l'Ischurie vénérienne & des rétrécissemens de l'uretre.</i>	115
CHAP. VII. <i>Des Ulceres vénériens.</i>	138
<i>Des Fistules vénériennes.</i>	163
CHAP. VIII. <i>Du Phymosis.</i>	165
CHAP. IX. <i>Du Paraphymosis.</i>	169
CHAP. X. <i>Des Bubons vénériens.</i>	172
CHAP. XI. <i>Du Syphilis, ou de la Maladie vénérienne, ou Vérole proprement dite.</i>	208

CHAP. XII. *Des Préparations mercurielles en général.* 229

TABLEAU *des Préparations mercurielles, &c.* Ibid.

CHAP. XIII. *Des Préparations mercurielles en particulier.* 243

I. *Des Frictions mercurielles.* Ibid.

Remarques sur la sophistication & sur la purification du mercure. 245

II. *Des Fumigations mercurielles.* 261

III. *Des Préparations mercurielles salines & autres.* 262

IV. *De la Salivation.* 285

CHAP. XIV. *Pourquoi certaines affections vénériennes ne cedent pas au mercure.* 295

CHAP. XV. *Des autres remedes qu'on a recommandés pour la guérison de la vérole.* 307

CHAP. XVI. *De certaines affections vénériennes qui exigent un traitement particulier.* 313

I. *De l'Ohpthalmie vénérienne.* Ibid.

II. *De la surdité vénérienne.* 318

III. *Des Maux de gorge vénériens.* 319

IV. *Des Affections vénériennes de la peau.* 325

DES CHAPITRES. xxxvij

V. <i>Des Excroissances vénériennes.</i>	326
VI. <i>De la Foiblesse ou impuissance vénérienne.</i>	329
VII. <i>Des Douleurs vénériennes , des Spasmes vénériens , &c.</i>	330
VIII. <i>Des Affections vénériennes des os.</i>	333
CHAP. XVII. <i>Des Maladies vénériennes déguisées , telles que phthysies , rhumatismes , fievres , &c.</i>	336
CHAP. XVIII. <i>Des Affections vénériennes incurables par le mercure.</i>	339
CHAP. XIX. <i>Observations sur quelques préjugés fâcheux ou nuisibles , qui sont généralement répandus au sujet de la maladie vénérienne.</i>	345

Fin de la Table des Chapitres:

A P P R O B A T I O N.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux un Ouvrage de M. Svédiaur, ayant pour titre : *Observations pratiques sur les Maladies vénériennes*, traduit de l'Anglois par M. Gibelin, Docteur en Médecine, & je crois qu'il mérite l'impression. A Paris, ce 26 Octobre 1784. DE GARDANNE.

P R I V I L É G E D U R O I.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra ; **SALUT.** Notre amé le sieur * * *, Docteur en Médecine, & Membre de la Société Médicale de Londres, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public *les Observations pratiques sur les Maladies vénériennes*, traduites de l'Anglois de M. Svédiaur, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. **A CES CAUSES**, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouisse de l'effet du présent Privilége, pour lui & ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à personne ; & si cependant il jugeoit à propos d'en faire une cession,

L'Acte qui la contiendra sera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de la cession; & alors par le fait seul de la cession enregistrée, la durée du présent Privilège sera réduite à celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, si l'Exposant décède avant l'expiration desdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du trente Août 1777, portant Règlement sur la durée des Privilèges en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de celui qui le représentera, à peine de saisie & de confiscation des Exemplaires contrefaits, de six mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier, & beau caractère, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilège: qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approba-

tion y aura été donnée , ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France , le sieur HUE DE MIROMÉNIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France , le sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit sieur HUE DE MIROMÉNIL, le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant , & fes hoirs , pleinement & paisiblement , fans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes , qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , soit tenue pour dûement signifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers- Secrétaires , foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent sur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles , tous actes requis & nécessaires , fans demander autre permission , & nonobstant clameur de haro , charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris le quinzieme jour du mois de Décembre , l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-quatre , & de notre regne le onzieme. Par le Roi , en son Conseil.

Signé LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , n°. 3344 , fol. 223 , conformément aux dispositions énoncées dans le présent Privilège ; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires prescrits par l'article CVIII du Règlement de 1723. A Paris , le 24 Décembre 1784.

Signé FOURNIER, Adjoint.

OBSERVATIONS



OBSERVATIONS PRATIQUES

S U R

LES MALADIES VÉNÉRIENNES.

Ad rectè medendum omninò opus est, ut remedia non solùm generi, sed speciei cuique, & sæpè etiam varietatibus quibusdam, apprimè sint accommodata.

CULLEN, *Synop. nosol. method.*

CHAPITRE PREMIER.

*Observations sur la contagion vénérienne
& sur les différentes apparences des ma-
ladies syphilitiques en général.*

Nous disons qu'une personne est vérolée, attaquée ou infectée de la maladie vénérienne, ou du *syphilis* (1), lorsque le poison, ou virus vénérien, a été reçu dans

(1) On ne fait pas si le nom de *syphilis* est dérivé de *pus porcus*, & *φιλία* amor : comme qui diroit *amor porcinus* ; ou s'il a quelqu'autre étymologie.

2 OBSERVATIONS PRATIQUES

le système animal, & qu'il y produit ses effets particuliers. Ces effets, ou symptômes, sont des ulcères dans la bouche, dans la gorge, & sur la peau, des éruptions cutanées, des dartres, des douleurs dans les os, des exostoses, &c. Mais tant que les effets du virus sont bornés aux parties génitales, on ne nomme point cette maladie *syphilis*, *lues venerea*, ou *vérole* proprement dite. On la distingue alors par quelque nom particulier, relativement à ses différentes apparences : comme gonorrhée, chancre, bubon.

On ne connoît pas mieux la nature du virus vénérien que celle du virus de la petite vérole, ou de toute autre maladie contagieuse. On fait seulement qu'il produit tels ou tels effets qui cedent à une méthode particulière de traitement. Lorsque ce virus a été appliqué au corps humain, il lui faut, comme aux autres contagions, un certain intervalle de tems pour produire cette *fermentation*, si je puis me servir de ce terme, qui détermine la maladie. On ne fait pas si ce virus a différens degrés d'acrimonie & de volatilité, ou s'il est toujours de la même nature ; & s'il ne varie que relativement à

la partie à laquelle il est appliqué , ou suivant les différentes constitutions , ou selon l'*idiosyncrasie* particuliere du sujet qui en reçoit l'impression. Nous savons que le mercure est doué de la faculté certaine & spécifique de détruire le virus vénérien ; mais nous ignorons entierement s'il agit par ses qualités sedative , astringente , ou évacuante ; ou si son action ne seroit pas plutôt une espece d'affinité chymique , ou attraction élective , par laquelle ces deux substances (le mercure & le virus vénérien) en s'unissant ensemble , se changent en une troisieme , qui n'est plus nuisible , & qui a de nouvelles propriétés entierement différentes de celles des deux premieres.

La contagion de la petite vérole produit ses effets , comme on fait , environ vingt ou vingt-quatre jours après que le corps a reçu l'infection de l'atmosphère , & au bout de huit ou dix jours , si on l'a reçue par le moyen de l'inoculation. Mais quant au virus vénérien , nous sommes moins certains de l'époque à laquelle il manifeste sa présence. Il lui faut quelquefois , & peut-être dans certaines personnes , un tems plus long pour produire ses effets , que dans d'autres occa-

4 OBSERVATIONS PRATIQUES

sions ou chez d'autres sujets. J'ai vu paroître des chancres au bout de douze heures, & même plutôt, & je puis dire sans mentir, peu de minutes après une jouissance impure; tandis que dans d'autres cas, ils ne commenceront à se manifester qu'au bout de tout autant de jours. La plupart des hommes éprouvent les premiers symptômes d'une gonorrhée, le second, le troisième, ou le cinquième jour après s'être exposés à la prendre. Mais il est des cas où on ne les observe qu'après autant de semaines ou de mois.

Je fus consulté, il y a environ dix ans, par un homme attaqué d'une violente gonorrhée ou d'un écoulement par le gland, accompagné d'un phymosis, mais sans aucun chancre, qui ne s'étoit manifestée que quatre semaines après l'infection; quoique pendant tout cet intervalle, il n'eût pas éprouvé le moindre symptôme de cette maladie.

Il y a quelques années qu'un jeune homme partit pour les Indes orientales avec l'apparence de la bonne santé; mais à son arrivée dans ces climats brûlans, après un voyage de quatre mois, il fut

attaqué , avant de mettre pied à terre , d'une violente gonorrhée , quoiqu'il n'eût pu recevoir d'infection pendant le voyage , n'y ayant point de femme dans le vaisseau.

On ne fait pas davantage pendant combien de tems le virus vénérien , même après avoir été absorbé dans la masse générale des humeurs , peut rester caché dans le corps , avant de produire des effets sensibles. Il n'est aucun praticien qui n'ait observé des cas où le virus soit demeuré dans le corps , pendant plusieurs semaines , ou même plusieurs mois , sans causer aucun mal. J'ai eu l'occasion d'observer un cas dans lequel après avoir été comme assoupi pendant six mois , il se manifesta par des symptomes non équivoques. Mais l'exemple qui suit est encore plus extraordinaire.

Je fus consulté , il y a quelques années par un particulier , pour un mal de gorge , que je déclarai de nature vénérienne. Mon malade fut tout étonné , & m'assura que depuis neuf ans il n'avoit pas éprouvé le moindre symptome de mal vénérien , & qu'il n'avoit aucun lieu de croire qu'il eût été infecté depuis ; mais qu'à cette époque se trouvant dans les Indes orientales , il y avoit essuyé une

6 OBSERVATIONS PRATIQUES

gonorrhée virulente ; qu'à son retour en Europe il s'étoit marié & avoit toujours été parfaitement exempt de maladie de cette espèce. Cependant, au moyen d'un traitement mercuriel , l'incommodité pour laquelle il s'étoit adressé à moi se trouva complètement guérie.

Dans certaines personnes le virus vénérien attaque plus particulièrement la gorge, où il produit des ulcères ; tandis que chez d'autres il exerce sa virulence sur la peau ou sur les os. Mais quoique la plupart des hommes soient très-aisément affectés de manière ou d'autre par ce redoutable poison , il est cependant quelques êtres privilégiés , qui semblent n'être absolument point susceptibles de cette contagion , & qui s'exposent à tous les dangers, sans y succomber au moindre degré. De même que certaines personnes ne peuvent être attaquées de la *petite vérole*, quoique bien loin de fuir les lieux qui en sont empestés, elles s'exposent à toutes les occasions dans lesquelles on ne manque presque jamais de prendre cette maladie. Il est des personnes plus sujettes à être infectées que d'autres qui ont en apparence la même constitution ; &

celles qui ont une fois été infectées du virus vénérien , sont plus susceptibles de recevoir une seconde fois la même contagion , que celles qui n'ont jamais pris cette maladie. On observe la même différence dans les progrès que fait le mal après la communication du virus. Dans les uns , sa marche est lente , & il paroît à peine faire quelques progrès : tandis que dans d'autres il avance avec la plus grande rapidité , & produit bientôt ses plus terribles symptômes.

Je ne prétends point décider la grande question de l'époque à laquelle les hommes ont éprouvé pour la première fois cette redoutable maladie , dont la seule idée empoisonne la source du bonheur. On est incertain même sur le tems de sa première apparition en Europe , & l'on ne fait pas mieux de quel endroit elle y a vraiment été apportée. Tout ce qu'on peut se hasarder d'affirmer , c'est que nous n'avons aucune preuve authentique qu'elle ait existé parmi les anciens Grecs & Romains ; quoiqu'il soit hors de doute qu'ils étoient aussi licentieux qu'a pu l'être leur postérité , soit dans les siècles de barbarie , soit depuis la renaissance des lettres. Les anciens Auteurs font

8 OBSERVATIONS PRATIQUES

mention de quelques maladies, qui sembleroient faire remonter l'existence de la maladie vénérienne jusques dans l'antiquité la plus reculée. Telles sont peut-être l'*écoulement* dont il est parlé dans le livre du Lévitique, la maladie de Job, & celle qui est rapportée dans les psaumes de David ; *les ulceres rongeurs du prépuce & du gland, l'écoulement de matiere claire & sanieuse par la verge, la mortification & le cancer de la verge, l'ulcere phagédénique de la même partie, les poireaux du prépuce & du gland, les condylomes à l'anüs, les tumeurs des testicules produites sans contusion extérieure*, qui sont autant d'accidens dont Celse (1) fait mention, comme de maladies obstinées & que le cautere actuel étoit presque seul capable de guérir. Mais étoient-ce là des modifications de notre maladie syphilitique moderne, ou des affections d'une nature absolument différente ? C'est ce que je ne saurois déterminer.

Cependant les raisons qu'apporte le Docteur Sanchez dans sa Dissertation *sur l'origine de la maladie vénérienne*, & dans son

(1) L. VI, Cap. XVIII. de *obscenarum partium vitiis*.

Examen historique sur l'apparition de la maladie vénérienne en Europe, rendent probable que la maladie vénérienne existoit réellement en Europe avant que Colomb fût de retour de son premier voyage aux isles Caraïbes en 1493 ; & je suis confirmé dans cette opinion, quoiqu'elle soit contraire au sentiment d'Astruc, par l'article quatrième des statuts manuscrits du lieu public de débauche d'Avignon, qui ont été faits en 1347 par la Reine Jeanne I. Après d'autres réglemens, la loi s'exprime ainsi : « la Reine veut que tous les samedis » la Baillive & un Chirurgien préposé par » les Consuls, visitent chaque courtisane ; » & s'il s'en trouve quelqu'une qui ait contracté du mal provenant de paillardise, » qu'elle soit séparée des autres, pour demeurer à part, afin qu'elle ne puisse point » s'abandonner, & qu'on évite le mal que la jeunesse pourroit prendre ». Voyez Astruc, *Traité des maladies vénériennes*, 3^e Edition, Tom. I. p. 207 & 208. Mais nous saurons bientôt à quoi nous en tenir sur ce sujet, au moyen des éclaircissemens que nous promet le savant & ingénieux Docteur Hensler, d'après d'anciens manuf-

crits authentiques , dont il a fait la découverte.

C'est une question de savoir si le virus vénérien peut être absorbé dans le système , sans que cette absorption soit précédée d'aucune affection des parties génitales ou de quelqu'autre partie extérieure du corps ; & j'avoue que je suis encore dans le doute à ce sujet , quoique j'aie examiné pendant quinze ans , dans la vue de décider cette question , tous les cas qu'il m'a été possible d'observer. Je n'ai pas encore rencontré un fait bien constaté , qui ait pu me faire adopter l'affirmative. Je n'ai jamais vu une seule personne , ayant cette maladie *pour la première fois* , chez qui elle n'ait été précédée ou d'un écoulement , ou d'un ulcère vénérien dans quelque partie du corps , & surtout aux parties de la génération ; quoiqu'à la vérité dans plusieurs de ces cas , le malade se fût regardé comme radicalement guéri de ces affections extérieures long-tems auparavant. J'ai découvert par fois , au moyen d'un examen très-exact , de très-petits ulcères vénériens , dont le malade lui-même ignoroit l'existence. Dans d'autres cas , où les malades assuroient qu'ils s'étoient trou-

vés infectés sans avoir éprouvé dans le principe aucune maladie extérieure, lorsque je les ai questionnés d'une manière pressante, ils ont avoué qu'ils avoient eu, ou des chancres, ou des ulcères d'une nature douteuse, aux cuisses, au scrotum, &c. ou même qu'ils avoient eu la vérole, une, deux, ou plusieurs années auparavant ; mais qu'ils s'étoient long-tems regardés comme complètement & radicalement guéris. J'ai oui dire, il est vrai, à des Médecins du premier mérite, qu'il paroît quelquefois des bubons vénériens qui ne sont précédés d'aucun écoulement ni d'aucun ulcère. Mais comme aucun cas pareil ne s'est présenté à moi, je dois demeurer encore dans l'incertitude à cet égard.

Il est jusqu'à des Ecrivains modernes qui assurent qu'on peut prendre cette maladie en couchant dans le même lit avec ou après une personne qui en est infectée. Mais les expériences & les observations les plus attentives que j'aie été capable de faire sur ce sujet ne m'ont jamais mis dans le cas de vérifier cette assertion. Nous ne voyons jamais les Garde-malades s'infecter dans l'hôpital des Vénériens, où elles sont nuit &

jour avec des personnes qui passent par tous les périodes de la maladie. Le fait est, à ce qu'il paroît, que les malades sont disposés à se tromper là-dessus, ou du moins à en imposer aux Médecins & aux Chirurgiens ; & l'opinion que je discute s'accrédite facilement chez le vulgaire, sur-tout dans les pays où la superstition regne davantage, & où les hommes sont plus soumis aux influences de la servitude & des autres circonstances de la vie. De-là viennent ces ridicules récits que nous font les Soldats & les Moines, sur la maniere dont ils ont été infectés de cette maladie.

Une autre question que je suis aussi peu en état de décider, c'est de savoir si le virus vénérien infecte quelqu'autre fluide du corps que le système muqueux & lymphatique. Je doute d'après cela, si le virus vénérien dans une femme, infecte jamais son lait ; & par conséquent si l'infection peut se communiquer à l'enfant par le lait seul, sans qu'il y ait aucun ulcere aux mamelons ou dans leur voisinage. C'est également une chose incertaine pour moi : savoir, si la maladie vénérienne passe jamais d'un pere ou d'une mere infectés, au fœtus dans l'acte de

sa génération, en supposant que leurs parties génitales soient saines; ou si un enfant est toujours infecté dans le ventre d'une mere vérolée. Les enfans infectés qui se sont présentés, tant à mon observation qu'à celle de quelques-uns de mes amis, à qui la pratique fournit fréquemment l'occasion de voir des enfans nouveaux nés, sembleroient fournir des preuves pour la négative. Ni moi ni mes amis n'avons pu parvenir à observer des ulcères de nature vénérienne sur les enfans à l'instant de leur naissance; & l'on peut supposer avec assez de probabilité que ceux qui paroissent au bout de quatre, six, huit jours, ou plus, aux parties génitales, à l'anus, aux levres, dans la bouche, &c. de ces enfans, ainsi que les écoulemens gonorrhœïques qui quelquefois leur arrivent, proviennent de l'infection que leur ont communiqué, dans leur passage par le vagin de la mere, les ulcères qu'elle avoit en cette partie; car la peau de l'enfant est alors à-peu-près aussi tendre que les parties, qui dans les adultes ne sont pas couvertes de l'épiderme; & c'est peut-être le seul cas où l'absorption du virus vénérien puisse avoir lieu, sans qu'il y ait d'ulcère ou d'excoriation à la peau.

Ainsi donc toutes les voies par lesquelles le virus vénérien peut se communiquer d'une personne infectée à une personne saine, se réduisent à celles qui suivent.

1°. La plus fréquente est la copulation d'une personne saine avec une personne qui est affectée ou d'une gonorrhée vénérienne, ou d'ulceres vénériens aux parties génitales.

2°. La copulation d'une personne saine avec une personne saine en apparence, mais dont les parties génitales recellent le virus, sans qu'il ait encore produit aucun mauvais symptôme. Ainsi une femme qui a reçu l'infection d'un homme peut pendant plusieurs jours infecter (& cela arrive assez souvent) un autre homme, sans qu'on puisse appercevoir en elle aucun symptôme de cette maladie : & réciproquement, un homme peut infecter une femme de la même manière.

3°. L'allaitement. Dans ce cas, les mamelons de la nourrice peuvent être infectés par des ulceres vénériens qui se trouvent dans la bouche de l'enfant ; ou réciproquement, les mamelons de la nourrice étant infectés, occasionneront des ulceres véné-

riens dans la bouche, au nez, ou aux levres de l'enfant.

4°. En exposant au contact du virus vénérien, par des baisers, par des attouchemens lascifs, quelque partie du corps couverte ou non de l'épiderme, sur-tout si les parties qu'on expose ainsi ont été précédemment excoriées, blessées ou ulcérées par quelque cause que ce soit. Nous voyons souvent des ulcères vénériens qui viennent de cette manière au scrotum & aux cuisses; & il y a des exemples bien avérés de la communication du virus par les mains, chez les Sages-femmes & les Chirurgiens. J'ai vu aussi des ulcères vénériens produits dans les narines, aux paupières & aux levres de personnes, qui après avoir touché les parties génitales affectées de gonorrhée ou d'ulcères vénériens, chez elles-mêmes ou chez d'autres, s'étoient frottées les narines &c. avec leurs doigts, avant de s'être lavées les mains.

5°. En blessant quelque partie du corps avec une lancette ou avec un couteau infectés du virus vénérien. On observe à cet égard une ressemblance entre le virus vénérien & celui de la petite vérole. Nous

avons plusieurs exemples de la communication de cette dernière par la saignée faite avec une lancette, qui après avoir servi ou à l'inoculation ou à l'ouverture des pustules varioliques, n'avoit pas été ensuite suffisamment nettoyée. Van-Swieten rapporte plusieurs cas où la vérole a été communiquée par un pareil défaut d'attention à nettoyer l'instrument dont on s'est servi pour faire des saignées ou des scarifications. Nous avons eu ici l'année dernière l'exemple fâcheux d'une jeune Dame qui s'étant fait ôter une dent gâtée, & l'ayant aussi-tôt remplacée par une dent tirée immédiatement d'une jeune femme qui paroissoit en bonne santé, fut bientôt après atteinte d'un ulcère dans la bouche. Le mal se trouva de nature vénérienne, mais si rebelle, qu'il résista aux remèdes mercuriels les plus puissans, entraîna la carie de la mâchoire, avec la plus affreuse érosion de la bouche & du visage, & conduisit cette infortunée au tombeau ; & tout cela sans qu'on apperçût la moindre incommodité dans la femme qui avoit fourni la dent saine.

Je ne connois aucune branche de l'art de guérir, que la pratique moderne ait autant perfectionnée

perfectionnée que le traitement des différentes especes de maladies syphilitiques ; & je crois que parmi les différentes maladies auxquelles les hommes sont sujets, il n'en est aucune dont la guérison soit aussi facile & aussi certaine que l'est maintenant celle de la maladie vénérienne entre les mains d'un Praticien judicieux & exercé. Mais lorsqu'elle est négligée ou traitée par l'ignorance, elle devient souvent très-rebelle, & quelquefois presque incurable. C'est une vérité reconnue, qu'il y a beaucoup de personnes que le mauvais traitement de cette maladie fait souffrir & détraque bien plus que n'auroit fait la maladie même, si elles n'y eussent fait aucun remede. Il n'est cependant presque aucune maladie pour laquelle plus de gens prétendent être habiles que pour celle-ci ; & dans la horde innombrable des Charlatans, on n'en trouveroit pas un seul qui ne s'arroe quelque connoissance supérieure, ou la possession de quelque recette particuliere, qu'il donne comme un remede infailible pour cette maladie dans tous ses différens degrés. Ils en imposent ainsi avec une impudence consommée aux malades qui ont le malheur

de tomber entre leurs mains, & qui ne manquent pas tôt ou tard d'être sévèrement punis de leur crédulité. Il est cependant très-certain que pour être en état de guérir cette maladie dans toutes ses diverses modifications, il faut, non-seulement beaucoup de discernement dans le choix & dans l'application des remèdes, mais encore une connoissance parfaite de la constitution du malade : ce qui ne peut être que le fruit de l'étude & de l'expérience. De-là vient qu'il faut souvent une habileté peu commune pour guérir parfaitement & radicalement une vérole confirmée ou des affections vénériennes qui ont été mal traitées. Le grand nombre d'infortunées victimes de l'ignorance & de la rapacité, qui s'offrent tous les jours à nos yeux, sont autant de preuves de la vérité de cette assertion.

On ne sauroit douter, d'après les autorités les plus respectables, que les maladies vénériennes ne fussent autrefois beaucoup plus violentes & plus effrayantes que de nos jours, & qu'elles n'allassent même assez souvent jusqu'à causer la mort. On attribue communément cette différence à la malignité du virus qu'on suppose avoir été

plus grande dans ces premiers tems ; & l'on imagine que sa nature s'est ensuite adoucie. Mais cette opinion me paroît destituée de fondemens solides. J'ai vu , non pas dans dix ou vingt sujets , mais dans des centaines de cas , cette maladie , aussi violente & aussi rebelle dans toutes ses différentes modifications , qu'elle ait jamais été dépeinte par aucun Auteur du seizieme ou du dix-septieme siecle. Tout ce qu'on peut dire , c'est qu'il est en général plus rare de voir maintenant ces terribles accidens en Europe. Cela ne tient point , selon mon opinion , à la différence du climat , comme on pourroit se le persuader ; mais au degré de perfection auquel on a porté le traitement de ces maladies , & sur-tout aux principes éclairés d'humanité qui se sont répandus dans toute l'Europe , & qui ont heureusement succédé à la barbare superstition & à la cruauté des siecles précédens. Nous n'abhorrons plus , nous n'exposons plus sur un fumier ces pauvres malheureux , ou nous ne les laissons pas mourir , comme font les Kalmoucks , qui abandonnent leurs freres & leurs enfans attaqués de la petite vérole , sans leur donner le

moindre secours. Les deux sexes, moins esclaves des préjugés qu'autrefois, se présentent plutôt pour être traités, & le font plus facilement par des personnes plus humaines & plus instruites. Et je suis persuadé que c'est principalement par cette raison que la maladie vénérienne est bien moins fréquente & bien moins violente sous ses différentes modifications, à Londres, que dans aucune autre Capitale de l'Europe. Les malades de la dernière classe du peuple ont, non-seulement des hôpitaux & des maisons de charité où ils reçoivent gratuitement des remèdes & des avis de la part de gens instruits & sans préjugés ; mais les personnes du sexe, que la honte pourroit empêcher de se présenter dans ces hospices, n'ont point de peine à trouver des êtres bienfaisans qui leur fournissent de quoi subsister pendant la durée de leur maladie, & il ne leur est pas plus difficile de rencontrer un homme de l'art, qui les traite sans en attendre aucun salaire. Je fais qu'on ne trouve cela dans aucun autre pays du monde. D'ailleurs, la plupart des Médecins & Chirurgiens n'ayant pas dans les petites villes autant de moyens

d'acquérir des connoissances & de se former l'esprit & le cœur, n'ont en général que des notions plus bornées, & souvent ne connoissent que très-superficiellement cette maladie.

Nos Médecins & nos Chirurgiens ne se croient pas autorisés à reprocher aux malades vénériens leur péché d'une manière rude & inhumaine ; ou à laisser souffrir ces pauvres créatures, afin de se rendre agréables au Tout-Puissant, en se regardant comme instrumens de sa vengeance, & se croyant destinés par le ciel à les punir plutôt qu'à les soulager, ainsi que j'en ai mille fois été témoin dans de grandes Capitales, en différentes parties du continent.

Nos Magistrats n'enferment pas ces malheureux dans une prison ou dans un hôpital qui n'en diffère que par le nom. Mais ils leur offrent au contraire tous les moyens possibles de se procurer du soulagement. Dans d'autres pays, où le gouvernement suit d'autres principes, où les pauvres malades n'ont aucun asyle, & sont exposés à mourir de faim pendant le traitement ; & où ils n'osent pas même recourir à tems aux personnes de l'art ; dans ces pays, dis-je,

22 OBSERVATIONS PRATIQUES

j'ai vu souvent la maladie syphilitique dans ses plus horribles modifications, qui sont inconnues à Londres (1).

En un mot, qu'un homme fasse le tour de l'Europe, & qu'il s'attache simplement à observer les malades vénériens, tant ceux qui sont renfermés dans les hôpitaux, que

(1) *Note du Traducteur.* Il est clair que l'Auteur n'a eu en vue dans cette tirade aucune des grandes villes de France. Les vrais principes d'humanité ne sont nulle part mieux connus que dans notre heureuse patrie, & les gens de l'Art y sont irréprochables. J'ai cependant quelque regret à penser qu'il y ait encore bien des villes en France où les pauvres atteints du mal vénérien n'ont aucun asyle. Il y a sans doute des hôpitaux par-tout; mais bien loin de recevoir dans ces maisons de charité, les pauvres infectés de cette maladie, on exclut impitoyablement tous ceux qui en éprouvent les moindres symptômes. Il résulte de cette distinction peu humaine, que les malades qu'on y reçoit pour des affections d'un autre genre, cachent avec le plus grand soin la part que le virus vénérien peut avoir dans les maux qu'ils éprouvent : ce qui rend leur traitement aussi difficile qu'incertain. Ou si, comme cela arrive tous les jours, les Médecins démêlent la complication ou la cause vénérienne, les réglemens de ces maisons les obligent à découvrir ces malheureux; & l'on ne manque pas de les faire sortir aussi-tôt que leur état peut le permettre, après qu'on s'est contenté de pallier, comme on a pu, leur maladie..... La crainte de n'être jamais guéris peut bien retenir quelques jeunes gens; mais le plus grand nombre fuit toujours son penchant, & la maladie vénérienne se perpétue ainsi sous un nombre infini de modifications. Il seroit à désirer qu'on obviât par-tout à ce funeste inconvénient par des établissemens conformes à ceux dont la Capitale retire de si grands avantages.

ceux qui vivent ou meurent en proie aux plus affreux symptomes de cette maladie , fans qu'on y fasse attention , dans leurs demeures particulieres : & je mets en fait qu'il pourra , par cette seule circonstance , juger aussi solidement des différens progrès respectifs qu'ont fait les lumieres & les vrais principes d'humanité dans les différens Etats, que par tout autre genre de recherches. Il sera étonné de trouver de nos jours une aussi grande différence entre les différens gouvernemens , relativement à la barbarie & à l'humanité , que celle que j'ai trouvée , il y a peu d'années , relativement aux sciences , entre deux Universités modernes : je veux dire Gottingue & Louvain. Dans l'une , toutes les institutions tendent à inculquer dans l'esprit de la jeunesse tous les genres de connoissances utiles & les principes les plus généreux de philanthropie : au lieu que dans l'autre , tout conspire à tenir les jeunes gens dans la superstition & dans l'ignorance , & à graver dans leur cœur tous ces principes d'intolérance & de haine pour le vrai savoir en tout genre , que nous reprochons maintenant à nos aïeux avec tant de justice.

24 OBSERVATIONS PRATIQUES

J'ai du moins trouvé jusqu'ici , que la fréquence & la violence des maladies vénériennes dans les différens pays sont exactement en proportion du degré d'encouragement que les gouvernemens accordent aux sciences , & du progrès qu'ils laissent faire aux principes honnêtes & généreux parmi les peuples. D'après ces observations , je suis convaincu que si un gouvernement , dans quelque climat que ce soit , adoptoit un plan judicieux , avec des réglemens & des précautions convenables , il parviendrait , non-seulement à rendre très-rares tous les symptomes violens de la maladie vénérienne , mais encore à diminuer extrêmement le nombre des victimes de cette maladie , sinon à l'extirper entierement. Mais une pareille entreprise , quoique facile à concevoir & à exécuter , paroît encore peu compatible avec les idées de notre siècle ; il est seulement permis d'espérer que notre postérité plus éclairée & plus humaine , en reconnoîtra les avantages , & en saura recueillir les fruits.



CHAPITRE II.

De la GONORRHÉE VIRULENTE.

LA gonorrhée virulente (1) est une inflammation locale, accompagnée de l'excrétion d'une matière puriforme, par l'uretre chez les hommes, & par le vagin chez les femmes. Il s'y joint un fréquent besoin d'uriner, & une cuisson ou une douleur poignante & brûlante pendant le passage de l'urine. Cette inflammation est l'effet d'un stimulus, d'une

(1) Le nom de gonorrhée est dérivé du grec γονη, *genitura*, *semen*, & ῥέω, *fluo*, c'est-à-dire, *fluxus seminis* : ce qui est un nom très-impropre pour cette maladie, en ce qu'il présente une idée erronée. Le mot *gonorrhée* implique un écoulement de semence qui n'a jamais lieu dans cette maladie. Si l'on doit lui conserver un nom grec, j'aime mieux l'appeller *blennorrhagia* de βλεννος, *mucus*, & ῥέω, *fluo* ; c'est-à-dire, *mucifluxus (activus)* & la distinguer ainsi des vrais flux de semence, & en même tems des simples écoulemens (*gleet* en anglois) auxquels je donneroie le nom de *blennorrhœa*, *mucifluxus (passivus)*, c'est-à-dire, sans symptômes inflammatoires. On donne communément à cette maladie le nom de *chaude-pissé*, à cause de la chaleur cuisante qu'on éprouve en urinant. On la nomme en anglois *clap*, du verbe *clap*, battre ; en allemand *tripper*, du verbe *trip*, dégoutter : d'après les principaux symptômes qui l'accompagnent. Voyez le tableau nosologique de cette maladie à la fin du Chapitre suivant.

activité suffisante , appliqué à ces parties. Quelquefois, par la violence de l'irritation, la sécrétion du mucus semble être totalement suspendue ou du moins considérablement diminuée ; en sorte qu'il ne se fait aucune excrétion , ou qu'elle est très-peu considérable, quoique les autres symptômes sévissent avec la dernière violence. Dans ce cas , la maladie a reçu le nom très-impropre de gonorrhée sèche , comme si l'on disoit : *fluxus seminis sine fluxu*. Un autre symptôme qui s'y joint quelquefois, c'est une vive douleur pendant l'érection, provenant de l'extension du frein, & dans ce cas, on lui donne l'épithète de *cordée* ; mais comme ces distinctions ne dénotent que la violence de quelque symptôme particulier , il n'est pas besoin de les conserver.

On doit observer , 1°. que cette maladie est une inflammation locale , & que par conséquent , comme toutes les autres du même genre, elle n'affecte que rarement le système entier. 2°. Que, quoique la matière de l'écoulement ait une apparence purulente, elle n'est pas un vrai pus , beaucoup moins du sperme, comme l'imaginent quelques malades. Ce n'est simplement que le

mucus de l'uretre ou du vagin, *séparé* en plus grande quantité que de coutume, & *altéré* dans sa couleur & dans sa consistance par le stimulus qui est appliqué à ces parties. Il en est de cette excretion, comme des écoulemens muqueux du nez ou du poumon, dans les rhumes du cerveau ou de la poitrine, dans lesquels le mucus prend à peu près la même apparence. C'est une notion erronée de croire que cet écoulement provient toujours d'un ulcere dans l'uretre. Sur cent gonorrhées, il n'y en a peut-être pas une où il y ait vraiment un ulcere. Mais la maladie est simplement une inflammation superficielle dans la membrane interne de l'uretre, pareille à celle de la membrane muqueuse du nez ou du poumon dans les rhumes, comme je viens de le dire (1); car,

(1) Ce point de doctrine n'étoit jusqu'ici qu'une supposition qui n'étoit prouvée par aucun fait direct. Des Anatomistes qui ont eu l'occasion d'examiner l'uretre dans des sujets qui durant leur vie avoient essuyé des gonorrhées réitérées, n'y ayant trouvé aucune cicatrice, on a tiré delà cette conclusion, que les gonorrhées ne sont ordinairement pas accompagnées d'ulceres. Cela ne prouveroit cependant que peu ou rien, à mon avis. Car nous voyons journellement que les chancres au prépuce ou au gland, quelque profonds qu'ils soient, se dissipent & sont si bien effacés, au bout d'un tems assez court, qu'on n'y voit pas la moindre

dans ce dernier cas , quoique la matiere de l'écoulement ressemble beaucoup à du pus , nous savons qu'elle ne procede jamais d'un ulcere dans le nez ou dans le poumon. L'on peut ainsi expliquer avec facilité la grande quantité de matiere qui s'évacue , & n'être point étonné qu'une aussi grande évacuation que celle qu'on observe si fréquemment dans les violentes gonorrhées , affecte si peu la constitution. Au lieu que s'il s'évacuoit une aussi grande quantité de semence ou de vrais pus , nous trouverions certainement que la constitution & les forces des malades seroient essentiellement altérées : ce qui cependant n'arrive que ra-

trace d'un ulcere ou la moindre cicatrice. On se tromperoit évidemment dans ce cas , si l'on concluoit qu'il n'y a jamais eu d'ulcere vénérien dans les sujets dont les cadavres n'offriroient aucune cicatrice au gland ou au prépuce. Mais ce que les Anatomistes n'ont fait que supposer jusqu'ici , est maintenant devenu évident par les soins de mon ami le Docteur Stoll , Professeur de pratique médicale à Vienne en Autriche. Il eut , il y a deux ans , l'occasion instructive de disséquer un homme qui mourut dans son hôpital , étant actuellement attaqué d'une gonorrhée virulente. En ouvrant l'uretre avec attention , il trouva sa surface interne plus rouge que dans l'état naturel , deux des vaisseaux lymphatiques plus blancs & plus larges qu'à l'ordinaire , & la matiere puriforme suintant à travers la membrane interne , particulièrement à la fosse naviculaire , où étoit le siege de la maladie , sans la moindre apparence d'ulcere ou d'excoriation.

rement dans les gonorrhées, même les plus virulentes. 3°. J'ai dit que l'écoulement peut être produit par un stimulus appliqué à ces parties, pourvu qu'il soit de force suffisante. Pour discuter plus complètement cette dernière proposition, je vais l'examiner sous les trois points de vue qui suivent.

I.

Je suis dans l'opinion » que les gonorrhées » virulentes, provenant d'une cause *extérieure*, sont actuellement excitées par le » stimulus qui est appliqué à la cavité de » l'uretre même, « & que par conséquent dans l'acte de la copulation, le mucus virulent du vagin est poussé, ou coigné, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'uretre, & qu'il n'est pas absorbé, comme certains Auteurs l'ont imaginé, par les orifices des vaisseaux lymphatiques du gland, pour être ensuite déposé à la lacune ou fosse naviculaire, sous le frein..... Si une pareille absorption avoit lieu, nous observerions tous les jours des écoulemens virulens, dont le siege seroit plus avant dans la cavité de l'uretre, aussi bien que sous le frein, au lieu que cela

n'arrive que rarement , ou jamais. Le siege de ces gonorrhées est toujours originairement dans la lacune , sous le frein ; & celles qui se trouvent avoir leur siege à la courbure de la verge , ou plus avant dans le canal de l'uretre , ne sont pas ainsi placées dès le commencement de la maladie , ou proviennent d'une cause interne. Ce qu'on a dit de l'impossibilité d'une pareille application immédiate du virus à l'intérieur de l'uretre , parce que son orifice est étroitement fermé durant l'érection , & ne peut par conséquent en permettre l'introduction , n'est , selon moi , qu'un raisonnement fondé sur une théorie vaine & illusoire (1).

I I.

Je prouverai , tant par des principes bien établis que par des observations pratiques , que „ les gonorrhées peuvent être produites , & le sont très-fréquemment , par

(1) Ce que je dis ici ne regarde que les gonorrhées qui proviennent d'une cause appliquée extérieurement. Mais quoique les gonorrhées vénériennes soient communément produites par une cause extérieure , il me paroît très-probable qu'elles peuvent quelquefois être l'effet du virus qui est déposé de la masse des humeurs , comme nous voyons que cela arrive fréquemment à l'égard des chancres.

» le même virus vénérien , qui appliqué à
 » d'autres parties du corps , produit des
 » chancres , ou d'autres symptômes de vé-
 » role «. Des Médecins du premier ordre
 ont avancé dans ces derniers tems , que le
 virus qui produit une gonorrhée est diffé-
 rent de celui qui cause la vérole ; & l'on
 a apporté plusieurs argumens spécieux en
 faveur de cette opinion paradoxale. Cette
 nouvelle assertion concernant la nature des
 gonorrhées, me conduit dans une discussion
 que j'entreprends d'autant plus volontiers ,
 qu'elle est de grande importance dans la
 pratique , & que les expériences & les ob-
 servations me mettront , j'espère , en état
 non-seulement de prouver le contraire ,
 mais encore de concilier les différentes opi-
 nions , & de mettre ainsi dans le plus grand
 jour cette matiere , qui jusqu'ici étoit très-
 difficile & très - obscure. Je commencerai
 cette discussion par l'examen des différentes
 raisons qu'on a alléguées en faveur de cette
 nouvelle doctrine.

1°. On dit que *le virus qui cause la gonorrhée ne produit jamais , comme celui des chancres , aucun symptôme vénérien dans la masse générale , ou ne donne jamais la*

vérole. Je réponds à cela , que quoiqu'il soit extrêmement rare qu'une gonorrhée produise la vérole , on ne peut cependant pas regarder la proposition comme universellement vraie. Ce qui est cause que les gonorrhées ne produisent pas , comme les chancres , constamment la vérole , c'est que la plupart de ces maladies , si elles ne sont pas mal traitées , n'excitent qu'une inflammation superficielle dans la membrane interne de l'uretre , sans aucune exulcération ; d'où il résulte que l'absorption ne peut facilement avoir lieu , le virus étant hors du torrent de la circulation. Mais j'ai vu des gonorrhées qui , par un mauvais traitement , ou lorsque la maladie avoit été originairement accompagnée d'un ulcere dans l'uretre , étoient suivies des symptomes les moins équivoques de la vérole. Ce qui fait aussi que le virus vénérien lorsqu'il est appliqué à l'uretre , ne produit pas en effet aussi souvent des ulcères que lorsqu'il est appliqué au gland , ou à d'autres parties extérieures , c'est que la membrane interne de l'uretre est défendue par une grande quantité de mucus , dont la sécrétion se trouve extrêmement augmentée , & quelquefois à un

degré

degré surprenant , par l'action du stimulus virulent qui lui est appliqué. Tant que le mucus se sépare aussi abondamment , le virus est enveloppé, l'uretre est défendu , & la formation des ulcères est efficacement empêchée. Mais si cette sécrétion vient à être diminuée , soit par la violence de l'irritation , soit par toute autre cause ; ou si par des injections contraires ou faites mal à propos , le mucus est emporté pendant qu'il reste encore du virus , je suis d'opinion , fondé sur plus de vingt exemples que j'en ai vus , que sur dix cas pareils , il y en aura neuf dans lesquels l'excoriation & l'exulcération de l'uretre s'ensuivront , & procureront la vérole aussi certainement que peuvent la procurer les ulcères vénériens situés en tout autre endroit du corps.

S'il se trouvoit entre le prépuce & le gland la même quantité de mucus que dans la cavité de l'uretre , on y verroit aussi rarement des ulcères qu'on en voit dans l'uretre dans les cas de simple gonorrhée. Nous observons que lorsque le virus rencontre entre le prépuce & le gland une grande quantité de mucus , comme cela arrive quelquefois , il ne produit point d'ulcères dans

ce cas , mais seulement une excrétion considérable de mucus puriforme , à laquelle on donne le nom de *fausse gonorrhée* , & qu'on pourroit appeller plus justement *blennorrhagia balani* , c'est-à-dire , écoulement actif du gland ou de la couronne du gland. Ce qui est cause que cette espèce d'écoulement est moins fréquente que ceux de l'uretre , c'est , à mon avis , la petite quantité de mucus qui se sépare dans ces parties dans la plûpart des sujets ; d'où il arrive que le virus n'étant pas suffisamment délayé , produit communément ces érosions ou ulcères vénériens qu'on appelle chancres..... Cette théorie est évidemment confirmée par le fait bien connu que les femmes ont très-rarement des chancres dans le vagin, quoiqu'elles en aient très-fréquemment aux grandes levres & aux nymphes. Il me semble que le simple défaut d'une suffisante quantité de mucus sur ces dernières parties explique suffisamment cette différence.

2°. On soutient que *le virus de la gonorrhée ne produit jamais des chancres*, & que *le virus des chancres ne produit jamais la gonorrhée*. Ils ont avancé , en

preuve de cette assertion, qu'une personne qui a des chancres ne communique jamais aucune autre maladie que des chancres, & qu'une personne qui a la gonorrhée, ne peut donner autre chose que la gonorrhée. Je ne nierai pas que cela n'arrive souvent ainsi ; mais l'observation répétée & attentive m'autorise à dire qu'à l'imitation d'un très-grand nombre d'autres Auteurs de médecine, ils ont tiré une conclusion générale de quelques observations qui étoient favorables à l'opinion dont ils sont prévenus ; car dans beaucoup de cas où j'ai eu l'occasion d'examiner les deux parties, je me suis convaincu qu'une personne affectée d'une simple gonorrhée virulente a communiqué des chancres ; & réciproquement, qu'une gonorrhée virulente a été le fruit d'une infection communiquée par une personne qui n'avoit que des chancres. Mais il y a une preuve plus frappante, & à laquelle on n'a pas fait attention, & c'est que si un malade attaqué d'un écoulement vénérien ne prend pas soin de tenir le gland & le prépuce bien propres, il y naît très-souvent des chancres, dont on ne peut naturellement rapporter la cause qu'à la

matiere de la gonorrhée. C'est - là une des principales raisons qui, dans les cas de gonorrhée, nous font insister sur le précepte de tenir les parties bien nettes : l'expérience nous ayant appris que les chancres suivent souvent la négligence de cette précaution, même quelque tems après que l'écoulement a considérablement diminué. Par la même raison, j'ordonne constamment à ces malades de tenir leurs mains propres, parce que j'ai vu des exemples réitérés d'ulceres vénériens dans le nez & aux paupieres, qui ont été occasionnés par cette négligence. Mais, indépendamment de ces raisons, quel est l'homme de l'art qui doute que la matiere prise d'un chancre & appliquée à l'uretre ne produisît une gonorrhée ? C'est une expérience que je ne voudrois certainement pas éprouver sur moi-même. Je dois donc conclure que quoique les Ecrivains qui ont apporté cette seconde preuve puissent avoir raison dans quelques cas qui se sont offerts à leur observation, ils ont tort de déduire d'un petit nombre de faits une règle générale ; comme j'aurois tort moi-même si je conclusois, de quelques exemples contraires que j'ai observés, que la gonorrhée com-

munique toujours des chancres , & les chancres toujours la gonorrhée..... J'ai vu , comme je l'ai déjà dit , quelques cas de cette espece , dans lesquels , vers la quatrième ou la cinquième semaine d'une gonorrhée , soit par le mauvais traitement , soit par la négligence de la propreté extérieure , il a paru des chancres en des endroits qui auparavant étoient parfaitement sains. Mais ce seroit - là certainement une très-mince raison pour établir que cet effet arrive toujours. Ces chancres produits par la matière de la gonorrhée étoient constamment , selon mes observations , aussi virulens & aussi capables d'infecter que ceux qui proviennent d'une contagion immédiate ; & de même que ceux-ci étant abandonnés à eux-mêmes , ils ont produit les mêmes effets pernicieux dans l'économie animale. Et si une personne qui a de pareils ulcères alloit s'imaginer qu'ils ne sont pas vénériens , & qu'ils ne fauroient produire la vérole , parce qu'ils proviennent si évidemment de la matière de la gonorrhée , elle se trouveroit certainement trompée de la manière la plus désagréable.

3°. La dernière preuve qu'on apporte , & qu'on croit sans réplique , pour établir que le

38 OBSERVATIONS PRATIQUES

virus de la gonorrhée & celui de la vérole confirmée, different essentiellement, c'est que *le mercure*, à ce qu'ils disent, *ne contribue jamais à la guérison de la gonorrhée, ni ne l'accélere ; mais qu'au contraire on peut certainement guérir toutes les especes de gonorrhée, sans employer le mercure, & sans courir le danger de laisser jamais la vérole dans le corps* Je réponds à cela que c'est à la vérité un fait certain & authentique qu'on peut guérir & qu'on guérit beaucoup de gonorrhées sans mercure. J'ai vu dans plusieurs occasions que l'eau toute simple, buë pendant un tems considérable, a guéri la gonorrhée aussi complètement que tout autre remede auroit pu le faire. La nature est souvent capable de guérir seule dans les maladies aiguës, si nous la laissons procéder sans la troubler dans ses opérations. Cette même nature, lorsqu'elle est irritée par le virus, excite une plus grande secretion de mucus qu'à l'ordinaire, de la même maniere que la glande lacrymale verse dans l'œil une plus grande quantité de lymphe lorsqu'il y est entré un grain de sable. Cette plus grande quantité de mucus remplit l'objet de délayer le virus

aussi efficacement que tous les remèdes que l'art pourroit injecter. D'ailleurs , par ce moyen , le virus est non-seulement délayé , mais il est en partie évacué avec l'écoulement ; & la pratique moderne , qui traite les gonorrhées en injectant des huiles douces & d'autres liqueurs mucilagineuses dans l'uretre , ne fait qu'aider la nature dans cette opération salutaire.

Mais quoique j'accorde qu'on peut en général guérir les gonorrhées sans mercure , l'expérience m'a cependant appris qu'il n'est pas toujours possible de les guérir complètement à aussi peu de frais. Dans les cas où la gonorrhée est d'une espèce bénigne , sans aucun ulcère ou excoriation dans l'uretre , on peut la guérir sûrement & radicalement , sans employer un seul grain de mercure ; & si l'on donne du mercure intérieurement dans des cas pareils , il ne peut produire aucun effet ; non point parce que la maladie n'est pas produite par le virus vénérien , mais parce que ce même virus se trouve placé hors du torrent de la circulation.

Quant à ce qu'on allègue de plus : savoir , que le mercure n'a jamais le pouvoir d'accélérer la guérison de la gonorrhée , je

réponds que non-seulement on confond les écoulemens qui proviennent du virus vénérien avec ceux qui sont produits par d'autres causes, mais qu'on ne fait pas une distinction suffisante entre l'usage du mercure à l'intérieur & son application topique. J'accorde facilement que le mercure donné à l'intérieur ne peut guérir les gonorrhées simples, par la raison que la cause de cette maladie est située hors de ses atteintes ; mais on ne peut pas en dire autant relativement à son application topique. Je suis en effet parfaitement convaincu , non-seulement que les injections mucilagineuses combinées avec de douces préparations mercurielles contribuent à la guérison , mais encore que cette combinaison constitue la méthode la plus sûre , la plus prompte ; en un mot , la meilleure pour la guérison de ces maladies. Quoique je ne nie pas qu'il n'y ait des cas de gonorrhées simples , dans lesquels le mercure , appliqué de cette manière , ne produit pas toujours de bons effets , je suis cependant porté à croire que cela vient souvent du mauvais choix des préparations qu'on emploie.

Il faut observer aussi que dans cette con-

troverse , il semble qu'on ait entièrement passé par-dessus la distinction qu'il faut faire entre la gonorrhée vénérienne simple , & celle qui est combinée avec une exulcération de l'uretre ; & il est tellement important de faire attention à cette distinction , que l'expérience journaliere nous apprend non-seulement qu'on guérit avec plus de sûreté & de promptitude par l'usage du mercure les gonorrhées de cette dernière espece , mais encore qu'elles sont souvent, sinon toujours, totalement incurables sans ce remede ; & que les écoulemens habituels qui restent après ces gonorrhées , quoiqu'ils résistent opiniâtrément à tous les autres remedes , cedent néanmoins souvent avec promptitude à l'usage du mercure, soit à l'intérieur , soit à l'extérieur. Je puis même avancer avec confiance qu'après qu'un écoulement de cette espece a duré pendant un certain tems , il n'est pas possible de le guérir radicalement sans le secours du mercure.

Je vais maintenant examiner la dernière partie de cette objection : savoir , que la gonorrhée ne laisse jamais la vérole après elle. Ils ont sans doute observé cela très-fréquemment ; mais ils tombent ici dans la

même erreur que nous avons déjà relevée , en ne distinguant pas les gonorrhées simples de celles qui sont accompagnées d'exulcération dans l'uretre. Il faut convenir qu'en effet l'absorption ne peut facilement avoir lieu dans les gonorrhées simples , quoique j'avoue qu'il est encore douteux pour moi si même dans ce cas l'absorption du virus & la vérole qui en est la suite n'ont pas lieu *quelquefois* ; du moins nous n'avons pas un nombre suffisant d'observations pour déterminer ce point avec certitude.

Mais quoiqu'il en arrive dans les gonorrhées simples , il est certain que lorsque cette maladie est accompagnée d'un ulcère de l'uretre , les parties sont disposées à l'absorption du virus. Dans ces circonstances , je n'ai jamais rencontré un seul malade chez lequel cette absorption n'ait pas eu lieu ; & si l'on n'avoit pas recours de bonne heure au mercure , la vérole n'a jamais manqué de s'ensuivre. J'ai rencontré aussi plusieurs cas dans lesquels la blessure accidentelle d'un petit vaisseau sanguin dans l'uretre , par l'application mal-adroite de la seringue ou de la sonde , a donné lieu à l'absorption du virus d'une gonorrhée simple , lequel a produit

dans le système entier les symptômes vénériens les moins équivoques ; & cependant , malgré leur origine , ils ont cédé très-promptement au mercure. Nous pouvons donc conclure avec assurance qu'il y a quelques gonorrhées qui ne peuvent être guéries sans mercure , quoiqu'il y en ait d'autres qu'on peut dissiper sans faire usage de ce remède , & sans qu'il s'ensuive aucune mauvaise conséquence. Je vais rapporter quelques observations que j'ai eu occasion de faire sur ce sujet , & qui mettront cette matière dans un plus grand jour.

Un jeune homme d'environ 23 ans , en parfaite santé , prit une gonorrhée , sans aucun autre symptôme vénérien. L'écoulement ayant été imprudemment arrêté , il s'ensuivit une suppression totale des urines. On appella un Chirurgien ; & celui-ci trouvant le malade hors d'état de supporter plus long - temps la douleur que lui causoit la distension de la vessie , eut recours à la sonde. Mais à l'approche de la vessie , il se présenta un obstacle qui empêcha l'instrument de s'introduire plus avant , quoiqu'on s'y prit de toutes les manières possibles. Après avoir attendu quelques momens , on fit une sc-

conde tentative , mais fans succès. Comme la douleur augmentoit , & que l'accumulation de l'urine faisoit craindre la rupture de la vessie, on força enfin un passage à la sonde avec le moins de violence qu'il fut possible. Cet effort fit sortir quelques gouttes de sang de l'uretre , & fut suivi d'une copieuse évacuation d'urine. Au moyen d'un traitement convenable , le malade fut délivré en peu de jours de ce terrible symptome. La gonorrhée reparut ; & au bout d'un tems assez court , nous le crûmes entierement guéri. Mais bien-tôt après , quoiqu'il n'y eût pas eu la moindre apparence de chancres dans tout le cours de la maladie , il lui survint vers le milieu du sternum une exostose , accompagnée de la plus vive douleur. On lui administra le mercure. En peu de jours , le malade se trouva mieux , & dans l'espace de cinq semaines , il fut parfaitement guéri. Je demande à toute personne impartiale qui voudra réfléchir sur ce cas , s'il n'est pas raisonnable de supposer qu'en forçant un passage à la sonde , on a blessé quelque vaisseau , ce qui a donné lieu à l'absorption ; en sorte que le malade a été infecté dès cet instant , & a été ensuite guéri de

la même manière que s'il eût reçu l'infection par le moyen d'un chancre (1).

Un homme âgé d'environ quarante ans , qui avoit essuyé anciennement différentes gonorrhées dont il n'avoit plus de vestiges depuis cinq à six ans , gagna une nouvelle gonorrhée. Celle-ci , d'après son récit , étoit bénigne pendant les cinq ou six premiers jours , ne lui faisoit pas éprouver beaucoup de douleur en urinant , & presque point dans l'érection. Mais après avoir fait un exercice violent , il sentit plus d'irritation dans toute l'uretre , & sur-tout au col de la vessie. Il se contenta de prendre pour cela un purgatif mercuriel , & de se frotter chaque jour le périnée avec de l'onguent

(1) On a aussi apporté en preuve de la différence entre le virus de la gonorrhée & celui de la vérole , les époques différentes auxquelles la maladie vénérienne & la gonorrhée ont paru pour la première fois ; mais il est absurde d'opposer incertitude à incertitude. Je pense que nous sommes aussi peu certains de l'époque précise à laquelle la vérole a paru pour la première fois , que nous pouvons l'être du commencement de la gonorrhée. On a avancé que les habitans des îles de la mer du Sud , quoiqu'affligés de la vérole , sont encore exempts de la gonorrhée. Mais le Capitaine King , qui a succédé au Capitaine Clark dans le dernier voyage autour du monde , m'a assuré que cela étoit faux , & qu'il avoit vu lui-même plusieurs de ces Insulaires affectés d'un écoulement par l'uretre.

mercuriel. Ces symptomes furent presque entierement dissipés au bout de huit jours , & il ne lui resta qu'un peu de douleur fourde au périnée. Mais le mal pour lequel il vint me consulter étoit une douleur si vive au cartilage xyphoïde , qu'il ne pouvoit même souffrir qu'on y touchât. Je lui conseillai de se frotter encore pendant deux jours le périnée avec de l'onguent mercuriel. Lorsque je le revis , la douleur n'étoit pas adoucie , mais elle avoit quitté son premier siege , & occupoit alors le milieu du sternum , & il en avoit été tourmenté sur-tout la nuit précédente. Je lui ordonnai du mercure à l'intérieur. L'usage de ce remede le guérit en peu de tems..... Voyez aussi le cas rapporté ci-dessus , pag. 5.

J'ai répondu jusqu'ici aux argumens dont on s'est servi pour prouver que la gonorrhée n'est jamais de nature vénérienne , ou , en d'autres mots , qu'elle ne procede jamais d'un virus de la même nature que celui de la vérole. Mais quoique j'aie fait voir que cette doctrine souffre de grandes difficultés , je suis bien loin de soutenir que toutes les gonorrhées proviennent du virus vénérien. Au contraire :

I I I.

Je suis convaincu , par les expériences que j'ai faites sur moi-même , & par les observations que les autres m'ont fournies , « qu'il » y a quelquefois des gonorrhées produites » par d'autres acrimonies , ou substances » stimulantes , appliquées à l'uretre , & » qu'elles ont à-peu-près les mêmes symp- » tomes que ceux qu'on observe dans les » gonorrhées vénériennes ». Bien plus : je suis même porté maintenant à penser que de pareilles gonorrhées peuvent quelquefois se propager comme celles qui sont vénériennes. Je ne suis pas en état de déterminer si les gonorrhées dont il est fait mention dans quelques anciens Auteurs étoient de cette nature , & conséquemment je me dispenserai de m'en occuper. Je dois me contenter d'observer que les gonorrhées dont je parle sont très - différentes du flux de véritable semence , ou de celui du mucus de la glande prostate. Ces dernières incommodités étant principalement l'effet d'une foiblesse des canaux excrétoires, occasionnée par l'abus de l'acte vénérien , & sur-tout par la masturbation , n'entrent point dans le plan de cet Ouvrage.

Je vais donc continuer à suivre mon objet principal , qui est maintenant de prouver que les inflammations locales de l'uretre , accompagnées de l'écoulement qu'on appelle en général gonorrhée , ne sont pas toujours de nature vénérienne , ni dans les hommes , ni dans les femmes. Ce qui me donna la première idée de cette différence , ce fut d'observer fréquemment dans les chevaux entiers une espèce d'écoulement d'une matière jaune - verdâtre par l'uretre. J'ai vu cet écoulement , dont les causes me sont encore inconnues , durer quelques jours , & cesser ensuite spontanément. J'ai observé la même chose , & même plus fréquemment , dans les chiens , sans m'apercevoir qu'ils parussent en souffrir beaucoup ; & , quoiqu'ils léchassent presque continuellement cette partie , ils n'étoient jamais attaqués d'ulceres dans la gueule. J'ai d'ailleurs été consulté depuis plusieurs années par un nombre de personnes , pour des écoulemens très-ressemblans aux gonorrhées vénériennes, mais dont les symptômes étoient si doux , & de si courte durée , que je commençai à douter qu'ils fussent de nature vénérienne. J'ai vu des personnes mariées

mariées qui vivoient dans la plus parfaite union , dont l'une étoit affectée pendant plusieurs jours d'un pareil écoulement , sans communiquer le moindre symptôme à l'autre. J'ai été très - intimement lié avec quelques-unes , & j'ai été convaincu , sans qu'il me fût possible d'en douter , qu'elles étoient fidèlement attachées l'une à l'autre , & que par conséquent la maladie devoit provenir de toute autre cause que d'une infection étrangere.

Toutes ces observations réunies me porteroient à croire que certaines especes d'écoulemens devoient peut - être leur origine à quelque cause , soit externe , soit interne , différente du virus vénérien. Je commençai à soupçonner qu'un stimulus quelconque , vénérien ou non , pourvu qu'il fût assez âcre pour exciter une inflammation , & par conséquent une sécrétion extraordinaire du mucus de l'uretre , étant appliqué à cet organe , pourroit produire une gonorrhée ; de même que les rhumes du cerveau , ou *coryza* , dans lesquels la membrane muqueuse du nez fournit une évacuation plus abondante & d'une autre couleur que dans l'état naturel , reconnoissent une cause toute

différente du virus vénérien. Après avoir roulé ces idées dans ma tête pendant plusieurs années, je me déterminai enfin à faire sur moi-même une expérience qui fût capable ou de confirmer ou de renverser de fond en comble la théorie que j'avois conçue.

Dans cette vue, je pris six onces d'eau, & j'y ajoutai autant d'alkali volatil fluor qu'il en falloit pour donner à ce mélange un goût très-piquant & comme brûlant. J'injectai cette liqueur dans mon uretre, en comprimant le canal avec les doigts de mon autre main, au-dessous du frein, pour l'empêcher de pénétrer plus avant, & l'appliquer ainsi à la partie même qui est communément le siege de la gonorrhée vénérienne. Au moment où elle toucha l'intérieur de l'uretre, j'éprouvai une douleur si insupportable, que je ne pus la retenir seulement l'espace d'une seconde; je retirai, malgré moi, la seringue presque à l'instant de l'injection, & la liqueur injectée s'écoula au-dehors. Mais, quoique la douleur fût très-vive pendant un demi-quart-d'heure, je résolus de faire une seconde épreuve : elle occasionna la douleur

la plus forte que j'eusse ressentie de ma vie. Cependant je retins l'injection pendant bien près d'une minute ; mais la douleur devint alors si cruelle, que je ne pus la supporter plus long-tems , & je retirai la seringue. J'éprouvai à l'instant une forte envie d'uriner ; mais , comme j'avois pris cette précaution avant de faire mon expérience , je résistai à ce besoin. Je m'étendis sur mon canapé , & j'attendis l'événement avec patience. La douleur étoit si vive , qu'il se passa près d'une heure avant que je fusse capable de me remuer. Je m'amusai ensuite à lire pendant le reste de la matinée ; je dinai comme à mon ordinaire ; mais je me mis au lit de bonne heure. Je fus alors obligé de lâcher de l'eau : ce que je n'avois pas fait depuis que j'avois injecté la liqueur. Lorsque l'urine parvint à l'endroit où l'injection avoit séjourné , j'éprouvai une douleur cruelle , mais moins forte que je ne m'y attendois.

Après avoir bien dormi la nuit , je n'eus rien de plus pressé , le lendemain matin à mon réveil , que d'examiner la partie. Je trouvai une évacuation assez considérable de matiere puriforme , de la même couleur

jaune-verdâtre que celle des gonorrhées virulentes. La douleur que cauçoit le passage des urines étoit alors beaucoup augmentée ; & la nuit suivante , mon sommeil fut interrompu par des érections involontaires & douloureuses. Le matin du jour suivant , l'évacuation étoit beaucoup plus abondante , à-peu-près de la même couleur ; elle étoit peut-être seulement un peu plus verdâtre. La douleur que j'éprouvois en urinant , étoit cependant alors si cuisante , que je résolus de l'appaiser , en injectant un peu d'huile d'amandes douces tiédie ; & je fus beaucoup soulagé par ce moyen. L'écoulement continua pendant cinq jours , la douleur diminuant d'une manière remarquable dans la partie affectée pendant cet intervalle. Mais j'observai à cette époque qu'il s'établissoit une nouvelle inflammation plus avant dans le canal de l'uretre , à un endroit où je n'avois rien senti auparavant , & où aucune portion de l'injection n'avoit touché. Cette nouvelle inflammation tenoit , à ce qu'il me parut , depuis le bord de la première jusqu'à un certain éloignement dans le canal. Elle fut suivie d'une évacuation abondante , accompagnée des

mêmes symptômes qu'auparavant, & dura six jours, après lesquels les symptômes étoient extrêmement adoucis. Mais alors je fus bien étonné d'éprouver très-distinctement les symptômes d'une troisième inflammation, qui s'étendoit depuis le bord de la précédente vers le verumontanum, jusqu'au col de la vessie, & qui fut accompagnée d'une ardeur d'urine & d'un écoulement abondant, comme la précédente. Pour le coup, je fus sérieusement alarmé; car je m'étois constamment injecté de l'huile d'amandes douces tiède, trois fois par jour. Je voyois que l'inflammation qu'avoit d'abord excitée l'alkali volatil se communiquoit très-évidemment d'une partie de l'uretre à une autre; & cela me faisoit craindre qu'il ne s'ensuivît enfin une inflammation de toute la surface interne de la vessie, qui pouvoit avoir des conséquences dangereuses. Je demurai dans cet état entre l'espérance & la crainte, pendant sept à huit jours; mais j'éprouvai enfin, à ma grande satisfaction, que cette inflammation s'appaisoit par degrés, de même que l'évacuation, sans passer les limites de l'uretre; & je fus entièrement

54 OBSERVATIONS PRATIQUES

délivré de tous les symptomes de ces trois gonorrhées distinctes , comme je puis les appeller , à la fin de la sixieme semaine.

Si l'on ajoute aux observations dont j'ai fait mention ci-dessus, cette expérience sur moi-même, & une observation très-curieuse qui se trouve dans une dissertation que vient de publier le Docteur Ettinger de Tubinge, dans laquelle l'usage intérieur de l'huile d'olives, qu'on avoit exprimée d'un paquet de laine rouge de Turquie sur lequel elle s'étoit répandue, produisit un écoulement par l'uretre, le même en apparence que celui d'une gonorrhée virulente : on pourra juger si des substances acrimonieuses d'une espcce différente du virus vénérien, telles que l'ichor cancéreux, ou peut-être d'autres stimulus appliqués à l'uretre, ne peuvent pas quelquefois produire les mêmes symptomes, que l'alkali volatil fluor dans mon expérience, & que l'huile dans l'observation du Docteur Ettinger. Je crois fermement qu'il existe quelquefois des écoulemens, qui ressemblent à la gonorrhée produite par le virus vénérien, & qui sont produits par d'autres causes, avec cette seule différence, que

leurs symptomes font peut-être plus doux & de plus courte durée ; quoique je n'aie pu appercevoir sur moi-même aucune différence dans la couleur, dans la consistance de l'écoulement, ou dans les autres circonstances.

Je regarde donc maintenant comme parfaitement constatés les faits suivans : savoir, 1°. qu'il y a souvent des gonorrhées produites par l'application du virus vénérien à l'intérieur de l'uretre : je dis, de ce même virus vénérien qui produit des chancres, lorsqu'il est simplement appliqué au gland, au prépuce, &c. , ou la vérole lorsqu'il est absorbé dans le système entier ; & 2°. qu'il est des gonorrhées qui doivent leur origine, soit à des substances acrimonieuses, introduites dans l'uretre *ab extra*, ou peut-être quelquefois à un stimulus mécanique plus violent, excité dans l'acte de la copulation ; soit à d'autres causes qui nous sont encore inconnues. D'après cela, je crois pouvoir diviser les gonorrhées au moins en deux especes essentiellement distinctes l'une de l'autre : savoir, en celle qui procede du virus vénérien, & que j'appelle *blennorrhagia syphilitica*, & en

56 OBSERVATIONS PRATIQUES

celle qui provient d'autres substances âcres, à laquelle je donne le nom de *blennorrhagia ab acri, aut stimulo mechanico*. Nous devons régler notre pratique, en faisant attention à cette différence, tant que nous ne connoissons pas la nature des autres causes. C'est parce qu'on ignore, ou qu'on néglige cette distinction, que nous avons tous les jours le désagrément d'entendre les Empiriques vanter la prééminence de leurs remèdes ou injections spécifiques pour guérir la gonorrhée en peu de jours, pendant que les malades se plaignent quelquefois d'être tenus plusieurs semaines par les Médecins les plus expérimentés, pour une maladie qu'ils croient la même dans tous les cas.

L'écoulement qu'un homme de ma connoissance gagna, il y a quelques années, quoiqu'il eût mis en usage le meilleur, à ce qu'il disoit, de tous les préservatifs, ne provenoit pas sans doute d'une cause vénérienne; & il pourroit tout aussi-bien à l'avenir être attaqué de la même incommodité, quoiqu'il se croie maintenant en sûreté, par ce qu'il appelle une double précaution.

Il faut distinguer aussi la *blennorrhagie syphilitique simple* de celle qui est *compliquée*, ou accompagnée d'un ulcère dans l'uretère. Cette dernière n'est pas susceptible de guérison radicale sans l'usage intérieur du mercure, pendant que la première ne l'exige jamais, ou l'exige rarement.

Il faut attribuer aussi à l'ignorance ou à la négligence de la distinction entre les gonorrhées syphilitiques & celles qui proviennent d'autres causes stimulantes, la grande diversité qu'on rencontre parmi les Praticiens, relativement à la méthode curative. Les uns conseillent les astringens, tandis que d'autres ne tarissent pas sur les louanges qu'ils donnent aux émolliens. De là vient que quelques Praticiens, même du premier ordre, ayant observé que les injections astringentes étoient utiles dans quelques cas de gonorrhée, même dans la période de l'inflammation, recommandent le même remède à tous les malades atteints de cette incommodité ; mais non pas, à beaucoup près, avec le même succès. Car outre les violentes douleurs dans toute l'étendue de l'uretère, la tumeur des testicules, l'ischurie aiguë, &c. qui sont souvent les effets de ces

58 OBSERVATIONS PRATIQUES

injections, si la maladie est de nature vénérienne, & sur-tout si elle est dans son état inflammatoire ; il s'ensuit presque toujours des rétrécissemens de l'uretre, de l'espece la plus fâcheuse & la plus rebelle. Lorsqu'on néglige cette distinction nécessaire, qui s'applique également aux deux sexes, on s'expose non-seulement à mettre en danger la santé du malade, mais encore à détruire le bonheur du mariage, & à rompre sans raison les nœuds de la concorde entre les deux sexes. J'atteste que j'ai vu plus d'un exemple de ce genre.

Je n'ajouterai plus ici qu'une remarque : la plupart des hommes s'imaginent, & plusieurs Auteurs de Médecine l'ont publiquement affirmé, que la *malignité*, comme on l'appelle, ou la virulence d'une gonorrhée est toujours en proportion de la couleur de la matiere qui s'évacue, & qu'aussi-tôt que cette couleur devient plus blanche, leur écoulement n'est plus contagieux ; mais cette conclusion me paroît beaucoup trop générale ; car j'ai vu dans quelques personnes la matiere conserver sa couleur souffrée primitive jusqu'au dernier jour. Les signes les plus certains que la virulence de

la maladie est diminuée , font la cessation de l'ardeur d'urine , & la faculté de retenir son eau aussi bien que dans l'état de santé ; la diminution de l'écoulement qui prend une consistance plus épaisse , de sorte qu'elle devient gluante & s'étend en fils entre les doigts ; & l'absence de toute douleur ou titillation pendant l'érection. Cependant les seuls signes certains qu'on puisse avoir de la guérison radicale de la gonorrhée , à l'effet d'être parfaitement sûr de ne pouvoir communiquer l'infection , sont la cessation entière de l'écoulement , & l'exemption de toute douleur, titillation, ou chaleur dans l'uretre, soit pendant l'érection & l'excrétion de la semence, soit en tout autre tems ; & l'on doit assurer les malades que quoique le changement de la couleur jaune-verdâtre en blanc soit en général un présage favorable pour la guérison de la maladie , ce n'est nullement un signe certain que le virus soit entièrement expulsé.

Ayant ainsi terminé mes considérations sur la nature & les différentes especes de la gonorrhée , je vais maintenant procéder à la méthode curative.

Méthode curative.

Je dois rappeler ici ce que j'ai établi ci-devant : savoir , que toute espee de gonorrhée virulente, ou de *blennorrhagie* , est une inflammation locale excitée par un virus ou stimulus particulier. Si ce virus est vénérien, voici les indications qui se présentent naturellement à remplir dans toutes les gonorrhées de cette espee :

1°. De changer ou détruire, s'il est possible, la nature du virus.

2°. De défendre de sa virulence les parties tendres.

3°. De modérer l'irritation qu'il cause.

Les injections huileuses ou mucilagineuses , combinées avec l'opium , ou avec les préparations mercurielles les plus douces , paroissent remplir tous ces différens objets (1).

L'usage intérieur de la dissolution de gomme arabique, de l'émulsion d'amandes ,

(1) Si l'on rencontre des malades qui soient prévenus contre l'usage des injections , & qui desirant d'être traités avec des remedes intérieurs , il faut leur annoncer que la maladie peut être également bien guérie sans aucune application extérieure ; mais qu'il faudra peut-être pour cela un peu plus de tems , & l'observance d'un régime plus exact.

ou de toute autre boisson mucilagineuse prise en abondance , est toujours utile ; & il est absolument nécessaire pour les malades qui ont de la répugnance pour les injections. On peut y joindre une potion anodine le soir , suivant les circonstances.

S'il paroît des symptomes de fièvre inflammatoire , la saignée peut quelquefois être utile ; mais on obtient communément de meilleurs effets des évacuations de sang locales , & des fomentations & cataplasmes émolliens & sédatifs. D'un autre côté , quand le malade est d'une complexion faible & irritable , l'écoulement très-clair & abondant , accompagné d'une douleur aiguë & d'un pouls très-fréquent , j'ai trouvé que le quinquina donné intérieurement , avec ou sans l'opium , suivant les circonstances , fait plus de bien que toute la cohorte des antiphlogistiques. L'opium donné dans des lavemens émolliens est quelquefois singulièrement utile en pareil cas. On appaise beaucoup aussi par l'usage de ce remède les érections fréquentes & douloureuses ; mais il faut en prévenir le retour autant qu'il est possible en liant la verge en bas , & faisant coucher le malade sur le côté sur un ma-

telas , & non pas sur le dos & dans un lit de plume. Si l'érection est accompagnée d'un étranglement du gland , on emploiera le traitement indiqué ci-dessous dans l'article du *paraphymosis*.

Pour prévenir les plus violens symptomes de la gonorrhée , le malade durant son état inflammatoire , doit faire aussi peu d'exercice qu'il lui sera possible , porter un suspensoir du scrotum dès le commencement de la maladie , & garantir du froid la partie affectée autant qu'il le pourra. Le suspensoir du scrotum peut paroître superflu ; mais il est si peu pénible à porter lorsqu'il est bien fait , & il est si utile pour empêcher la tuméfaction des testicules , que je ne néglige jamais de le recommander , sur-tout à ceux qui ont déjà été attaqués de cette dernière maladie.

Quant au régime qu'on doit observer dans les gonorrhées , tous les malades en général doivent éviter avec soin l'exercice , le froid extérieur , les alimens de haut goût , & l'usage des liqueurs spiritueuses ; mais ces regles regardent sur-tout ceux d'un tempérament phlogistique , parce qu'ils souffrent pour l'ordinaire beaucoup plus , & pendant

plus long-tems de cette maladie, que les autres. Ces malades doivent se borner à une diete légère, plutôt végétale qu'animale ; ils doivent ne pas souper, & ne boire que des tisanes rafraîchissantes mucilagineuses. Au lieu que ceux d'une différente constitution ne sont pas dans le cas d'être si fort restraints.

On a autrefois recommandé les sels neutres, pour rafraîchir le sang & exciter la sécrétion de l'urine, au moyen de quoi l'on croyoit appaiser l'inflammation, & aider la nature à expulser le virus ; mais j'ai constamment trouvé qu'ils sont nuisibles. En augmentant la sécrétion de l'urine, & rendant cette humeur plus piquante, ils augmentent l'inflammation, sans produire aucun des bons effets qu'on leur attribue.

On a conservé long-tems un autre préjugé, & c'est en faveur de la purgation dans les gonorrhées. Les uns ont employé les minoratifs, d'autres les purgatifs les plus drastiques ; mais on a sur-tout recommandé de donner le calomel tous les deux ou trois jours. Je n'ai vu ni les uns ni les autres de ces remèdes faire aucun bien ; mais ils font souvent beaucoup de mal. Outre qu'ils ten-

dent à faire absorber le virus dans le système général , de même que les injections faites mal-à-propos, ils donnent souvent naissance à la tuméfaction des testicules , aux maladies de la glande prostate , à la suppression d'urine , aux ulcères de l'uretère ou de la vessie , &c. Mais quoiqu'il ne faille pas donner des purgatifs, on doit toujours tenir le ventre libre , en sorte que le malade aille tous les jours régulièrement à la selle ; & je ne doute pas que ce ne soit à ces utiles changemens qu'on a faits dans la pratique , qu'on doit l'avantage d'observer qu'il est maintenant très-rare que les gonorrhées soient suivies de symptômes de vérole ou d'ulcères de la vessie.

Voilà pour ce qui concerne le cours le plus ordinaire de cette maladie ; mais les gonorrhées vénériennes ne sont pas toujours aussi simples. Quelquefois le virus paroît être d'une acrimonie plus exaltée, ou plutôt il rencontre des constitutions d'une nature plus irritable. Il arrive souvent aussi que les symptômes sont exaspérés par un mauvais traitement , ou par la négligence des règles dont nous venons de parler. Dans ce cas , le malade éprouve en urinant une
chaleur

chaleur & une douleur plus violentes , avec une tension dans toute la longueur de l'uretre ; un desir perpétuel de lâcher de l'eau , sans pouvoir en rendre à la fois que quelques gouttes brûlantes ; de fréquentes érections , avec des douleurs lancinantes très-vives dans toute l'étendue du canal de l'uretre , mais particulièrement au frein. Quelquefois il sort des filets de sang , ou du sang pur avec l'urine , & l'on commence à appercevoir des marques évidentes d'une exulcération de l'uretre. Indépendamment des remèdes qui sont indiqués ci-dessus , l'usage des fumigations ou des frictions mercurielles au périnée & à la partie interne des cuisses , fournit un moyen curatif des plus efficaces en pareil cas.

On peut employer avec avantage le même traitement , lorsque par une cause quelconque l'écoulement de la gonorrhée vénérienne se trouve arrêté ou supprimé pendant la période de l'inflammation , par des injections âcres ou astringentes , ou même par les injections les plus appropriées ; si on n'a pas su les appliquer d'une manière convenable ; par des purgatifs drastiques , ou par des minoratifs trop répétés ; par

l'usage prématuré de la térébenthine ou des balsamiques ; par l'exercice violent , & surtout par le froid qu'aura essuyé la partie affectée. Le virus semble quitter alors son siege naturel sous le frein , pour se loger plus avant dans l'uretre , comme , par exemple , à l'endroit où les canaux excrétoires des vésicules séminales & de la glande prostate s'ouvrent dans ce canal ; & il produit , dans ce cas , une tumeur à l'un des testicules , ou à tous les deux : ou si le virus s'est porté plus avant encore , jusqu'au col de la vessie , le malade est tourmenté d'un desir continuel d'uriner , sans pouvoir y parvenir , ou bien il ne peut rendre à la fois que quelques gouttes d'urine. Il est alors quelquefois pendant un quart-d'heure hors d'état de se tenir debout , & souvent tout cela aboutit à une suppression totale des urines. Le virus ne produit pour l'ordinaire , dans tous les différens sieges qu'il occupe dans l'uretre , qu'une inflammation superficielle ; quoiqu'il arrive assez fréquemment qu'à raison de son acrimonie , ou faute d'une suffisante quantité de mucus pour le délayer , il cause dans l'uretre une excoriation & une exulcération , qui ne manquent jamais de produire un

écoulement opiniâtre, & d'occasionner l'infection totale de la masse des humeurs.

Je ne dois pas oublier, en traitant des terribles conséquences de la suppression ou de la suspension de la gonorrhée, de faire mention d'une maladie qui est peut-être la plus déplorable de toutes les affections vénériennes. Je veux dire une violente inflammation aux deux yeux, ou du moins à un seul, souvent accompagnée d'un écoulement de matière puriforme, entièrement semblable par sa couleur & par sa consistance à celle de la gonorrhée, & dont l'aveuglement complet est la terminaison ordinaire. Dans d'autres cas, au lieu d'une ophthalmie, on observe une surdité plus ou moins complète. Quoique je ne sois nullement en état d'expliquer comment ces affections peuvent suivre immédiatement la suppression des gonorrhées, sur-tout lorsqu'elle est occasionnée par le grand froid (car je ne les ai jamais observées que dans des climats froids ou dans des saisons extrêmement rigoureuses), je suis convaincu de la réalité du fait. J'en parlerai plus au long ci-dessous à l'article de l'*ophthalmie vénérienne*.

Il me reste à faire ici une remarque qui peut être très-importante : toutes les incommodités produites par la rétropulsion des gonorrhées ont très-souvent des conséquences si malheureuses, qu'un Médecin honnête doit dans des cas aussi graves ne pas s'en tenir à l'opinion des autres ; mais ne se laisser guider dans sa conduite que par la justice & la conscience, & faire tout ce qu'il lui est possible pour guérir, ou pour soulager son malade. Je révélerai donc ici que j'ai essayé dans quatre cas de tumeurs des testicules & de suppression d'urine provenant d'une gonorrhée répercutée, l'inoculation du virus vénérien par le moyen d'une bougie, avec un succès inespéré. Je me crois obligé à ne pas cacher cette vérité, quoique je m'expose peut-être à en être blâmé. Nous sommes consultés pour donner du soulagement, & par conséquent nous faisons notre devoir en proposant un remède que le malade est toujours le maître d'accepter ou de refuser.



CHAPITRE III.

DES GONORRHÉES HABITUELLES.

ON donne communément le nom de *gonorrhées habituelles* ou *bénignes* aux écoulemens qui continuent après que les symptômes inflammatoires de la gonorrhée ont disparu depuis quelque tems ; & ce nom est purement relatif à cette dernière , qu'on appelle *gonorrhée maligne* ou *virulente*.

La gonorrhée habituelle naît principalement de l'une des deux causes suivantes ; 1°. du simple relâchement des orifices des vaisseaux, qui ont été irrités, enflammés, & ont perdu par ce moyen une partie de leur faculté de se contracter ; 2°. d'une exulcération ou d'une érosion dans quelque partie de l'uretre. J'ai donné à la première le nom de *blennorrhœa simplex*, & à la dernière celui de *blennorrhœa complicata*, qui sont les dénominations qui me paroissent leur convenir. Voy. ci-dessous le tableau nosolog.

Dans la première espèce, après que l'inflammation & l'irritation occasionnées par la gonorrhée se sont calmées, les vaisseaux

70. OBSERVATIONS PRATIQUES

qui fournissent cette évacuation continuent de verser plus abondamment que dans l'état naturel, ou une matiere de la même apparence puriforme, ou seulement une espece de mucosité plus claire. Quelquefois ces écoulemens commencent à paroître après la copulation, après un exercice un peu fort, ou après une débauche de table, quoique l'écoulement de la gonorrhée précédente eût entierement cessé quelques jours ou quelques semaines auparavant.

Les écoulemens de cette premiere espece ne sont pour la plupart que des maladies locales, simples restes d'une gonorrhée qui n'est pas parfaitement guérie ; mais on doit regarder ceux de la seconde espece comme les suites d'une gonorrhée très-violente ou compliquée, & ils sont pour l'ordinaire accompagnés de l'infection de la masse générale des humeurs.

On voit par-là que la nature & le siege des écoulemens habituels peuvent être aussi variés que ceux des gonorrhées ; mais selon le lieu qu'occupe leur source, le tems qu'ils ont duré & la cause qui les a produits, la maniere de les traiter doit être différente,

& devient plus ou moins difficile & compliquée.

Les écoulemens habituels qui ont leur siege dans l'uretre sous le frein sont les plus faciles à guérir. Ceux qui tirent leur origine d'ulceres dans l'uretre, & qui durent depuis quelque tems, sont beaucoup plus opiniâtres ; & ceux qui ont leur source dans l'érosion des canaux excrétoires des vésicules féminales ou de la glande prostate, ou dans des ulceres à la vessie, sont les plus rebelles de tous. En général, plus le siege des écoulemens habituels est situé profondément dans le canal de l'uretre, plus ils sont sujets à produire des difficultés d'uriner, ou des rétrécissemens de l'uretre & des suppressions d'urine, & plus il est difficile d'en procurer la guérison.

J'ai toujours trouvé que les écoulemens qui suivent une gonorrhée simple ne sont de même qu'une simple maladie locale, & ne doivent leur existence qu'à un relâchement des petits vaisseaux, qui subsiste après que l'inflammation est appaisée ; mais les écoulemens qui se manifestent après une gonorrhée violente ou mal traitée sont généralement accompagnés d'une excoriation

ou d'une exulcération de l'uretre. Dans ce cas le virus vénérien a été communément absorbé, & par conséquent la masse générale est plus ou moins infectée.

Comme il est de la plus grande importance de constater ces différentes circonstances, quoique cela soit quelquefois extrêmement difficile, je vais tâcher de détailler en peu de mots les symptomes les plus remarquables par lesquels on peut reconnoître s'il y a quelque ulcere dans l'uretre. 1°. On voit des filets de sang dans le mucus qui découle, ou bien il sort du sang pur, pendant la période inflammatoire de la gonorrhée, comme on l'a vu ci-dessus ; mais plus particulièrement après que la violence de l'inflammation est calmée. 2°. Il s'évacue par l'uretre une matiere vraiment purulente, ou ichoreuse, en plus ou moins grande quantité. 3°. Le malade éprouve une douleur circonscrite dans une partie de l'uretre ; mais il la sent plus particulièrement lorsqu'on introduit une sonde ou qu'on presse l'uretre extérieurement. 4°. Une douleur aiguë se fait sentir dans un endroit particulier de l'uretre, sur-tout au moment du passage de la dernière goutte d'urine, ou dans

l'émission de la semence. . . . Quoique tous ces symptômes indiquent assez clairement un ulcère, on sera beaucoup plus certain de son existence, si les symptômes de l'inflammation qui a précédé ont été très-violens ; si le malade a été mal traité, ou même, comme je l'ai vu quelquefois, si l'on a fait quelque blessure à l'uretère en se servant mal-adroitement de la seringue à injections, ou en appliquant la sonde trop rudement, pendant la période inflammatoire.

Si l'on ne fait pas attention à ces signes, qui annoncent suffisamment l'existence d'un ulcère dans l'uretère, on risque d'échouer souvent dans le traitement ; c'est pourquoi, toutes les fois que nous sommes consultés pour un écoulement invétéré, notre premier soin doit être d'examiner s'il provient d'un simple relâchement, ou d'un ulcère dans l'uretère ; & dans ce dernier cas, si c'est une maladie universelle ou simplement locale. Lorsqu'il existe un ulcère, il faut savoir le lieu qu'il occupe dans l'uretère, si l'on veut porter un pronostic assuré.

Lorsque la maladie est purement locale, on peut la guérir, soit par des applications

topiques astringentes , soit par des remèdes internes , corroborans ou balsamiques , soit par la réunion de ces deux moyens. J'ai trouvé que les meilleurs topiques qu'on puisse employer dans ce cas , sont les injections préparées avec du vitriol blanc dissous dans l'eau , & auquel on mêle au besoin quelques grains de chaux de plomb ou de bol d'Arménie ; ou avec du calomel suspendu dans l'eau ou dans quelque fluide mucilagineux ; ou bien avec une dissolution de vitriol bleu ou d'alun ou de verd-de-gris. Chacune de ces injections peut être utile en certaines circonstances. Je parlerai ci-dessous des remèdes intérieurs qui sont recommandés pour le même objet.

Si la maladie est universelle , c'est-à-dire , accompagnée de l'infection de tout le système , comme cela arrive le plus communément , lorsqu'il y a une exulcération de l'uretère ; il faut employer , outre les remèdes topiques , ceux qui sont appropriés au traitement de la vérole même. Dans ce cas , il est impossible de guérir l'écoulement avant d'avoir purifié la masse générale. Quand cela est fait , ou pendant qu'on y travaille , j'ai trouvé qu'une dissolution

de sublimé corrosif & de litharge dans le vinaigre, délayée avec une suffisante quantité d'eau, & injectée deux ou trois fois par jour, est un excellent remede.

Je ferai, au sujet des injections en général, deux observations essentielles, dont la négligence peut quelquefois nous faire échouer dans le traitement, quoique nous ayons employé les meilleurs remedes. La seringue dont on se sert pour cet effet, doit avoir une canule courte, mais de la grosseur qu'il faut pour qu'elle entre de justesse dans l'orifice de l'uretre, & le piston doit s'appliquer exactement aux parois intérieures du tube. Si la canule est beaucoup plus petite que l'orifice de l'uretre, il en résulte deux inconvéniens considérables. Le premier est qu'avec une petite canule, sur-tout si elle n'est pas bien unie, le malade se blesse facilement l'intérieur de l'uretre, s'expose par ce moyen à l'exulcération de cette partie, & par conséquent à l'absorption du virus ; le second est que le liquide injecté, au lieu d'avancer dans la cavité de l'uretre, reflue par les côtés hors de son orifice. Si le piston ne remplit pas exactement le corps de la seringue,

76 OBSERVATIONS PRATIQUES

quand même la canule seroit assez grande pour boucher parfaitement l'orifice de l'uretre , la liqueur regorge encore entre le piston & la seringue , au lieu d'entrer dans l'uretre , & ainsi le malade peut s'imaginer qu'il a injecté la liqueur comme il faut , tandis qu'il n'en est peut-être entré qu'une très-petite quantité. Mais quoique la seringue soit faite de la maniere la plus convenable , & qu'on ait donné en même-tems au malade les instructions les plus exactes , il exécute très-souvent l'opération d'une façon si mal-adroite , qu'elle ne produit aucun bon effet.

Lorsqu'on s'est procuré une seringue de forme convenable , il faut en appliquer exactement la canule dans l'orifice de l'uretre , enforte que par sa forme conique , elle interdise au liquide tout passage entre elle & les parois de l'uretre. Si la maladie gît dans le siege ordinaire des gonorrhées , c'est-à-dire , précisément au-dessous du frein , il faut que le malade , d'une main , comprime son uretre à la premiere courbure de la verge où commence le scrotum , pendant qu'il tient & ménage la seringue avec les doigts de son autre main. Il pous-

fera alors lentement & avec douceur le piston , qui doit toujours glisser facilement , quoique de justesse , dans le corps de la seringue , jusqu'à ce qu'il sente l'uretre suffisamment dilaté. Il gardera ainsi le liquide injecté pendant une minute ou deux , & répétera la même opération trois ou quatre fois. Lorsqu'on pousse inconsidérément ou trop long-tems le piston , l'irritation qui en résulte dans l'uretre , fait souvent plus de mal , que l'injection ne peut faire de bien.

En se conformant à ces préceptes , on se procure un double avantage : le liquide est appliqué convenablement à la partie affectée , & en même-tems l'on ne risque pas de pousser le virus vénérien plus avant dans l'uretre avec le liquide injecté ; mais cette précaution n'est pas nécessaire lorsque le siege de la maladie est situé plus profondément.

Pour ce qui est du liquide même , dans les cas de gonorrhée virulente , il faut toujours l'employer tiède ; mais dans les écoulemens habituels cela n'est pas nécessaire. Dans les gonorrhées , si le liquide est trop froid ou trop chaud , il peut aisément nuire au ma-

lade, soit en répercutant la matiere, soit en augmentant l'inflammation. Il est souvent nécessaire de bien agiter la liqueur avant de l'injecter. Il est facile de la faire chauffer dans une tasse qu'on en remplit à moitié, & qu'on met dans un bassin d'eau chaude. Dans tous les cas, avant de faire aucune injection, le malade doit se présenter pour lâcher de l'eau.

L'autre observation que j'ai à faire, est que les jeunes gens qui ont des écoulemens habituels, après avoir fait usage des injections pendant quelque tems, & se trouvant infiniment mieux, deviennent moins attentifs en faisant cette opération, & même négligent quelquefois tout-à-fait de faire l'injection, pendant une demi-journée ou une journée entiere. La conséquence de cette omission est quelquefois désagréable. Et j'ai vu plusieurs cas où les malades ayant négligé un seul jour de faire l'injection, l'écoulement a été beaucoup augmenté, comme si ç'eût été une nouvelle gonorrhée ; & la rechûte étant plus obstinée que la maladie primitive, ils ont été obligés de continuer les injections pendant plus de semaines qu'il n'auroit peut-être fallu de jours pour guérir

la maladie, s'ils n'eussent pas interrompu l'usage des remèdes.

Afin de prévenir tout danger de rechûte, j'ordonne pour l'ordinaire à mes malades de faire les injections, trois, quatre, ou, suivant les circonstances, six fois par jour pendant la maladie, & de continuer de même régulièrement encore dix à douze jours, après que l'écoulement est entièrement tari.

Il faut aussi des seringues de forme convenable pour les femmes, si nous voulons obtenir de bons effets des injections qui leur sont administrées, comme je le dirai plus bas à l'article *des ulcères vénériens*.

Indépendamment des injections, les bougies sont d'une grande utilité dans les gonorrhées habituelles, sur-tout lorsque l'ulcère est situé dans la partie inférieure de l'uretre : on peut les employer ou seules ou conjointement avec des injections convenables. Il ne faut les garder, pendant les trois ou quatre premiers jours, qu'un quart-d'heure ou une demi-heure à la fois, jusqu'à ce que le malade y soit accoutumé, de manière qu'il puisse les supporter plus longtemps ; & ensuite on peut les garder plusieurs

heures matin & soir, ou enfin tout le jour & toute la nuit. On doit laisser entièrement au jugement du Médecin de déterminer si les bougies qu'on emploie doivent être d'une qualité irritante ou sédative. Les circonstances de la maladie lui indiqueront si ce sont les premières ou les dernières qui conviennent. Il faut cependant se ressouvenir qu'avant l'application des bougies, ainsi que des injections, le malade doit toujours essayer de vider sa vessie, afin de donner au remède le tems de produire ses effets sur la partie affectée. Si l'application de la bougie produit, comme je l'ai quelquefois observé, une tension & une douleur dans le cordon spermatique, ou une tuméfaction du testicule, il faut en suspendre l'usage pendant quelques jours. J'ai trouvé quelquefois aussi qu'une bougie trop grosse produisoit cet effet, & qu'il cessoit dès qu'on se servoit d'une plus mince. En général, il faut préférer les bougies minces aux grosses dans les commencemens.

Si l'on ne réussit point à opérer la guérison, soit par l'usage des bougies, soit par celui des injections, dont on a parlé ci-dessus, il sera à propos d'injecter des liquides capables

capables d'exciter une irritation & une inflammation dans l'uretre, & sur-tout dans la partie affectée. Ce moyen a souvent réussi après que les meilleurs astringens avoient échoué. On peut employer pour cet effet une injection faite avec du sublimé corrosif & de la litharge, ou avec une simple dissolution de sublimé corrosif dans l'eau, ou avec le calomel suspendu à grande dose dans quelque liqueur mucilagineuse.

Le Docteur Cullen a observé que des écoulemens opiniâtres ont quelquefois été guéris par un exercice violent & long-tems continué à cheval : tel qu'un voyage d'Edimbourg à Londres ; & il est probable que ce moyen procure la guérison en excitant une inflammation dans les parties affectées, comme peuvent le faire les injections que nous venons de recommander. De pareils écoulemens ont quelquefois été guéris par la copulation : ce qu'on peut expliquer par les mêmes principes. Mais c'est un remède qu'un Praticien honnête ne peut jamais prescrire ; parce que ces écoulemens sont quelquefois de nature virulente, & l'on communiqueroit certainement par ce moyen la maladie vénérienne à une femme saine ; ou

si elle ne l'étoit pas , l'homme risqueroit de gagner non-seulement une nouvelle gonorrhée , mais encore la vérole , si son propre écoulement provenoit d'un ulcere dans l'uretre.

Indépendamment des remedes dont nous avons fait mention , on peut , dans des écoulemens d'une nature très-opiniâtre , en appliquer quelques autres : tels que la teinture de cantharides prise à l'intérieur , ou des injections d'huile de térébenthine ou d'infusion de noix de galle , &c. Un de mes amis m'a rapporté qu'il avoit vu guérir un écoulement rebelle par une injection de teinture d'ipécacuanha , & qu'il avoit observé quelques autres cas dans lesquels une petite commotion électrique , reçue à travers l'uretre , avoit procuré la guérison. Je ne peux rien dire touchant l'effet de ces remedes , n'ayant jamais eu l'occasion de les éprouver ; je n'en fais mention que parce qu'on est quelquefois embarrassé pour trouver des remedes dans des affections très-opiniâtres de cette espece.

On a encore recommandé les bains d'eau froide dans des écoulemens obstinés , & j'en ai vu quelquefois de très-bons effets ;

mais j'ai vu aussi, dans deux ou trois occasions, qu'ils ont certainement augmenté l'écoulement. D'autres ont observé le même effet. Le bain de mer est très-avantageux ; & l'on se trouve bien aussi de laver les parties génitales avec de l'eau froide, soit pure, soit mêlée avec du vinaigre.

On peut combattre les gonorrhées habituelles avec trois sortes de remèdes *internes*, chacun desquels peut être employé, soit seul, soit combiné, selon l'exigence des cas, avec les applications locales dont nous avons fait mention plus haut : ce sont,

1°. *Les remèdes mercuriels*. Ils sont toujours nécessaires, lorsque la maladie provient d'un ulcère dans l'uretère, sur-tout s'il est invétéré, ou lorsque la masse générale a reçu l'infection. En pareil cas, les pilules faites avec de la térébenthine & du mercure sont souvent très-convenables.

2°. *Les balsamiques*. Parmi ceux-ci, celui qu'on emploie le plus communément est le baume de Copahu. Le malade peut en prendre de cinquante à cent gouttes dans un verre d'eau fraîche, une fois par jour à midi, ou deux fois par jour,

matin & soir. Immédiatement après le baume il faut avaler, aussi dans un verre d'eau, de vingt à cinquante gouttes d'elixir acide de vitriol, afin de rendre le premier remede moins défagréable à l'estomac. Une demi-drachme de térébenthine, ou une drachme de baume tranquille suppléent parfaitement au copahu, & remplissent le même objet. J'ai eu l'exemple d'un jeune homme, qui, ayant avalé tout à la fois une très-grande quantité de baume de Copahu, fut guéri d'un écoulement habituel des plus opiniâtres.

3°. *Les corroborans.* Parmi ceux-ci, le quinquina en poudre, ou en infusion dans du vin rouge, ou, ce qui quelquefois vaut beaucoup mieux, infusé dans l'eau de chaux, soit seul, soit joint avec quelque autre puissant astringent, est quelquefois un remede efficace dans des cas où tous les autres ont échoué. Il arrive cependant quelquefois que tous nos efforts pour guérir un écoulement habituel, sont inutiles; & nous voyons des cas dans lesquels la nature seule opere avec le tems une guérison, après que nous avons inutilement & ennuyeusement épuisé toutes les ressources de l'Art.

Il est des écoulemens habituels qui sont produits , comme nous l'avons dit plus haut , par une cause singuliere , dont nous avons quelques exemples dans les dissections anatomiques ; & c'est lorsque deux ulceres de l'uretre se trouvent placés à-peu-près vis-à-vis l'un de l'autre. Dans ce cas , quelques-unes de leurs parties s'abouchent mutuellement , formant une espee de bande à travers l'uretre avec une petite exulcération au-dessous. Il en résulte , non-seulement un écoulement très-opiniâtre , qui se joue de tous les remedes ; mais encore très-souvent une strangurie , dans laquelle l'urine ne peut sortir qu'en un très-petit filet , & s'arrête même quelquefois tout-à-fait. Le seul remede qu'il y ait dans ce cas , si l'on a quelque raison de soupçonner l'existence de cette cause , c'est l'opération chirurgicale. Quoique dans quelques cas où les bandes ne seroient pas trop fortes , on pût les rompre en introduisant un stilet ou une sonde dans l'uretre. Je laisse à juger à mes Lecteurs si l'écoulement très-fâcheux & très-obstiné , dont il est question dans l'observation suivante , appartient ou non à cette classe.

86 OBSERVATIONS PRATIQUES

Je fus consulté il y a quelques années par un homme de qualité, concernant une gonorrhée habituelle dont il avoit été affligé pendant environ dix ans, & pour laquelle il avoit consulté les Médecins & les Chirurgiens en différens pays. Quelquefois l'écoulement s'arrêtoit pendant quelques jours. Il reparoissoit ensuite de lui-même, sur-tout après l'exercice du cheval, ou après la copulation. Dans ces occasions, le malade éprouvoit toujours quelque mal-aise, & le lendemain un petit écoulement qui ne cessoit que pour reparoître à la répétition de la même cause. Cette incommodité l'inquiétoit d'autant plus, qu'il étoit dans l'intention de se marier. En examinant ce malade, je trouvai que le siege du mal étoit très-avant dans l'uretre, vers l'endroit que les Anatomistes appellent *verumontanum*. Je lui fis faire tous les remedes tant internes qu'externes dont je pus m'aviser; mais je ne pus opérer une guérison radicale. Je regardai sa maladie comme un ulcere calleux; & d'après cette supposition, je lui fis porter des bougies pendant plus de deux mois sans le moindre effet. Étant obligé de continuer mes voyages, je le laissai très-peu soulagé

par tout ce que j'avois fait. Et comme il se propoſoit d'aller à Paris , je lui conſeillai d'y conſulter toutes les perſonnes de l'Art qu'il croiroit en état de le ſoulager. Voici quel fut le réſultat de ſon voyage , tel qu'il me l'écrivit lui-même dans la ſuite.

» Après mon arrivée à Paris , j'y conſul-
» tai , conformément à votre avis , tous les
» gens de l'Art les plus renommés. Leurs
» différentes opinions ſur la cauſe , la na-
» ture & le traitement de ma maladie me
» rendirent plus inquiet que je n'étois au-
» paravant. Quelques-uns me conſeillèrent
» un nouveau traitement mercuriel , d'au-
» tres preſcrivirent différens remèdes tant à
» l'intérieur qu'à l'extérieur. Je leur mon-
» trai toutes les différentes ordonnances
» que vous m'aviez faites ſucceſſivement.
» Ils furent ſurpris qu'aucun de ces remèdes
» étant appliqué à propos , n'eût réuſſi. Ce-
» pendant on m'ordonna quelques nou-
» velles injections & quelques remèdes in-
» ternes , plutôt , je penſe , afin de me fati-
» faire pour mon argent , que dans l'eſpé-
» rance de me faire aucun bien réel. Je fus
» en effet pendant trois ou quatre mois
» précifément dans le même état que lorſ-

88 OBSERVATIONS PRATIQUES

„ que j'étois arrivé à Paris. Mais quelque
 „ surprenant que ceci vous paroisse, le der-
 „ nier homme de l'Art qu'on me recom-
 „ manda de consulter, me parut le plus
 „ ignorant auquel je me fusse encore
 „ adressé ; il me dit qu'il étoit obligé de
 „ sonder avec l'algalie le passage de l'uretre
 „ afin de s'assurer de l'endroit affecté, &c.
 „ En conséquence il l'appliqua : elle entra
 „ comme à l'ordinaire très-facilement jus-
 „ qu'à ce qu'elle atteignît au siege de la
 „ maladie, où elle éprouva le même obs-
 „ tacle qu'elle y avoit toujours rencontré,
 „ & dont je l'avois prévenu. Malgré cela il
 „ s'efforça de la pousser plus avant ; je lui
 „ dis qu'elle me faisoit une douleur exces-
 „ sive, mais il la força imprudemment, &
 „ elle passa outre. Il sortit aussi-tôt du sang
 „ de l'uretre ; cet homme me parut s'en ef-
 „ frayer beaucoup, il me demanda excuse,
 „ retira son instrument, reçut son paie-
 „ ment & sortit, me laissant très-mécon-
 „ tent de l'avoir employé. Je m'attendois
 „ à être plus mal le lendemain, & à souffrir
 „ beaucoup de sa mal-adresse ; mais ce fut
 „ tout le contraire. Je suis délivré de ma
 „ maladie depuis deux mois ; je monte à

» cheval, je vois des femmes, sans en éprou-
» ver aucun mauvais effet, & conséquem-
» ment je me trouve radicalement guéri.
» L'amitié que je vous dois pour les peines
» que vous avez prises à mon sujet, m'en-
» gage à vous faire part de ce cas parti-
» culier, qui peut vous être de quelque uti-
» lité, & que vous expliquerez peut-être
» mieux que ceux à qui j'en ai fait part
» depuis. »

Les écoulemens habituels qui proviennent de grandes & profondes érosions aux orifices des canaux de la semence, ou des excrétoires de la glande prostate, comme aussi ceux qui doivent leur origine à des ulcères de la vessie, sont très-souvent incurables. Quant à ceux qui sont susceptibles de guérison, je ne saurois entrer dans l'examen de leurs causes & de leur traitement sans excéder les bornes que je me suis prescrites dans ce Traité.

Dans tous les écoulemens habituels & opiniâtres qui ont leur siège fort avant dans le canal de l'uretère, nous devons examiner avec soin l'état de la glande prostate. Car ils doivent fréquemment leur origine à une maladie de cette partie. Lorsque cette

glande se trouve tuméfiée & dure après un traitement mercuriel, j'ai vu l'application réitérée des ventouses au périnée, & l'usage du suc épais de la ciguë de Storck (*conium maculatum. Linn.*) à grandes doses, réussir parfaitement après que tous les autres remèdes avoient échoué.

Je renvoie au Chapitre de l'*Ischurie* pour le traitement des écoulemens habituels, qui sont compliqués avec des rétrécissemens de l'uretre, & accompagnés de plus ou moins de difficulté d'uriner.

Les écoulemens qui proviennent, soit d'une foiblesse ou d'un relâchement, soit quelquefois d'une trop grande irritabilité des canaux dont je viens de parler, sont justement appelés du nom de *gonorrhée* (*fluxus seminis*). Dans ces cas-là, c'est vraiment du sperme qui s'évacue quelquefois sans érection, ou sans aucun sentiment de volupté : soit qu'il suinte continuellement, soit qu'il ne sorte que de tems à autre par des pollutions nocturnes ou diurnes, qui affoiblissent le sujet. Quelquefois il ne s'évacue que lorsqu'on va à la selle, & que les excréments durcis pressent, en passant dans le rectum, sur les

vésicules féminales & sur la glande prostatée, & forcent ainsi les orifices de leurs canaux excrétoires, qui sont dans un état de relâchement. Cependant cette maladie ne provient point d'infection vénérienne, & rarement de l'abus des plaisirs de Vénus. Sa cause la plus générale est la masturbation, & conséquemment elle n'entre point dans mon plan actuel. Elle exige un traitement très-attentif & très-prudent ; sans quoi le malade devient la victime de cette espèce de consommation que nous appellons avec Hippocrate *Tabes dorsalis*. Je n'ose pas prendre sur moi de déterminer si la maladie dont il est parlé dans l'ancien Testament, étoit un écoulement de cette espèce, ou d'une nature différente.

TABLEAU NOSOLOGIQUE

servant d'éclaircissement aux deux
Chapitres précédens.

Clas. *Locales.*

Ord. *Phlogoses.*

Genus, BLENNORRHAGIA. *Anglis*,
Clap : *Germanis*, Tripper, *Gallis*,
Chaude-pisse : *Italīs*, Gonorrhœa.

Character in Viris. Titillatio præcipue in urethræ parte anteriore sub frænulo ; subsequente post biduum aut quatrimum, phlogosi locali, cum ardore & dolore in mingendo ; accedente stillicidio materie puriformis ex urethra, corpore cavernoso urethræ præternaturaliter turgescente, plerumque cum erectionibus membri virilis solito frequentioribus, dolorificis.

In Fæminis. Titillatio ad orificium vaginæ externum ; subsequente post biduum aut quatrimum dolore, rubore & tumore præternaturali præcipue (ad rapham) prope commissuram labiorum vulvæ inferiorem ; accedente ardore & dolore ejusdem partis in mingendo : cum stillicidio materie puriformis ex vulva.

Gonorrhœa

Gonorrhœa virulenta

Gonorrhœa maligna

Gonorrhœa venerea

Fluor albus venereus, s. malignus

Leucorrhœa venerea.

} auctorum.

Variat ratione sedis.

Blennorrhagia balani , f. gonorrhœa	} <i>Materia fluente,</i>
spuria	
_____ urethralis	
_____ vesicalis	
_____ labialis	
_____ vaginalis	
_____ uterina	
_____ nasalis	
	ex glande.
	ex urethra.
	e vesica.
	e labiis vulvæ.
	e vagina.
	ex utero.
	e naribus.

Species sunt ,

Blennorrhagia syphilitica ,

α. Simplex.

ℓ. Complicata , f. ulcerosa.

γ. An a viru syphilitico e massa deposito ?

Blennorrhagia ab acri externo applicato.

Blennorrhagia a stimulo interno applicato.

Blennorrhagia a causa ignota.

Sequela Blennorrhagiæ est ,

BLENNORRHOEA. *Anglis* , Gleet : *Germanis* ,
Nachtripper : *Gallis* , Gonorrhée invétérée , ou
habituelle.

Character. Stillicidium humoris puriformis , aut muci
limpidi , ex urethra in viris , ex orificio vaginæ in
fœminis præternaturalis , sine libidine aut dysuria.

Gonorrhœa benigna	} auctorum.
Gonorrhœa inveterata	
Fluor albus benignus	
Leucorrhœa	

Variat ratione sedis ut Blennorrhagia.

94 OBSERVATIONS PRATIQUES

Species practico notatu necessariae sunt,

Blennorrhœa simplex, a relaxatione vasorum.

Blennorrhœa complicata,

α. cum ulcere,

β. cum scirrho prostatæ.

Sequelæ Blennorrhagiæ syphiliticæ retro-
pulsæ sunt,

Tumor testiculorum.

Ischuria urethralis.

Ophthalmia.

Dysecœa.

Fluxus puriformis ex oculis.

————— ex auribus.

————— e naribus.

Syphilis.

Genus, GONORRHŒA.

Character. Excretio feminis aut muci prostatæ præ-
ternaturalis, cum vel sine erectione & libidine;
accedente dolore lumborum & atrophia.

Gonorrhœa

Pollutio nocturna debilitans

Excretio feminis involuntaria

} auctorum.

Species sunt,

Gonorrhœa a relaxatione vasorum.

Gonorrhœa ab ulcere aut erosione ductuum excretorio-
rum prostatæ & vesicularum seminalium.

Gonorrhœa a nimia irritabilitate, potissimum per mastur-
pationem inducta.



C H A P I T R E I V.

De la tumeur vénérienne des testicules.

LORSQU'UNE gonorrhée ou chaude-pisse a été traitée avec des remèdes contraires , ou lorsque le malade qui en est attaqué fait un exercice trop violent , & sur-tout s'il essuye du froid à la partie affectée , soit en l'exposant à un courant d'air , soit en la lavant avec de l'eau froide , l'un des testicules , & quelquefois tous les deux , commencent à se tuméfier , & la tumeur devient souvent d'une grosseur énorme , accompagnée de tous les symptômes d'une inflammation locale. Il s'y joint quelquefois une irritation générale dans tout le corps , & une fièvre violente. On appelle cette maladie *tumeur vénérienne des testicules* , ou *chaude-pisse tombée dans les bourses* , & quelquefois , quoique très-improprement , *hernie humorale*.

L'écoulement de la gonorrhée cesse entièrement ou en partie avant la tuméfaction ; mais quelquefois cela n'arrive , du moins à un degré sensible , qu'un jour ou deux après

que l'enflure a commencé de paroître.

On avoit anciennement supposé , faute de connoissances anatomiques sur la marche des vaisseaux lymphatiques , que cette tuméfaction & cette inflammation étoient produites par l'absorption du virus , & par une métafase de la gonorrhée dans le testicule même ; mais on convient maintenant que tous ces effets ne sont dûs qu'à l'irritation que le virus , qui s'est porté plus avant dans le canal de l'uretre , occasionne aux orifices des canaux excrétoires des vésicules séminales. J'espere rendre cette théorie plus évidente , au moyen des observations que je rapporterai sur la nature & le siege de cette maladie , & de la méthode curative que j'ai trouvé la plus efficace dans les cas de cette espece.

Ç'a été jusqu'ici l'opinion générale , que le testicule même est toujours la partie affectée dans cette maladie. Mais au moyen d'un examen plus attentif & plus exact , je trouve 1°. que le testicule n'est jamais enflé , & que l'épididyme est la seule partie affectée & tuméfiée ; ce dont il est facile de se convaincre en examinant la chose avec soin. Je dis que le testicule n'est jamais affecté le
moins

moins du monde dans le commencement , ou pendant les cinq ou six premiers jours ; & s'il devient affecté dans la suite , ce n'est que l'effet d'un mauvais traitement. 2^o. J'ai constamment observé que la fièvre qui souvent accompagne ces maladies , sur-tout dans les constitutions irritables , n'est jamais une affection primitive , mais seulement un symptôme concomitant , & une conséquence de cette irritation locale ; & que par cette raison , moyennant la méthode que j'indiquerai ci-dessous , il est presque toujours au pouvoir du Médecin , s'il est appelé à tems , d'empêcher que la fièvre ne se mette de la partie.

Je crois qu'il est inutile d'expliquer ici de quelle maniere l'irritation que cause le virus répercuté dans la partie inférieure de l'uretre produit cette tuméfaction de l'épididyme ; mais la connoissance de la cause nous fait voir clairement comment il arrive qu'après que l'enflure d'un testicule est passée , l'autre est quelquefois attaqué , & qu'après qu'une suppression d'urine provenant d'une gonorrhée répercutée est dissipée , on éprouve quelquefois une tumeur des testicules. Cela vient de la transposition

ou du changement de lieu du virus. On expliquera aussi en connoissant la nature de cette maladie, pourquoi un homme qui a été une fois affecté de la tumeur vénérienne des testicules, en est si aisément attaqué une seconde fois. Mais afin d'établir pour cette maladie une méthode curative plus raisonnable & plus efficace que celles qu'on a pratiquées jusqu'à présent, je devois observer que cette tumeur est causée par l'irritation que produit le virus transporté dans un différent endroit de l'uretre, & non pas dans le testicule même ; & en second lieu, que ce n'est pas une inflammation du testicule, comme on l'a généralement cru jusqu'ici, mais seulement une enflure de l'épididyme. J'ai vérifié ce fait dans tous mes malades, & je l'ai vu particulièrement confirmé dans deux cas, où la simple application d'une bougie trop grosse a occasionné une tumeur du même genre, qui a été guérie sans aucun autre remède que de cesser d'employer cette bougie : ce qui montre d'ailleurs que toute irritation des orifices des canaux excrétoires des vésicules séminales peut occasionner cette maladie (1).

(1) Quelques Auteurs font mention d'une autre espece de

Après avoir rapporté ces observations sur la nature & sur l'origine d'une affection qui est quelquefois suivie de conséquences très-fâcheuses , je dois d'abord établir les règles qu'il faut suivre pour l'éviter ; ce sont celles que l'expérience m'a montré les plus efficaces. Je passerai ensuite aux observations que j'ai faites sur les moyens de la guérir lorsqu'elle a lieu.

Si l'on veut prévenir la tuméfaction des testicules , il faut éviter avec le plus grand soin tout ce qui est propre à causer la répercussion de la gonorrhée ; comme de faire des injections âcres , astringentes , de laver la verge avec de l'eau froide , &c. , ou de

tumeur vénérienne du testicule : savoir , d'une inflammation du testicule provenant d'une portion du virus vénérien déposée de la masse générale dans cette partie. Je n'ai jamais eu l'occasion d'observer cette maladie , & je ne suis par conséquent point en état d'en parler. On nous dit qu'on éprouve quelquefois de pareilles tumeurs des testicules pour avoir tari des ulcères vénériens du gland ; mais je ne me souviens pas non plus d'avoir observé aucun cas de cette espèce ; quoique j'aie vu , il y a deux ans , un malade affecté d'une tumeur au testicule , qui étant mal traitée donna lieu à une fistule à l'anus. On lui fit l'opération , & la fistule étoit presque cicatrisée lorsqu'il reparut une tumeur au testicule , pour laquelle je fus consulté. Je réussis à dissiper la tumeur en rappelant un écoulement par l'uretre , & je complettai la cure par une suite de remèdes internes.

l'exposer à l'air froid ; par exemple , en lâchant de l'eau dans une rue où il souffle un vent froid ; de se livrer à un exercice violent, de quelque genre que ce soit ; d'employer mal-à-propos des balsamiques, soit à l'intérieur , soit à l'extérieur ; de se purger souvent, & d'avoir commerce avec des femmes. En observant religieusement ce régime , & en portant un suspensoir dès le commencement de toute gonorrhée, on peut si bien se garantir de cet accident , qu'aucun de ceux de mes malades qui ont suivi les règles que je viens de tracer, n'a jamais été attaqué de cette fâcheuse incommodité.

Mais le plus souvent nous rencontrons des malades qui ne sont pas si obéissans, ou nous sommes appelés pour des personnes qui ayant été traitées sans observer ces règles , sont déjà attaquées de la tumeur. Celles-là sont dignes de compassion , & l'on doit prendre sur le champ tous les moyens possibles pour les soulager.

La cause de la maladie étant , comme nous l'avons dit ci-dessus , une irritation des orifices des canaux excréteurs des vésicules féminales , parce que le virus vénérien a établi son siege au verumontanum , on ne

peut parvenir à soulager le malade, qu'en tâchant premièrement d'adoucir l'irritation, & ensuite de rappeler le virus à son premier siège, c'est-à-dire, de rétablir l'écoulement. Pour parvenir à ces deux fins, voici la méthode que j'ai trouvée la plus efficace.

Si le malade a le pouls fréquent, plein & fort, il faut le saigner sur le champ, & lui tirer une bonne quantité de sang, en ayant toutefois égard à sa constitution & aux autres circonstances. S'il n'y a point d'irritation dans le système, ou si elle n'est qu'à un degré médiocre, la saignée n'est pas nécessaire; & cela doit presque toujours être ainsi, quand nous sommes appelés dès le commencement de la maladie; car je suis convaincu par des observations multipliées, que la fièvre dans ce cas-là n'est jamais une maladie primitive, mais qu'elle n'est qu'une conséquence de l'irritation de ces parties délicates.

Plusieurs Auteurs ont recommandé d'appliquer à la tumeur un cataplasme ordinaire de pain & de lait avec un peu d'huile, ou du sucre de saturne, suivant les circonstances; mais j'ai vu si peu d'effet de cette application, que depuis bien des années je

n'en fais aucun usage. Au lieu de ces cataplasmes, j'ordonne en premier lieu un lavement pour évacuer les matieres fécales, si le malade n'a pas été naturellement à la selle; & ensuite je lui prescric, si ses moyens peuvent le lui permettre, de rester une demi-heure dans un bain chaud & émollient. S'il ne peut se procurer cet avantage, je le place dans une chaise percée, sur la vapeur de l'eau, pendant le même espace de tems, après avoir eu soin de lui faire soutenir les testicules au moyen d'un suspensoir. Il doit passer de-là dans son lit, & on lui appliquera tout de suite un suspensoir sec, afin que ses testicules soient constamment soutenus, parce que la situation pendante les irrite, ou du moins y contribue. On peut appliquer aussi à la verge un cataplasme émollient tout chaud, afin de rappeler l'écoulement, ou, en d'autres mots, pour déterminer la matiere répercutée à revenir de son siege actuel à celui qu'elle occupoit auparavant. Mais le moyen sur lequel je trouve qu'on peut le plus compter, c'est d'administrer une bonne dose d'opium, ou, suivant les circonstances, de donner un lavement composé avec d'égaies quantités

d'huile de lin & d'eau d'orge, avec une dose suffisante de laudanum , & de le réitérer selon le besoin. Le malade doit s'en tenir à une diete légère, & ne boire que de l'eau d'orge , ou une émulsion d'amandes.

Je fus conduit à cette méthode d'administrer l'opium , que je regarde comme nouvelle dans ces cas-là , il y a environ dix ans, par un événement singulier qui regarde un de mes amis , & que je peux me dispenser de rapporter. J'en ai vu depuis des effets si heureux & si prompts , que je ne manque jamais de l'employer. J'ai vu beaucoup de cas dans lesquels cette méthode a dissipé la tumeur & la douleur du testicule , & a rappelé l'écoulement dans l'espace de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Et dans les cas où elle ne produisoit pas sitôt cet effet, elle soulageoit toujours le malade , & prévenoit l'invasion de la fièvre. Dans tous les cas les plus rebelles , j'ai constamment observé que les symptomes d'irritation & l'enflure ne se dissipoient jamais , jusqu'à ce que l'écoulement de la gonorrhée eût reparu. Mais au moment où il avoit lieu , le malade se trouvoit soulagé de la douleur du testicule , & la tumeur s'évanouissoit par

degrés. Afin d'assister la nature dans ses efforts salutaires , il faut réitérer l'usage de l'opium par le haut , ou dans un lavement émollient , toutes les vingt-quatre heures. On doit exposer les parties à la vapeur de l'eau ou du lait chaud , deux ou trois fois par jour pendant un quart-d'heure ou une demi-heure. Il faut appliquer constamment des cataplasmes émolliens tout chauds à la verge , & empêcher l'accumulation des matieres fécales dans le rectum, au moyen d'un lavement ordinaire, répété suivant le besoin. En procédant de cette maniere , on aura presque toujours la satisfaction de guérir en peu de jours une maladie qui , lorsqu'on suit une méthode différente , exige souvent plusieurs semaines pour être domptée.

On pourroit aussi , suivant les circonstances , essayer & appliquer , comme nous l'avons dit ci-dessus , d'autres moyens plus efficaces pour rétablir l'écoulement le plutôt possible, lorsque les symptomes de la tumeur paroissent dangereux. On doit traiter ensuite de la maniere ordinaire , la gonorrhée rétablie , en prenant le plus grand soin de ne pas donner lieu à une nouvelle répercussion , qui en pareil cas arrive facilement une seconde fois.

Il arrive fréquemment, lorsque la tumeur des testicules a été mal traitée, qu'un des testicules ou tous les deux s'endurcissent ; & c'est alors ce qu'on appelle communément le *squirre des testicules*. J'ai toujours trouvé dans tous les cas pareils l'épididyme très-dur & très-enflé. Dans quelques-uns cependant, sans doute à raison de l'ancienneté de la maladie, le testicule même étoit aussi évidemment affecté, & cette affection étoit quelquefois accompagnée d'une sensation de resserrement douloureux ; mais le plus souvent il n'y avoit aucune douleur. J'ai éprouvé, en pareil cas, de bons effets du mercure donné à l'intérieur, ou administré à l'extérieur en frictions sur le périnée & sur le scrotum, deux fois par jour, en y joignant l'application constante d'un cataplasme chaud, fait avec la racine de mandragore (*Atropa mandragora. Linn.*). On peut essayer la ciguë, tant à l'intérieur qu'en topique. On a fort recommandé, en dernier lieu, l'usage de la décoction d'écorce de la racine de la lauréole (*Daphne mezereum. Linn.*) à l'intérieur ; & l'application d'un cataplasme fait avec la même écorce. Mais j'ai observé que plusieurs ma-

lades auxquels j'ai donné cette décoction en étoient si fort incommodés , qu'ils trouvoient impossible d'y accoutumer leur estomac , lors même que je la leur faisois prendre très-affoiblie. Je tiens du Baron Van-Swieten lui-même , qu'il avoit donné avec succès pour une induration chronique indolente des testicules , les yeux d'écrevisses à la dose d'une once dans une pinte de bon vin d'Autriche ou de vin vieux d'Allemagne , dont le malade prenoit matin & soir trois ou quatre cuillerées à bouche. J'éprouvai une fois ce remède , & il réussit extrêmement bien. Depuis la mort de Van-Swieten, j'ai eu l'occasion de voir un homme qui m'a dit que ce grand-homme l'avoit guéri d'une tumeur Squirreuse du testicule par le même remède , quoiqu'elle ne reconnût pas une cause vénérienne , & qu'il avoit toujours été parfaitement bien depuis. Il faut cependant observer qu'il arrive quelquefois que tous ces remèdes échouent , & que les tumeurs squirreuses qui ont duré plusieurs mois ou plusieurs années ne se dissipent pas , à moins qu'on ne fasse reparoître l'écoulement.

Le cancer du testicule peut être guéri par

l'extirpation ; mais toutes les fois qu'on rencontre un testicule cancéreux ou affecté dans son tissu , il faut toujours examiner avec soin si les vaisseaux lymphatiques du cordon spermatique ne sont pas en même-tems attaqués. Dans ce cas, le rein du même côté auquel ces vaisseaux lymphatiques aboutissent étant pour l'ordinaire affecté, l'extirpation du testicule devient une opération inutile, qui par ses suites funestes ne sert qu'à exposer la réputation d'un Chirurgien.

Quelques-uns des Auteurs qui ont écrit sur cette matiere, nous disent que l'inflammation vénérienne des testicules se termine fréquemment par la suppuration. Cela peut bien être quelquefois ; mais je ne l'ai jamais vu arriver chez aucun de mes malades. Je suis conséquemment porté à croire que lorsque cette terminaison a lieu, elle procede plus souvent d'un mauvais traitement que de toute autre cause. Mais peut-être que l'espece de tumeur vénérienne des testicules qui provient, à ce qu'on dit, de l'infection de la masse générale (s'il est vrai qu'elle existe jamais) est plus sujette à se terminer par une suppuration, que celle qui

naît de la suppression de la gonorrhée, & qui, ainsi que nous l'avons vu plus haut, affecte très-rarement le testicule même. Je vis, il y a huit ans, un cas particulier qui, bien qu'il ne fût pas de nature vénérienne, mérite peut-être de trouver place ici.

Un jeune homme de vingt ans, étant affligé de tumeurs scrophuleuses autour du col, prit par l'ordonnance d'un Médecin, la *décoction des bois*. Mais il n'eut pas suivi cet avis pendant quelques semaines, qu'il fut attaqué d'une toux, qui au bout de quinze jours se termina en une hémophthisie. Quoiqu'il eût quitté alors la décoction & qu'il fît usage de plusieurs autres remèdes qu'on lui avoit prescrits, la toux continua plusieurs mois, accompagnée de tems en tems d'un crachement de sang ou de mucus sanguinolent. Etant consulté, je déclarai que je croyois que les poumons étoient affectés de tubercules scrophuleux, contre lesquels je ne connoissois point de remèdes; & je l'engageai à consulter les principaux Médecins de la ville. Les remèdes qu'ils lui ordonnerent ne firent pas le moindre effet sur sa toux; mais il s'en trouva passablement bien à d'autres égards. Il mangeoit avec appé-

tit & dormoit assez tranquillement. Un jour il vint à moi , se plaignant d'une enflure douloureuse aux deux aînes , mais plus d'un côté que de l'autre. A l'examen je trouvai le cordon spermatique très-grossi. Je lui demandai s'il avoit pris des libertés avec les femmes : il me déclara, sur son honneur, qu'il n'avoit de sa vie eu commerce avec aucune, dans la crainte d'attraper du mal vénérien ; mais qu'il avoit eu déjà plusieurs fois la même incommodité, & qu'il l'éprouvoit toujours toutes les fois qu'il se trouvoit en compagnie avec de jeunes personnes qui excitoient fortement ses desirs ; que cela devenoit quelquefois extrêmement douloureux : ce qui l'obligeoit à éviter ces occasions autant qu'il lui étoit possible. S'étant trouvé dans une pareille situation le jour d'auparavant, il avoit éprouvé la même douleur ; mais elle avoit continué plus longtemps qu'à l'ordinaire , & au point qu'elle l'avoit forcé de recourir à moi pour en être soulagé. Je lui conseillai d'appliquer de l'eau froide aux parties, & cela le guérit de son incommodité en peu de jours. Tels furent les préliminaires, dont j'ai cru devoir rendre compte.

Quelques mois après, il se plaignit à moi, qu'un de ses testicules étoit devenu très-dur sans aucune cause apparente. Je l'interrogeai sur le commerce avec les femmes, il me répéta ce qu'il m'avoit dit auparavant à ce sujet ; mais il m'avoua qu'il s'étoit fréquemment masturbé, sans savoir que cette pratique pût produire aucun mal. Je prescrivis la ciguë & tous les résolutifs que fournit la matiere médicale, tant intérieurement qu'à l'extérieur ; mais sans aucun effet. Le testicule devint douloureux & grossit de jour en jour. Enfin il creva, & rendit une petite quantité de matiere purulente. A mon retour dans la ville, après une absence de quelques mois, le malade me dit que pendant tout ce tems il s'étoit fait une petite évacuation, & qu'il sortoit chaque jour de l'ulcere plusieurs fibres comme des filamens blancs. A l'examen, je trouvai le testicule réduit à un très-petit volume, & l'ulcere presque entièrement fermé ; & au bout de quelques semaines il fut tout-à-fait cicatrisé. Sa toux avoit cependant toujours continué ; mais il ne paroissoit pas plus émacié que lorsqu'il s'étoit adressé à moi pour la première fois. Tous les trois ou quatre mois,

lorsque le picottement de la toux sembloit augmenter , & qu'il craignoit de cracher du sang , il se faisoit saigner de lui-même. Les cordons spermatiques étoient tout-à-fait dans l'état naturel.

Au même mois de l'année suivante, l'autre testicule s'affecta précisément de même qu'avoit fait le premier. Un Chirurgien du premier mérite , qui avoit traité ce malade avec moi l'année précédente , fut appelé dans mon absence. Mais quoiqu'on lui eût fait tous les remedes que j'aurois cru devoir moi-même lui prescrire, je trouvai, à mon arrivée, que la maladie continuoit & avoit déjà duré six semaines. A la fin de la septieme semaine, le testicule avoit crevé : & alors des morceaux entiers des vaisseaux spermatiques du testicule s'évacuoient chaque jour par l'ouverture ; & au bout de trois mois, le testicule fut réduit à la même grosseur que l'autre ; c'est - à - dire , à celle d'une petite noisette. Il n'y avoit aucune tuméfaction dans les cordons spermatiques ; & le malade me dit qu'il avoit strictement suivi mon avis , & renoncé tout-à-fait , pendant ces deux dernieres années , à la mauvaise habitude dont j'ai parlé. La toux

continua , & le mina peu-à-peu , de telle sorte , qu'il mourut deux ans après.

Le Médecin qui le suivit le dernier m'informa qu'à l'ouverture du cadavre , il avoit trouvé une vomique dans l'un des poumons , & beaucoup de tubercules ou de grosses tumeurs dures dans tous les deux. Mais il n'avoit pas examiné les testicules. Je ne prétends point déterminer de quelle cause provenoit l'affection des testicules ; si c'étoit une production de la maladie scrophuleuse , ou un effet de la masturbation. Mais j'ai simplement rapporté cette histoire comme une observation particuliere & remarquable , qui montre que les testicules peuvent quelquefois tomber en suppuration , malgré le traitement le plus attentif & le plus méthodique.



C H A P I T R E V.

*De l'inflammation & de l'induration de la
GLANDE PROSTATE.*

JE n'ai rien à dire de particulier sur l'inflammation de la glande prostate, si ce n'est lorsqu'elle procède de la suppression d'une gonorrhée. Il faut employer, dans ce cas, tous les moyens possibles pour rappeler la gonorrhée, & sur-tout ceux que j'ai recommandés pour la tumeur des testicules provenant de la même cause; parce que si cette inflammation se termine par la suppuration, soit que l'abcès s'ouvre dans l'uretre, soit qu'il perce dans la vessie, dans le rectum, ou au périnée, il est toujours accompagné de circonstances très-fâcheuses. La douleur & la difficulté d'uriner sont les symptômes qui accompagnent & indiquent l'inflammation ou la tuméfaction de cette glande. D'ailleurs, si l'on étoit en doute sur le lieu affecté, on peut s'en instruire très-aisément par le tact. J'observerai seulement que lorsque la suppuration est établie, il faut administrer du mercure à l'intérieur & à

l'extérieur , & ensuite des injections convenables , dont la composition n'a rien de particulier , & dépend entièrement du jugement éclairé du Praticien. Lorsque cette glande sera devenue dure & squirreuse , on éprouvera de bons effets des remèdes que nous avons recommandés pour l'induration des testicules ou des bubons vénériens ; mais on se trouvera bien sur-tout des vésicatoires appliqués à plusieurs reprises au périnée , & de la ciguë donnée intérieurement à grandes doses.

Lorsqu'il est à craindre que la tumeur squirreuse de la prostate n'entraîne une suppression totale des urines , comme cela arrive toujours tôt ou tard , il faut essayer tous les moyens possibles pour procurer la suppuration de cette glande , afin de prévenir des conséquences encore plus fâcheuses.



C H A P I T R E V I.

*De l'ischurie vénérienne & des rétreциsemens
de l'URETRE.*

ON appelle *ischurie vénérienne* la suppression totale des urines , occasionnée soit par les restes d'une maladie syphilitique passée , soit par un virus vénérien affectant actuellement l'uretre ou le col de la vessie ; & on donne le nom de *strangurie vénérienne* à la suppression incomplète des urines , ou à la difficulté de lancer l'urine en un jet continu & naturel , lorsqu'elle provient de la même cause.

Les différentes causes immédiates qui produisent soit la strangurie soit l'ischurie vénériennes , sont , 1°. une inflammation , ou une constriction spasmodique du col de la vessie , occasionnées par la repercussion d'une gonorrhée récente ; 2°. une constriction ou rétreциissement chronique d'une portion particuliere de l'uretre ; 3°. une compression du col de la vessie , ou de l'uretre , occasionnant une abolition partielle ou totale de sa cavité , & causée par

la tuméfaction de la prostate , ou de toute autre glande de l'uretère ; 4°. la cicatrice faillante d'un ulcère qui a précédé , ou une excroissance fongueuse , connue vulgairement sous le nom de *carosité* , dans quelque partie de l'uretère.

Comme c'est de la connoissance parfaite de ces causes que dépend entièrement la guérison radicale de cette maladie , nous les considérerons plus en détail.

Toutes les fois que l'écoulement d'une gonorrhée vénérienne est arrêté par une cause quelconque , le virus semble se porter plus avant dans le canal de l'uretère , & y exciter une irritation & une inflammation analogues à celles qu'il avoit excitées dans son siège primitif. S'il se fixe au *vérumontanum* , & qu'il irrite les orifices des canaux excrétoires des vésicules séminales , il produit , comme nous l'avons observé dans un des chapitres précédens , une tuméfaction de l'épididyme , ou ce qu'on appelle communément la *tumeur vénérienne des testicules*. S'il se porte encore plus avant dans l'uretère , & qu'il s'arrête au col de la vessie , il ne produit pas dans ces circonstances la tumeur des testicules , mais une irritation ,

une constriction spasmodique , ou une inflammation du col de la vessie , accompagnée d'une suppression d'urine ou totale, ou partielle. Dans ce cas , lorsque la maladie est traitée suivant les règles , le virus ne produit d'autre mauvais effet que cette suppression d'urine , qui cesse au bout de quelques jours ; après quoi , le virus quitte cette partie , & revenant sur ses pas dans l'uretre, il occasionne une tumeur aux testicules ; ou s'il retourne au même endroit qu'il occupoit en premier lieu , il reproduit l'écoulement avec les symptomes ordinaires de la gonorrhée , & se dissipe ainsi peu-à-peu tout entier , sans laisser après lui aucune trace fâcheuse. Mais cette circonstance si désirée n'arrive pas toujours ; & le virus logé dans le col de la vessie produit quelquefois, outre une foule de symptomes très-désagréables , une exulcération dans cette partie ou dans quelqu'autre endroit de l'uretre.

Quoique l'évacuation qui se fait par un pareil ulcere s'arrête peu-à-peu , en tout ou en partie , & que l'ulcere même se consolide , on observe souvent qu'il reste une coarctation de l'uretre , à l'endroit où étoit

118 OBSERVATIONS PRATIQUES

l'ulcere, ou que la cicatrice qu'il laisse forme une espece de nœud ou de protubérance dans le passage. Quelquefois aussi les ulceres en se cicatrisant forment des protubérances ou excroissances grenues, qui, sous le nom de *carnosités*, produisent dans la suite le même effet qu'une cicatrice saillante. D'autres fois, la glande prostate, ou quelque'une des glandes de l'uretre même, étant ulcérée, forme une excroissance fongueuse, qui pousse dans l'uretre ou dans le col de la vessie, & produit ainsi un rétrécissement ou une oblitération totale de la cavité du canal. Les dissections anatomiques nous ont appris aussi depuis peu que deux ulceres de l'uretre, situés vis-à-vis l'un de l'autre, ou bien un seul ulcere qui occupe une grande partie du pourtour du canal, forment quelquefois en se rapprochant & se collant ensemble, des bandes qui traversent le canal de l'uretre : & tandis que la partie inférieure de l'uretre demeure ouverte, & continue de fournir l'écoulement dont nous avons parlé dans le chapitre des *gonorrhées habituelles*, les parties supérieures greffées, pour ainsi dire, ensemble, diminuent ou bouchent la cavité de l'uretre, & empê-

chent ainsi le libre passage des urines.

Dans quelques-uns de ces cas, le malade urine assez librement tant qu'il mène une vie sobre & tranquille ; mais s'il vient à commettre le moindre excès de table , ou à se livrer à un exercice un peu violent , la maladie s'aigrit évidemment ; l'urine ne coule plus que goutte à goutte , ou en un petit filet interrompu , en faisant éprouver au malade beaucoup de douleurs & d'anxiétés ; ou bien le passage se bouche entierement , & met ainsi la vie en danger. J'ai vu quelquefois , en pareil cas , l'urine se frayer un passage dans le rectum , & s'évacuer par le fondement. Le plus souvent elle produit dans l'uretre , derriere l'endroit du rétrécissement , une dilatation , une érosion , des sinus , ou une fistule par laquelle elle s'évacue constamment dans la fuite.

Plus le siege de cette maladie se trouve situé avant ou profondément dans le canal de l'uretre , plus en général la guérison en est difficile , & plus il y a de danger pour le malade. Plus toutes ces especes de maladies sont invétérées ou compliquées , plus on a de peine à les détruire. Celles qui naissent d'un ulcere calleux ou rétréci , se guérissent

plus facilement que celles qui proviennent d'une cicatrice protubérante , ou de carnosités. J'ai observé que l'ischurie qui doit son origine à la répercussion d'une gonorrhée récente , se dissipe plus aisément & plutôt que toutes les autres. Celle qui provient du squirre de la glande prostate est quelquefois, mais non pas toujours, incurable. Mais je ne connois point de remede pour l'ischurie qui procede d'une excroissance fongueuse dans le canal de l'uretre.

Méthode curative.

La premiere chose , lorsqu'on est appelé pour un malade attaqué d'une suppression d'urine, doit être de demander ou de rechercher la cause de la maladie, afin de savoir si elle provient de la répercussion d'une gonorrhée récente , ou de quelqu'ancien dérangement dans l'uretre. Notre principal but dans les deux cas étant de donner issue aux urines , nous devons examiner encore si la maladie est encore purement locale , ou s'il y a une irritation générale du système. Si le pouls est fréquent & dur , il faut une saignée. La quantité de sang qu'il faut tirer dépend de l'état du pouls & de la consti-

tution du malade. Un homme d'un tempérament fort, ou d'une constitution pléthorique supportera la perte d'une livre de sang, au lieu qu'une saignée moins copieuse de moitié sera suffisante, & produira le même effet sur un tempérament plus délicat & plus grêle. Il faut cependant observer qu'en pareil cas le malade éprouve un meilleur effet d'une saignée copieuse, que de deux ou trois petites saignées successives. Après la saignée, ou lorsque le système général n'est pas affecté, si la vessie est très-distendue, il faut l'évacuer par le moyen de la sonde creuse ou algalie. A la vérité, l'application de cet instrument est quelquefois très-difficile, & même impossible dans ces circonstances. Il est certain que cette impossibilité tient souvent à la cause même de la maladie; mais le succès de l'opération dépend aussi beaucoup de l'adresse du Chirurgien.

Voici la manipulation qui m'a paru la plus avantageuse pour faciliter l'introduction de la sonde. On doit toujours commencer par la saignée quand elle est nécessaire. La sonde étant ointe d'huile douce, il faut l'introduire doucement. Aussi-tôt qu'elle

rencontre quelqu'obstacle , on se gardera bien de vouloir le forcer ; mais il faut attendre un peu , & essayer ensuite de la pousser encore doucement en avant , parce que cet obstacle semble quelquefois ne provenir que d'un spasme momentané de l'uretre , excité par l'irritation mécanique de la sonde même ; & si l'on cesse de pousser , ce spasme s'évanouit souvent en peu de minutes , & la sonde s'introduit alors plus avant avec facilité ; au lieu que si l'on s'obstine à la pousser , le spasme devient plus violent , & rend souvent l'introduction absolument impossible. C'est probablement à cause de ce spasme que nous voyons quelquefois un Chirurgien réussir à introduire la sonde , tandis qu'un autre , avec autant d'habileté & de capacité , l'aura déjà vainement essayé. Si l'obstacle est au verumontanum , ou plus avant dans l'uretre , on peut très - souvent le lever en introduisant le doigt dans l'anus pour aider au passage de la sonde. J'ai vu des cas où l'introduction de la sonde étoit impossible tant que le malade restoit couché dans son lit , au lieu qu'elle entroit avec facilité lorsqu'il étoit assis sur le bord du lit , avec les jambes pendantes.

J'ai observé aussi qu'on introduit par fois très-facilement une sonde plus grosse , après avoir essayé vainement , à plusieurs reprises , d'en introduire une plus petite.

J'ai été peut-être trop minutieux dans l'énumération de toutes ces circonstances ; mais c'est que je suis bien persuadé qu'en faisant une attention scrupuleuse à tous ces points , on peut non-seulement épargner souvent beaucoup de douleurs au malade , mais , ce qui est peut-être plus essentiel , empêcher la vérole de se communiquer à la masse générale : ce qui arrive fort aisément lorsque par un traitement peu ménagé l'on a blessé l'uretre. J'ai certainement vu les symptômes vénériens les plus évidens se manifester dans tout le système par une pareille cause , dans des cas où le malade n'avoit jamais eu d'autre mal qu'une ischurie provenant de la répercussion d'une simple gonorrhée.

Lorsque le rétrécissement de l'uretre est tel , qu'il refuse le passage à toutes les sondes quelconques , malgré les précautions dont nous venons de parler , on réussit quelquefois à y introduire une petite corde de boyau , qui produit un très-bon effet.

Lorsque le danger n'est pas si grand ; c'est-à-dire , lorsque la vessie n'est pas très-distendue , & que par conséquent l'évacuation immédiate de l'urine n'est pas si pressante , l'introduction de la sonde étant très-difficile , il faut avoir recours à quelque autre moyen de procurer la sortie des urines. Voici ceux que j'ai trouvés les plus efficaces en pareil cas. Il faut administrer d'abord un lavement ordinaire , avec du miel ou de l'électuaire lénitif, afin d'évacuer les matieres fécales , & de prévenir , par ce moyen , le stimulus perpétuel que leur accumulation est propre à exciter. Aussi-tôt que les excréments sont évacués , il faut donner un autre lavement composé d'égales quantités d'eau d'orge & d'huile de lin , avec une bonne dose de laudanum liquide , & on le réitérera suivant le besoin. On doit éviter avec soin toute espece de remede ou d'aliment propre à pousser par les urines ; & par la même raison , le malade ne doit boire , même de l'eau d'orge ou de la dissolution de gomme arabique , que ce qu'il en faut pour étancher sa soif. Il faut aussi , selon les circonstances , le mettre dans un bain d'eau chaude , à laquelle on aura ajouté

du lait , ou une décoction de son ; on peut l'y laisser pendant une demi-heure ou une heure , & réitérer le même bain quatre ou cinq heures après. J'ai éprouvé souvent qu'il est aussi très-utile de faire asseoir le malade sur une chaise percée , & d'exposer ses parties à la vapeur de l'eau chaude mêlée avec du vinaigre. Si le malade est agité & fiévreux , il est quelquefois à propos de lui faire une saignée ; & il faut après cela lui administrer le soir une bonne dose de laudanum. L'application judicieuse de ces secours produit quelquefois l'effet désiré dans les circonstances les plus désespérées.

J'ai vu une fois dans une suppression d'urine , où l'on n'étoit point à portée d'avoir une sonde , l'application d'un oignon rôti au périnée , par l'avis d'une vieille femme , produire un si bon effet , que deux heures après l'urine coula abondamment. Dans un autre cas , on sauva la vie à un fameux Médecin des armées , en lui couvrant le gland avec la pellicule fraîche qui se trouve entre la coque & le blanc des œufs. Aussitôt que cette pellicule en se séchant vint à se contracter , l'urine commença de couler en abondance. Mais deux jours après , l'ischurie

étant revenue à l'improviste , on eut beau appliquer de nouveau une pellicule d'œuf , elle ne produisit aucun effet , comme nous le prédit d'avance la personne qui l'avoit recommandée , & le malade mourut. Peut-être le liniment volatil , ou un vésicatoire appliqué au périnée , produiroient - ils le même effet , avec plus de certitude & plus promptement que ne firent les remèdes qu'on employa dans les deux cas que je viens de rapporter.

Lorsqu'on a été assez heureux pour évacuer la vessie , soit par l'application de la sonde , soit par quelqu'un des autres moyens que j'ai proposés , le soin le plus pressant doit être de prévenir une nouvelle accumulation des urines , & de détruire , aussi-tôt qu'il est possible , la cause de la suppression. On remplira le premier objet en continuant les mêmes remèdes , & sur-tout , comme quelques Auteurs l'ont recommandé , en laissant la sonde dans l'uretre. C'est cependant une chose à laquelle aucun des malades que j'ai traités jusqu'ici n'a été capable de se soumettre. Ils souffroient tant en gardant les sondes ordinaires , soit qu'elles fussent d'argent ou d'acier , soit roides ou flexibles ,

qu'ils étoient convaincus que la douleur que causeroit l'application réitérée de la sonde, ou une nouvelle accumulation des urines dans la vessie, ne sauroit jamais être plus grande, & en conséquence ils retiroient eux-mêmes la sonde, malgré qu'ils eussent eu le plus grand desir de la garder, s'ils l'eussent trouvé possible. Je n'avois jamais pu trouver de moyen pour parer à cet inconvénient, jusqu'à ce que j'aie essayé les sondes inventées par M. Theden, premier Chirurgien des armées du Roi de Prusse. Elles sont faites de fil d'or, couvert de caoutchout, ou résine élastique (improprement gomme élastique). Ces sondes sont non-seulement plus faciles à appliquer dans bien des cas que les sondes ordinaires, ou les bougies creuses de toute espèce; mais de plus, dans toutes les occasions où je les ai essayées, j'ai trouvé qu'après que l'urine étoit évacuée, les malades les gardoient avec beaucoup moins d'incommodité. Elles sont par conséquent infiniment préférables à toutes les autres, en pareil cas. Mais si l'on n'a point de ces sondes à sa portée, & cela doit arriver souvent, tant qu'il sera si difficile d'en avoir, & qu'elles seront à un si haut

prix (1), il faut compatir aux souffrances des malades, retirer la sonde aussi-tôt qu'elle lui devient insupportable, & avoir immédiatement recours aux remèdes propres à prévenir le retour de la suppression.

Nous croyons faire plaisir aux personnes qui peuvent se procurer de ces sondes élastiques, en leur indiquant les règles qu'ils doivent observer dans leur application.

On introduit la sonde élastique de la manière ordinaire, après l'avoir ointe d'huile douce. Le Chirurgien, comme de coutume, tire doucement l'uretre vers lui avec une main, & tenant la sonde entre les doigts de l'autre, toujours à la distance d'un pouce ou deux du gland, il l'introduit par degrés. La sonde entre communément dans la vessie, sans avoir besoin d'aucune direction particulière, ou tour de main, de la part de l'opérateur. S'il se rencontre quelque résistance, il faut observer les règles que j'ai rapportées ci-dessus, pour faciliter l'introduction; mais si la résistance est au col de la vessie, il n'y a rien de plus à faire que de

(1) Ces deux difficultés sont devenues infiniment moindres au moyen des sondes creuses de résine élastique qu'on trouve à Paris chez M. Bernard, qui en est l'inventeur.

pousser

pousser doucement l'instrument en avant , en observant dans le même - tems de le tourner de droite à gauche ; car si on tournoit dans le sens contraire , les anneaux en spirale du fil d'or de la sonde de M. Theden se sépareroient. Si le Chirurgien trouve un trop grand obstacle , il doit , comme jé l'ai dit plus haut , suspendre son opération jusqu'à ce que la contraction ou le spasme du sphincter de la vessie & la résistance cessent : ce qui arrive pour l'ordinaire en très-peu de tems , après quoi il est en état de pénétrer aisément jusqu'à la vessie. On introduit cette sonde comme une sonde ordinaire , avec , ou sans le stilet. Lorsqu'on la retire de l'uretre après qu'on l'y a laissée quelque tems , elle est communément très-molle & par conséquent incapable de servir de nouveau , jusqu'à ce qu'on l'ait netoyée & séchée , & qu'on l'ait tenue au froid pendant un peu de tems : ce qui lui rend sa premiere fermeté. La maniere de la netoyer consiste à en laver l'extérieur avec de l'eau & à passer aussi de l'eau dans sa cavité , en ayant soin de l'y agiter pour la rincer. Pour achever de netoyer & sécher l'intérieur , on se servira avec avantage d'une longue aiguille à la-

quelle on aura enfilé une mèche de soie. Si lorsqu'on est sur le point de l'employer on la trouve trop roide, on peut la ramollir en la tenant quelque peu de tems dans la main, ou en l'approchant du feu.

Mais si tous les efforts qu'on peut faire pour introduire ou une sonde ou une corde de boyau, n'ont aucun succès, & qu'il y ait un danger imminent de rupture de la vessie, il est d'absolue nécessité d'évacuer l'urine; il ne faut par conséquent pas différer trop long-tems. On peut y parvenir, soit par une incision dans l'uretre au-delà du rétrécissement, ou du siege de l'obstacle; ou si le mal est au col de la vessie, & qu'il y ait de la difficulté à faire comme il faut l'incision & l'introduction du trocart dans cette partie, on peut percer la vessie à travers l'anus, ou faire une incision au-dessus de la symphise du pubis, & percer la vessie dans cet endroit au-dessous du péritoine. Cette opération n'est même ni très-difficile ni très-douloureuse, & elle devient nécessaire pour sauver la vie au malade.

Tels sont en général les moyens propres à donner du soulagement aux malades, dans tous les cas d'*ischurie* provenant du vice de l'*uretre*.

Mais pour guérir radicalement cette maladie, il faut, comme nous l'avons dit, en détruire la cause, & l'on y parvient par différentes méthodes, suivant sa différente nature.

Si l'ischurie provient de la répercussion récente d'une gonorrhée vénérienne, il faut rétablir l'écoulement & rappeler la gonorrhée. Pour cet effet, outre les remèdes généraux que nous avons indiqués ci-dessus, j'ai vu & éprouvé bien des fois que la vapeur de l'eau chaude, seule ou mêlée avec du vinaigre, le liniment volatil, &c. appliqués au périnée, sont les moyens les plus efficaces pour déloger le virus vénérien du col de la vessie & rétablir l'écoulement. Je recommande qu'on soutienne les testicules durant l'application de la vapeur, parce que j'ai vu des cas où le virus quittant le col de la vessie, au lieu de retourner à son siège primitif sous le frein, s'est établi au vérumontanum, & a produit ainsi la *tumeur vénérienne des testicules* : ce que je n'ai jamais observé depuis que j'ai pris la précaution que je viens d'indiquer. Dans ces circonstances, le malade doit se tenir tranquillement dans son lit. Il faut appliquer

sans cesse des cataplasmes émolliens tous chauds aux parties génitales, & empêcher avec soin, par le moyen des lavemens, l'accumulation des matieres fécales. Les vomitifs sont par fois aussi utiles dans cette maladie que dans la tuméfaction des testicules. L'usage des préparations d'opium à l'intérieur produit dans beaucoup de cas un effet très-prompt. Aussitôt que le virus vénérien quittant le col de la vessie occupe de nouveau son siege primitif, l'écoulement est rétabli, & l'on peut alors le traiter comme les gonorrhées ordinaires. Le malade doit seulement éviter avec le plus grand soin toutes les causes capables d'occasionner une semblable rétroulsion ; car nous voyons journellement que lorsque cette répercussion a déjà eu lieu, elle est prompte à revenir une seconde fois, & souvent à la plus légère occasion.

Je dois observer de plus, qu'en pareil cas, après que l'ischurie est dissipée, j'ai toujours trouvé qu'il étoit nécessaire de donner du mercure à l'intérieur pour obtenir une guérison radicale ; parce que j'ai vu dans toutes les occasions, que l'absorption du virus avoit lieu durant la suppression, & donnoit

ensuite des preuves évidentes de sa présence dans la masse générale; quoique la maladie locale des parties génitales fût parfaitement guérie.

Si la suppression d'urine provient d'une affection chronique de l'uretre, comme d'un rétrécissement accompagné d'un ulcere de l'uretre, ou d'une érosion des canaux excrétoires de la glande prostatice ou des vésicules séminales, il faut détruire cette cause conformément aux règles que nous avons établies dans les Chapitres des *écoulemens habituels* & des *ulceres vénériens*. Si la rétention d'urine provient d'une simple constriction d'un endroit particulier de l'uretre, sans aucune exulcération, il faut tâcher de dilater cette coarctation, qui doit son origine ou à un ulcere cicatrisé, par lequel toute la circonférence du canal est diminuée, ou à une cicatrice saillante, ou carnosité provenant aussi d'un ulcere. On y parvient par l'usage longtems continué des bougies; en commençant par les plus petites & allant ainsi par degrés jusqu'à ce que le malade soit en état de recevoir les plus grosses. Le malade doit garder la bougie pendant un quart d'heure ou une demi-

134 OBSERVATIONS PRATIQUES

heure , dans les commencemens , & ensuite pendant plusieurs heures , matin & soir , s'il peut le supporter. Lorsqu'on est à même de se procurer des bougies de résine élastique , cette précaution n'est presque jamais nécessaire , parce que ces bougies devenant souples & semblables à de la chair , dans l'uretre , ne causent que peu ou point d'incommodité. Mais comme cette espece de coarctation ou de resserrement est quelquefois si considérable , qu'elle ne permet pas même l'introduction de la plus petite bougie ; on y supplée à merveille par l'application d'une petite corde à boyau. Ce boyau une fois introduit , on le laisse pendant quelque tems dans l'uretre ; il se gonfle peu à peu , au moyen de quoi le passage rétréci s'élargit insensiblement ; en sorte que dès la première fois qu'on le retire , le malade est quelquefois en état de lâcher de l'eau avec une facilité inespérée ; & l'on peut après cela en introduire facilement un plus gros qui produit un aussi bon effet. Lorsqu'on est parvenu , par ce moyen , à dilater peu-à-peu le canal de l'uretre , au point qu'il admette le plus gros boyau , on peut ensuite y introduire des bougies ; & le malade con-

tinuëra de faire usage de ces dernières pendant plusieurs semaines après qu'il sera parfaitement guéri, & en état d'uriner à plein canal.

Si la coarctation n'admet pas même une corde de boyau, & que le siege de la maladie soit à un endroit auquel on ne puisse atteindre, il n'y a rien de mieux à faire, ainsi que je l'ai dit plus haut, qu'une incision dans l'uretre au-delà du rétrécissement. Par ce moyen, l'urine s'évacuera par l'incision, toutes les fois qu'il sera nécessaire, & l'on n'aura plus à craindre le retour de l'ischurie. Il est ensuite facile de dilater la blessure en passant le bistouri à travers la coarctation, & d'introduire après cela une bougie que le malade doit porter jusqu'à ce que le rétrécissement soit détruit, la plaie cicatrisée, & la maladie radicalement guérie. Il est nécessaire d'employer la même méthode, lorsque l'urine accumulée derriere la coarctation s'est frayée un passage, soit à travers le rectum : & alors le malade vuide son urine avec les matieres fécales par le fondement ; soit par une ouverture fistuleuse à travers le périnée. Mais dans ces cas il est pour l'ordinaire indispensable de passer le

malade par les remèdes mercuriels avant de procéder à l'opération de la fistule, sans quoi l'on feroit dans le cas de manquer très-souvent la guérison de cette dernière. Si le malade n'a pas assez de forces pour supporter ce traitement, comme cela arrive assez souvent, il faut le préparer par un régime de vie & des remèdes convenables. On aura soin en faisant l'opération de la fistule, de donner un coup de bistouri à travers le rétrécissement qui est la cause primitive & le siège de la maladie; & le malade sera assujetti à porter une bougie durant le traitement & pendant quelque tems après, comme dans le cas dont je viens de faire mention.

Quant à l'ischurie occasionnée par des excroissances ou carnosités, comme on les appelle communément, un de nos plus habiles Chirurgiens de Londres conseille d'introduire dans l'uretre un caustique couvert & de l'appliquer à la carnosité. On a même imaginé un instrument propre à exécuter convenablement cette opération, dont l'idée n'est pas nouvelle; mais je n'ai pas encore eu l'occasion de constater si ce moyen est assez efficace & sur-tout assez sûr pour qu'on

doive le mettre en pratique. D'autres ont proposé d'inciser l'uretre à l'endroit où se trouve le siege de la maladie , & de faire l'extirpation de ces corps étrangers ; mais je n'ai pas encore ouï dire que l'on ait pratiqué cette dernière opération.

Lorsque la cause de la maladie est un squirre ou une tumeur dure de la prostate, ou une excroissance fongueuse de la même glande, il faut essayer tous les remedes que l'on a recommandés pour résoudre une pareille tumeur ; & s'ils échouent, nous devons nous efforcer d'amener la glande à suppuration, plutôt que de laisser empirer une maladie qui a si souvent des suites funestes.

Si une tumeur dans quelqu'une des petites glandes de l'uretre est la cause de l'ischurie, & que les plus puissans résolutifs soient sans effet , je conseillerois au malade de se faire extirper la tumeur , plutôt que de vivre dans des tranfes perpétuelles sur les conséquences terribles que peut avoir cette maladie.



CHAPITRE VII.

Des ULCERES VÉNÉRIENS.

LES ulceres que produit le virus vénérien , en quelqu'endroit du corps qu'ils soient situés , prennent le nom d'*ulceres vénériens* , ou plus communément de *chancres* , qu'on leur a donné sans doute pour désigner leur naturel rongeur.

Les ulceres vénériens ou chancres doivent leur origine à une *infection primitive* ou *secondaire* , c'est-à-dire , ou au virus vénérien appliqué immédiatement à la partie , ou à ce même virus qui ayant déjà infecté la masse générale se dépose à la surface du corps. L'une & l'autre sorte de chancres peuvent naître sur toutes les parties du corps ; mais ils paroissent plus fréquemment sur les parties qui ne sont pas couvertes de l'épiderme : telles que le gland , l'intérieur du prépuce , l'uretre , les grandes levres , les nymphes , les levres , la bouche , les mamelons , &c. Je ne sache pas qu'on ait encore aucune observation authentique sur l'existence des ulceres vénériens internes.

Quoique les ulcères vénériens ne paroissent, la plupart du tems & le plus fréquemment, que sur les parties qui ne sont pas couvertes de l'épiderme, & sur-tout au gland, au prépuce, à la bouche, &c. comme je viens de le dire; il n'est cependant pas rare de rencontrer des cas où ils affectent des parties couvertes de cette enveloppe: comme la verge, le scrotum, les cuisses, &c. Il y a aussi des exemples de Chirurgiens qui, en faisant quelques opérations, ou de personnes qui en aidant à délivrer des femmes en travail d'enfant, ont eu le malheur d'être infectés d'ulcères vénériens aux mains ou aux bras. Dans tous les cas de cette espèce, le virus m'a toujours paru opérer plus puissamment que lorsqu'il avoit été originairement appliqué aux parties qui n'ont point d'épiderme, ou que lorsqu'il provenoit de l'infection de la masse générale. Je connois une Sage-Femme qui ayant été infectée de cette manière, il y a plusieurs années, souffre encore de cette maladie; & nous avons dans cette Capitale un autre exemple d'un Accoucheur du premier ordre, qui en délivrant une femme infectée, prit des ulcères à la main, & qui en éprouve encore des

suîtes , quoiqu'il y ait maintenant trois ans qu'il a reçu cette contagion.

Je connois un homme qui s'étant blessé au doigt par accident avec un canif, s'exposa le même soir à l'infection, sans soupçonner qu'il eût à craindre aucune conséquence fâcheuse. La blessure se changea au bout de deux jours en un très-mauvais ulcere vénérien, accompagné d'une tumeur dure & opiniâtre de tous le bras avec un bubon sous l'aisselle, & avec les symptômes d'une infection générale.

Quoique j'aie apporté l'attention la plus scrupuleuse dans tous les cas de ce genre que j'ai eu occasion d'observer, je n'ai pu découvrir dans la constitution des malades aucune cause particulière de ces symptômes violens. Dans deux exemples, les malades ont eu, avant & après, des ulceres vénériens dans des parties exemptes de l'épiderme, & le virus n'y a produit que les symptômes ordinaires. Il me semble en conséquence qu'il est probable que pour exciter des ulceres vénériens primitifs sur une partie munie de l'épiderme, il faut ou que le virus soit extrêmement âcre de sa nature, ou qu'il produise de plus violens effets, par la

raison qu'il est appliqué à des parties qui n'ont point de mucus pour le délayer , ou pour se défendre de son acrimonie. Nous observons du moins très-rarement que les ulcères vénériens primitifs qui sont situés sur des parties exemptes de l'épiderme , ou les ulcères vénériens secondaires qui naissent sur quelque endroit que ce soit de la surface du corps , soient accompagnés de symptômes aussi violens & aussi rebelles. Cela vient probablement de ce que dans le premier cas le virus rencontre une quantité de mucus qui le délaye ; & dans le second , il a été délayé , ou il a effuyé quelque'autre altération par son mélange avec la masse générale des humeurs.

Les ulcères vénériens, quoique procédans d'une infection immédiate , sont ou *locaux* ou *universels* ; c'est-à-dire, que le virus vénérien qui a été appliqué à la partie & a produit par son stimulus l'irritation & l'érosion qu'il cause toujours , est encore limité à cette partie ; ou bien , qu'il a été déjà absorbé dans la masse générale , & a infecté tout le corps. Cette distinction est utile & nécessaire dans la pratique ; car les ulcères de cette dernière espèce , comme ceux qui

naissent d'une infection secondaire, ne peuvent jamais être guéris sans le secours des remèdes qui purifient la masse de l'infection vénérienne , au lieu qu'on peut guérir les premiers par de simples applications locales.

Mais je dois m'occuper d'une autre différence qui est de la plus grande importance dans la pratique , & à laquelle les Auteurs qui ont traité de cette maladie semblent n'avoir pas fait assez d'attention. On regarde maintenant en général comme vénériens les ulcères qui naissent sur les parties génitales. C'est quelquefois après l'examen le plus superficiel qu'on prononce ainsi sur leur nature , & on les traite comme tels. Cependant il est certain , & l'expérience journalière démontre que de pareils ulcères peuvent provenir , de nos jours , aussi bien que du tems de Celse , d'acrimonies ou de miasmes qui n'aient rien de commun avec le virus vénérien. Aussi ai-je vu que pour n'avoir pas examiné les choses avec toute l'attention convenable , on s'est mis souvent dans le cas non-seulement de compromettre l'honneur de personnes innocentes , mais encore de réduire les malades dans le plus

fâcheux état par un traitement mal - entendu.

Mais je dois ranger parmi les plus terribles conséquences que puisse avoir une erreur dans le traitement de ces maladies , les accidens que j'ai observés dans les cas où l'on a méconnu des ulceres de la bouche & de la gorge , occasionnés par l'usage du mercure même , sur-tout pendant la salivation ; ou lorsqu'on a confondu avec les ulceres vénériens , des ulceres qui au commencement devoient réellement leur origine au virus vénérien , mais qui pendant un traitement mercuriel ont pris une apparence différente, & semblent avoir entièrement perdu leur caractère vénérien. Au lieu de se cicatrifer , comme ils sembloient être prêts à le faire , ils deviennent alors très - opiniâtres , & commencent à rendre une matiere claire & ichoreuse ; ils s'irritent ensuite par la continuation du même remede , & font tous les jours de nouveaux progrès.

Je vais rapporter ici quelques exemples propres à montrer évidemment l'importance de ces distinctions , me réservant de traiter plus particulièrement de la nature de ces accidens à l'article des *maladies*

144 OBSERVATIONS PRATIQUES
yénériennes incurables par le mercure.

Un jeune homme de vingt-deux ans , d'une constitution forte & pléthorique , me consulta il y a quelque tems sur un chancre , comme il l'appelloit , au gland , dont il étoit affligé depuis huit ou neuf mois. Il avoit consulté à Dublin , lorsqu'il l'eut gagné , un fameux Chirurgien , qui prescrivit un traitement mercuriel : on le fit saliver ; mais l'ulcere ne se guérissant pas , on appliqua pendant quelque tems des fumigations mercurielles à la partie affectée. Par ce moyen , l'ulcere parut diminuer d'étendue , & prendre une meilleure apparence ; mais il ne se ferma pas. On conseilla conséquemment au malade de passer une seconde fois par les remedes , & on lui administra différentes préparations mercurielles , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais par ce nouveau traitement , l'ulcere devint plus grand , plus profond , & empira à tous égards. Dans cet état , il vint à Londres , & me consulta. A l'examen , je trouvai le gland attaqué d'un ulcere large & profond , dont les bords étoient durs & faillans , & qui étoit extrêmement sensible au moindre attouchement. Sa base me parut rougeâtre & assez nette ;
mais

mais la matière qu'il rendoit me parut d'une nature âcre & corrosive. Elle avoit en effet déjà consumé la moitié du gland. Je lui dis que j'avois déjà vu plusieurs ulcères de ce genre ; qu'il n'étoit pas de nature vénérienne, & que le mercure, suivant mes observations, n'étoit pas un remède propre à cette sorte d'ulcères. J'ajoutai que je le guérirois, mais qu'il faudroit pour cela au moins deux ou trois mois de tems : sur quoi, il me quitta, en disant qu'il reviendrait me voir le lendemain pour se mettre sous ma direction. Il ne le fit point, & je n'entendis plus parler de lui qu'au bout de quatre mois qu'il m'envoya chercher. Son teint étoit vif & frais la première fois que je le vis. Mais alors il avoit l'air si abattu, si cachectique : en un mot, il étoit si changé que j'eus de la peine à le reconnoître. Voici son histoire, comme il me la rapporta. « Ayant été peu
 » satisfait de ma première opinion sur sa
 » maladie, & de l'avis que je lui avois donné,
 » il avoit jugé à propos, à la sollicitation
 » d'un ami, de consulter une autre personne
 » de l'art. Après un examen attentif, cette
 » personne avoit prononcé que son ulcère
 » étoit vénérien, & l'avoit assuré que rien

» ne pourroit le guérir que le mercure ;
» qu'il n'en avoit pas pris assez , & qu'on
» n'avoit pas employé la préparation qui
» étoit regardée comme la meilleure en
» pareil cas ; & que loin qu'il fallût deux ou
» trois mois pour le guérir , ses ordonnances
» lui procureroient une guérison radicale
» en trois ou quatre semaines de tems. Sur
» ces assurances , il s'étoit soumis sur le
» champ à un nouveau traitement mercu-
» riel , qui lui avoit procuré une douce
» salivation ; mais avec si peu d'effet , que
» quoique l'ulcere eût paru présenter un
» mieux remarquable pendant les trois ou
» quatre premières semaines , il avoit ensuite
» corrodé , au lieu de se guérir , le reste du
» gland avec une partie de l'uretre. Sur cela ,
» on appella un autre Chirurgien en con-
» sultation. Celui-ci conseillant l'amputa-
» tion de la partie affectée , & le premier
» refusant de la faire , il avoit résolu de cesser
» de suivre leurs avis , & de prendre encore
» une fois le mien ». Je trouvai la partie
très - tuméfiée , le prépuce affecté d'un
phymosis complet , & l'urine s'évacuant
par trois ou quatre différens trous. Je lui
conseillai en conséquence de se faire inciser

le prépuce , afin qu'on pût voir l'état de l'ulcere , le déterger , ou y appliquer les remèdes qui seroient jugés convenables. Je lui prescrivis en même - tems quelques remèdes fortifiants à prendre à l'intérieur. Il en usa pendant huit à dix jours ; mais il renvoyoit l'opération d'un jour à l'autre , lorsqu'un de ses amis lui conseilla de consulter un autre Médecin. Celui-ci promit de faire , par le moyen d'une décoction de ciguë & de racine de ginseng , quelque chose de plus pour sa guérison que tout ce qu'on avoit fait jusques-là. Il prit cette décoction pendant quelques jours avec très - peu d'effet , l'érosion faisant toujours de nouveaux progrès. A la fin , on consulta un autre Médecin , qui insista sur l'usage des remèdes fortifiants , d'une diete nourrissante , l'envoya respirer l'air de la campagne , & prendre des bains de mer. Par ces moyens , il est maintenant rétabli , avec la perte de la moitié de sa verge , qu'il auroit presque entièrement conservée s'il eût suivi mon avis dès le commencement.

Voici les remarques que j'ai à faire sur ce cas. Je pense d'abord qu'il est extrêmement mal-à-propos d'administrer un traitement

mercuriel pour un ulcère vénérien local : ce qui étoit la maladie de ce jeune homme lorsqu'il s'adressa en premier lieu au Chirurgien de Dublin. Qu'un second traitement avec salivation , accompagné des fumigations mercurielles , étoit encore plus mal-à-propos dans ce cas. Qu'il étoit non-seulement très-imprudent de lui conseiller un troisieme traitement mercuriel , après que les deux premiers s'étoient trouvés inutiles , mais que c'étoit un conseil très-pernicieux , qui effectivement l'avoit rendu inhabile pour la génération , au grand chagrin de sa famille. Que l'avis qu'avoit donné le dernier Médecin , de faire usage de quelques remedes fortifiants , avec une diete nourrissante , d'aller à la campagne , & de prendre des bains de mer , étoit judicieux & honnête ; & que le malade qui n'avoit été porté à suivre ce dernier avis que par le sentiment de ses souffrances , auroit été affranchi de toute cette misere s'il s'en fût tenu à mes premiers conseils.

Je fus consulté pour un autre cas dans lequel il étoit survenu des ulceres dans la gorge pendant un traitement mercuriel. On les avoit regardés comme vénériens , & on

les avoit traités en conséquence , en continuant l'usage du mercure à l'intérieur. Ils s'envenimerent au point qu'ils consumèrent presque entièrement les deux amygdales avec le voile du palais , & réduisirent le malade dans la plus triste situation. Je lui fis cesser le mercure , & lui administrai des remèdes tout-à-fait différens. Il fut guéri.

M. Brambilla nous a donné l'histoire d'un malade qui , pendant un traitement mercuriel , fut affecté d'ulceres à la gorge , que le Chirurgien prit pour vénériens. Non-seulement ce malade perdit le voile du palais par l'usage continué du mercure , mais ce traitement entraîna la carie de la machoire , & la mort termina la maladie. Le même Auteur observe que les tumeurs ou ulceres inflammatoires qui deviennent gangréneux sont constamment exaspérés par l'usage du mercure , soit à l'intérieur , soit à l'extérieur , quoiqu'ils doivent évidemment leur origine à une cause vénérienne. J'ai vu moi-même plusieurs exemples de malades qui ayant pris des ulceres vénériens tandis qu'ils étoient déjà affectés d'un vice scorbutique , ont non-seulement été réduits à l'état le plus déplorable par l'usage imprudent du

mercure , mais en ont même perdu la vie.

M. Fabre , dans le *supplément* à ses *observations sur la maladie vénérienne* , rapporte aussi plusieurs cas où des ulcères , quoique procédant évidemment d'une cause vénérienne , bien loin d'être guéris par un long usage du mercure , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur , & même par des salivations réitérées , sont devenus au contraires si rebelles , qu'ils n'ont cédé ensuite à aucune autre espèce de remèdes , & ont causé la mort. D'où je conclus qu'il est très-essentiel dans la pratique de distinguer avec la plus grande attention :

1°. Les *ulcères vénériens locaux* d'avec ceux qui sont *universels* ; c'est-à-dire , qui sont produits par l'infection de la masse des humeurs , ou qui l'accompagnent.

2°. Les *ulcères vénériens universels simples* , d'avec ceux qui sont *compliqués* ; c'est-à-dire , accompagnés de symptômes de scorbut , d'écrouelles , &c.

3°. Les *ulcères vraiment vénériens des parties génitales , de la bouche , de la gorge , &c.* d'avec ceux qui proviennent originairement d'autres causes , comme , par exemple , de l'acrimonie de la salive

pendant l'usage des remèdes mercuriels , ou pendant l'application des fumigations mercurielles. Mais il faut faire sur - tout une attention particulière :

4°. Aux *ulceres de la bouche, du nez, des parties de la génération, des aines, &c.* qui quoique produits en apparence ou même évidemment par une cause vénérienne, ont, pour ainsi dire, changé de nature, du moins au point que le mercure n'a plus d'efficacité pour les guérir, & produit plutôt l'effet contraire.

Les caractères par lesquels on peut distinguer ces différentes sortes d'ulcères ne sont point aisés à décrire : l'inspection & la connoissance pratique doivent être nos meilleurs guides. Cependant l'observation des signes suivans peut nous aider à porter notre jugement.

On reconnoît en général assez facilement les ulcères vénériens par la dureté de leurs bords , par la croûte couenneuse dont leur base est couverte , par la rougeur plus intense de la peau tout autour de l'ulcère. Ces signes deviennent plus probables si le malade fait & convient qu'il s'est précédemment exposé à l'infection. Comme il

peut cependant naître aux parties génitales des ulcères qui non-seulement aient une apparence différente de celle des ulcères vénériens, mais encore qui leur ressemblent presque entièrement, & qui néanmoins reconnoissent d'autres causes, ainsi que l'ont remarqué il y a long-tems les plus anciens Auteurs de médecine, & que je l'ai observé moi-même en bien des occasions; on doit être circonspect, & ne jamais porter un jugement précipité touchant la nature de pareils ulcères, & se garder de prononcer qu'ils sont vénériens avant d'en être parfaitement assuré. En suivant la méthode contraire, on s'expose à blesser la réputation d'une personne honnête, à rompre les nœuds qui lient les deux sexes, & quelquefois à détruire le bonheur du mariage, comme je l'ai dit ci-dessus, relativement aux gonorrhées; & on court le risque de faire un mal corporel au malade en lui administrant des remèdes contraires à sa maladie.

On peut distinguer les ulcères qui ne sont pas de nature vénérienne, des vrais ulcères vénériens:

1°. Par leur apparence différente.

2°. Parce qu'ils naissent ou empirent pendant l'usage du mercure.

3°. Parce qu'ils auront été déjà traités sans succès par le moyen du mercure.

4°. Par leur sensibilité exquise.

5°. Par l'état d'atonie de tout le corps , ou par le relâchement & la mollesse de la partie affectée , de laquelle il découle une matiere ichoreuse.

6°. Par les symptomes d'autres maladies , soit seules , soit compliquées avec la maladie vénérienne.

Méthode curative.

Plusieurs bons Auteurs de Médecine ont conseillé de traiter de la même maniere tous les vrais ulceres ou chancres vénériens : savoir , par des mercuriels , seulement à l'intérieur , & de ne jamais faire usage d'aucune application extérieure. On a allégué plusieurs raisons spécieuses pour autoriser cette méthode ; mais ces raisons ne me paroissent pas satisfaisantes. Ils disent que les chancres sont des signes de la présence du virus vénérien dans le corps , & que par conséquent s'ils disparoissent par le simple usage du mercure pris à l'intérieur , on

est assuré que le remède a pénétré dans la masse , & que le virus est totalement déraciné. A cela , je réponds que les ulcères vénériens récents, produits par une infection immédiate , ne sont nullement des symptômes de vérole , comme on nous l'affure. Ils ne sont au contraire, dans ce cas , qu'une maladie locale qui n'exige point de remèdes internes , mais seulement des applications topiques ; & si on n'emploie pas celles-ci dans le tems , ils s'étendent quelquefois à un point étonnant , le virus est absorbé , & produit ou des bubons ou d'autres symptômes vénériens dans la masse des humeurs. Je conviens sans doute que s'ils subsistent pendant quelque tems , l'infection de tout le système s'ensuivra nécessairement ; & alors , aussi bien que lorsqu'ils procèdent d'une infection universelle ou secondaire , ce sont certainement, ainsi qu'on l'a assuré, des signes extérieurs qui prouvent la présence du virus dans la masse générale. Dans ce cas , je suis entièrement de la même opinion qu'on ne doit les traiter que par l'usage intérieur du mercure , sans aucune application extérieure , parce que si le seul usage du mercure à l'intérieur les fait dis-

paroître , fans le fecours d'aucun topique , l'on eft sûr d'avoir déraciné le virus , & guéri le malade radicalement. Mais lorsqu'ils font aux parties génitales , ou aux extrémités , le virus excite fouvent des inflammations violentes , des phymosis , des mortifications , &c. ; ou bien il eft abforbé & porté aux glandes lymphatiques , où il produit des bubons avant que le mercure ait eu le tems de produire fes effets , & de détruire ce virus dans la partie affectée.

Telles font les raifons qui me font préférer d'appliquer immédiatement à de pareils ulceres , les remedes topiques que j'ai trouvé les plus propres à les guérir , parce que je penfe qu'il n'y a point de malade un peu au fait de ces fortes de maladies , qui ne préférât une vérole réelle à la mortification de la verge , ou même à un bubon. Quant à ce que quelques perfonnes ont dit avoir obfervé , qu'il paroît très-fouvent des bubons après qu'on a guéri les chancres par des applications extérieures , & que par conféquent les remedes même qu'on recommande pour prévenir les bubons font affez fouvent propres à les faire naître : j'admets volontiers le fait ; mais je fuis

très - éloigné de croire à la conséquence qu'on en tire : favoir, que les remedes topiques qu'on applique à un ulcere vénérien procurent toujours l'absorption du virus. Il arrive dans ce cas ce que nous voyons arriver tous les jours sans faire usage d'aucune application topique quelconque , ou ce que nous devons craindre perpétuellement tant qu'il subsiste la moindre apparence d'ulcere vénérien. Ce qu'on attribue alors aux remedes appliqués extérieurement , je l'attribuerois plutôt à ce qu'on a différé trop long-tems de les appliquer , ou à ce qu'on n'en a pas choisi d'assez efficaces. Conséquemment dans tous les cas où j'ai des raisons d'appréhender de tels inconvéniens, je pense qu'il est non-seulement convenable, mais encore très-nécessaire d'appliquer aux ulceres vénériens, d'infection tant primitive que secondaire, les remedes topiques les plus efficaces , afin de les détruire aussi promptement qu'il est possible ; avec cette seule différence , que je regarde comme purement locaux les ulceres qui procedent d'une infection primitive ou immédiate , si elle est récente , & je pense qu'ils sont souvent susceptibles de guérison par des appli-

cations topiques seules , sans l'usage du mercure à l'intérieur ; au lieu que ceux qui proviennent de l'infection de la masse générale exigent toujours en même - tems un traitement mercuriel. J'emploie cette dernière méthode dans les ulcères vénériens qui datent de quelques jours , quoiqu'ils procedent d'une infection immédiate, parce qu'il y a toujours la plus grande probabilité que dans cet intervalle de tems une portion du virus a été absorbée dans la masse générale. Les applications extérieures dans ces cas n'ont jamais aucun effet permanent , parce que si nous parvenons même à détruire le virus dans la partie affectée , & à consolider l'ulcère , il percera bientôt de nouveau , ou au même endroit , ou dans quelqu'autre partie du corps , tant qu'il subsistera la moindre particule de virus dans la masse des humeurs.

Les remèdes extérieurs recommandés pour cet effet sont les mercuriels , les astringens & les caustiques.

Parmi les remèdes mercuriels , le précipité rouge , dont on saupoudre matin & soir les ulcères , est celui que j'ai trouvé le plus utile , tant que l'ulcère est couvert de

la croûte blanche couenneuse. L'onguent mercuriel n'est d'aucune utilité dans ce cas. Mais toutes les fois que l'ulcere prend une apparence plus nette , les topiques les plus appropriés sont le simple onguent mercuriel , le calomel en poudre ou suspendu dans l'eau de chaux , ou , selon les circonstances , le sublimé corrosif avec l'eau de chaux , ou bien une dissolution délayée de mercure dans l'acide nitreux. Dans des cas très-rebelles , on obtient quelquefois d'excellens effets des fumigations extérieures.

Lorsque l'application des remèdes mercuriels n'a aucun succès , on se trouve souvent très - bien de l'usage externe des astringens. Le quinquina , l'eau vitriolique camphrée , une dissolution de vitriol bleu , ou le verd de gris dissous dans l'huile sont ceux dont on se sert communément. Mais j'ai vu guérir par le cuivre jaune ou laiton en poudre , des ulcères qui avoient résisté à tous les autres remèdes. Les mêmes astringens répondent aussi quelquefois à nos vues, dans les ulcères qui ont une apparence de relâchement & d'atonie , & qui rendent une matière âcre & ichoreuse.

On a recommandé depuis peu d'appliquer des caustiques aux ulcères vénériens récents; c'est-à-dire, de les toucher une ou deux fois dans les vingt-quatre heures avec la pierre infernale, jusqu'à ce que les escarres se détachant successivement, la base de l'ulcère devienne rouge & nette. Cette pratique peut sans doute convenir quelquefois; mais il y a des constitutions qui ne supportent aucune application âcre, de quelque espèce que ce soit, moins encore celle des caustiques. J'ai vu les caustiques appliqués dans des constitutions irritables ou scorbutiques produire de très-mauvais symptômes, & j'ai observé un cas dans lequel la mortification de la partie fut la conséquence d'une pareille application. Dans ces sujets, l'usage interne du quinquina, avec des astringens à l'extérieur, ou, selon l'exigence du cas, avec une lotion mercurielle, produisent de meilleurs effets.

Si les ulcères vénériens résistent à tous les moyens que nous venons de proposer, l'usage des remèdes fortifiants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, une diète nourrissante, le bon vin, l'air de la campagne & les bains de mer sont quelquefois efficaces, ainsi que

nous l'avons dit plus haut , lorsque tous les autres remèdes ont échoué.

Je parlerai ci-deffous des autres remèdes qu'on recommande pour les ulcères vénériens invétérés , à l'article des *maux vénériens incurables par le mercure*.

Je n'ai rien dit des ulcères vénériens du nez , des yeux , de la face , &c. , parce qu'ils exigent le même traitement que les autres , & parce qu'on peut facilement les prévenir en recommandant aux malades affectés de gonorrhée ou d'ulcères vénériens aux parties génitales , d'avoir toujours soin de bien nétoyer leurs doigts après qu'ils ont touché les parties affectées.

Les ulcères de l'uterus ou du vagin , accompagnés d'un écoulement âcre & ichoreux , ne sont pas toujours cancéreux , ainsi qu'on l'a généralement imaginé : ils sont assez souvent vénériens , & l'on peut alors les guérir par des injections appropriées , & par l'usage du mercure à l'intérieur. J'ai vu plusieurs femmes qui d'après la douleur & l'écoulement ichoreux & sanieux dont elles étoient affligées , se croyoient attaquées d'un cancer à la matrice , se fiant , sur ce point , au jugement de

de leurs Médecins , & qui ont été radicalement guéries par l'usage intérieur de remèdes puissamment fortifiants & absorbans, & par l'injection assidue d'une dissolution de sublimé corrosif ou de calomel dans l'eau de chaux , soit seule , soit mêlée avec la teinture de mastic , ou , selon les circonstances , avec l'infusion de quinquina dans l'eau de chaux.

Mais on est dans l'erreur si l'on se promet quelque'avantage des injections , telles qu'on les emploie communément , soit dans ce cas , soit dans les fleurs blanches ou dans l'hémorrhagie de la matrice. Si l'on souhaite d'en obtenir de bons effets , il faut les appliquer à la partie affectée , & conséquemment ne pas les répandre au hasard dans le vagin , comme on fait communément , dans l'espérance qu'elles atteindront d'elles-mêmes au siège de la maladie , & pénétreront dans la cavité de l'utérus. Il faut introduire aussi avant qu'il est possible dans le vagin , ou , s'il se peut , dans l'orifice de l'utérus même , une seringue de forme & de grosseur convenables , & faite de manière que la matière injectée ne puisse s'échapper par les côtés. La malade doit être couchée dans son lit

sur son dos , avec la tête & la poitrine placées un peu plus bas que le reste du corps , & les genoux pliés. Dans cette situation , l'injection doit être faite , ou par elle-même ou par une autre personne , trois ou quatre fois de suite. Il faut tenir à chaque fois la seringue dans la partie pendant quelques minutes , & répéter la même opération six ou huit fois par jour. Une seringue faite d'une bouteille de résine élastique , avec un col plus long & plus épais qu'à l'ordinaire , peut remplir parfaitement l'objet qu'on se propose , & détruire le préjugé qu'on a eu si justement jusqu'ici contre l'efficacité des injections chez les femmes.

Quant aux ulcères vraiment cancéreux des parties génitales , aussi bien que des autres parties du corps , la matiere médicale ne fournit , que je sache , aucun remede pour les guérir ; & tous ces remedes qu'on a vantés jusqu'ici pour la guérison des cancers ne paroissent être que les fruits de l'erreur ou de la mauvaise foi de ceux qui les ont inventés. L'opération seule peut guérir les cancers radicalement , si l'on y a recours à tems ; & un Médecin honnête homme ne recommandera jamais des remedes incer-

tains pour amuser les malades , & leur faire perdre ainsi le moment d'appliquer le seul qui soit certain , je veux dire *l'extirpation faite à tems* , lorsqu'elle peut avoir lieu.

Des fistules vénériennes.

En traitant des ulcères vénériens , nous devons dire un mot sur les fistules vénériennes , qui ne sont autre chose que des ulcères vénériens pénétrant profondément dans le tissu cellulaire & dans les parties adjacentes , avec un petit orifice , qui est calleux , ainsi que leur intérieur. Leur siège est le plus souvent dans l'uretère , aux aines , à l'anus , &c. mais quelquefois aussi dans le sac lacrymal.

Indépendamment du mercure administré à l'intérieur , on doit essayer les injections que nous avons recommandées ci-dessus. Si elles ne réussissent pas , il faut se résoudre à l'opération chirurgicale. On ne doit cependant jamais la pratiquer , avant d'avoir complètement déraciné de la masse générale le virus vénérien dont elle est infectée. Pour avoir négligé ce point essentiel , nous voyons journellement des malades obligés d'essuyer deux ou trois fois l'opération ,

sans se trouver mieux pour cela. La fistule demeure aussi opiniâtre qu'auparavant, ou si on la guérit dans un endroit, elle perce bien-tôt dans un autre. Si la fistule se guérit vite & parfaitement après l'opération, c'est un signe que le malade a été radicalement guéri de la vérole.

La fistule lacrymale, qui procède du virus vénérien logé dans le sac lacrymal, fournit très-souvent un écoulement jaune-verdâtre, semblable à celui qui sort de l'uretre dans la gonorrhée. Je ne puis dire positivement si elle est jamais l'effet de la suppression ou répercussion de la gonorrhée; mais elle doit fréquemment son origine au virus vénérien déposé de la masse des humeurs qui en est infectée, & il faut la traiter par les remèdes mercuriels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La matiere virulente qui sort des fistules & ulceres vénériens est quelquefois d'une nature très-corrosive. Il faut conséquemment les panser avec un morceau d'éponge douce une ou deux fois dans les vingt-quatre heures, & défendre avec soin la superficie de la peau environnante, en la couvrant de cerat blanc ou de liniment saturnin.

CHAPITRE VIII.

Du P H Y M O S I S.

ON a appelé *phymosis* du grec *φίμωσις* *præcludo, obturo*, cette maladie dans laquelle le prépuce est si resserré sur la pointe de la verge, qu'il ne peut retourner en arriere sur le gland. On pourroit l'appeller plus justement *coarctation* ou *rétreecissement du prépuce*.

Les hommes qui ont naturellement le gland couvert d'un prépuce plus étroit, ou chez lesquels le frein est trop court ou trop serré, sont le plus sujets à cette maladie; & tous les peuples qui se font circoncire en sont exempts.

De nos jours, ce mal procede communément d'ulceres vénériens situés dans l'intérieur du prépuce, ou de la gonorrhée batarde (*blennorrhagia balani*), qui produisent une tuméfaction & une inflammation du prépuce.

On a recommandé, lorsque le phymosis est violent, de faire une incision au prépuce, & certainement cela est quelquefois nécessaire. Mais je suis d'avis qu'il faut éviter

autant qu'on le peut les opérations chirurgicales. Les principaux motifs qu'on a eus pour conseiller cette opération , sont , ou de prévenir l'agrandissement des chancres , qui sont souvent la cause du phymosis , ou d'éviter les bubons , ou , ce qui est encore plus essentiel , d'empêcher , s'il y a des ulceres , le collement du gland avec le prépuce. Les personnes qui dans le traitement des chancres se fient entierement à l'usage interne des remedes mercuriels , n'insisteront gueres sur cette opération. Quant au danger qu'ils ne produisent des bubons par l'absorption du virus , je conviens qu'on a raison de le craindre ; mais je ne puis admettre que l'incision en soit le préservatif. Une nouvelle blessure en exposant une surface nouvelle & plus grande à l'absorption du virus , doit plutôt , selon mon opinion , augmenter le danger. J'estime donc qu'il est plus à propos d'obvier à ces mauvaises suites en faisant des injections appropriées , & en introduisant de la charpie fine une ou deux fois par jour , au moyen d'un stilet , entre le prépuce & le gland. Si cependant cela étoit impraticable , ou qu'il parût des taches livides sur le prépuce , il faudroit

avoir recours à l'opération , de peur qu'il ne s'ensuivît un plus grand mal : la mortification de la partie.

Afin de m'assurer s'il y a un ulcere vénérien entre le gland & le prépuce, j'introduis un stilet, auquel est fixé un peu de charpie. Je le tourne ensuite tout autour du gland. S'il y a un ulcere, le malade sent communément de la douleur aussi-tôt que le stilet & la charpie y touchent; & en les retirant, je trouve la charpie tachée d'un côté d'une matiere purulente ou puriforme, au lieu que s'il n'y a qu'une simple gonorrhée batarde sans ulcere, toute la charpie se trouve également tachée. Dans l'un & l'autre cas, si l'inflammation & la tuméfaction sont très-considérables, j'applique un cataplasme de *mica panis* mêlé avec du vinaigre lithargiré, & j'injecte trois ou quatre fois par jour entre le prépuce & le gland, une dissolution de mercure dans l'acide nitreux étendue, ou le sublimé corrosif ou le calomel suspendus dans l'eau de chaux, ou, suivant les circonstances, la dissolution de mercure par la gomme arabique de Plenck; & je fais enforte que l'interstice entre le prépuce & le gland soit rempli &

distendu par l'injection. S'il y a quelque ulcere , on peut y appliquer une ou deux fois par jour de la charpie trempée dans les mêmes remedes , au moyen d'un stilet. Je pense qu'il n'y a jamais de danger que les parties se collent tant que les ulceres sont vénériens ; & lorsqu'ils ont changé de nature , le phymosis est ordinairement dissipé. On ne doit jamais négliger d'administrer des remedes mercuriels à l'intérieur dans ces cas-là ; mais il faut faire l'incision du prépuce tout de suite , ainsi que je viens de l'observer , si l'inflammation est très - forte , s'il paroît quelque signe de gangrene imminente , ou si l'on a quelque raison de soupçonner au dessous du phymosis une exulcération d'un mauvais caractere , ou , comme cela peut arriver , de nature cancéreuse.



CHAPITRE IX.

Du *PARAPHYMOSIS*.

LE *paraphymosis*, mot dérivé du grec *παρε*, & de *φimos præclusio*, *obturamentum*, qui signifie l'opposé de *phymosis*, est une maladie dans laquelle le prépuce étant retiré derrière le gland, y est si contracté, qu'il ne peut plus le recouvrir. C'est pourquoi je pense qu'on pourroit la nommer avec plus de justesse, *étranglement du gland*.

Les hommes qui ont naturellement le prépuce étroit sont les plus sujets à cette maladie, qui procède, soit d'ulcères vénériens, soit de la tuméfaction du gland, comme cela arrive quelquefois dans les gonorrhées violentes. J'ai peu de chose à ajouter à ce qu'on trouve sur ce sujet dans Celse & dans quelques Auteurs modernes.

J'ai vu une fois la gangrene se mettre au gland ensuite d'un pareil étranglement, avant que le Chirurgien fût arrivé pour y apporter du remède. Nous devons par conséquent faire nos plus grands efforts pour

ramener le prépuce en avant le plutôt qu'il est possible.

Le remède le plus efficace pour cet effet est de jeter de l'eau froide à plusieurs reprises sur la partie, en pressant doucement en même-tems, avec les doigts qu'on plonge de tems en tems dans l'eau froide, le gland tuméfié, afin de répercuter, s'il est possible, par cette fraîcheur & par cette douce pression, le sang qui est accumulé dans sa substance caverneuse. Ce sont les moyens les plus efficaces pour diminuer la turgescence; & avec de l'adresse & de la patience, en poussant doucement le gland en arrière, pendant qu'on tâche, avec les doigts de l'autre main, de ramener le prépuce en avant, on y réussit très-souvent, & l'on délivre le malade d'un danger imminent. La glace ou l'eau à la glace peut être très-utile à la personne qui opere, pour remplir cet objet; mais si la maladie est accompagnée d'une gonorrhée vénérienne, il faut être circonspect, relativement à l'application du froid, de peur de causer par la répercussion un mal pire que celui pour lequel on l'applique. Si l'on ne peut parvenir à réduire assez tôt le para-

phymosis , & que les symptômes soient violens , il ne faut pas différer de faire une incision au prépuce , ou au frein : opération qui n'est nullement dangereuse , mais qui est absolument nécessaire pour prévenir l'un des plus fâcheux accidens qui accompagnent les maux vénériens , la mortification du gland. S'il y a des ulcères vénériens d'un côté , je préfère toujours de faire l'incision du frein ou du prépuce sur le côté opposé , afin de garantir la blessure des impressions du virus , autant qu'il est possible , & d'en empêcher l'absorption par les vaisseaux lymphatiques de cette nouvelle plaie.



CHAPITRE X.

Des BUBONS VÉNÉRIENS.

ON appelle *bubons* les tumeurs des glandes lymphatiques du corps. Si ces tumeurs sont occasionnées par le virus, on leur donne alors le nom de *bubons vénériens* (vulgairement *poulains*) ; & cette espece est la seule qui entre dans le plan de cet Ouvrage.

Quoique les bubons puissent naître dans toutes les parties du corps où sont situées les glandes lymphatiques, nous n'avons aucune observation authentique qu'ils aient jamais existé ailleurs qu'aux glandes lymphatiques des aines, des aisselles, ou des extrémités. Et même parmi celles-ci, les dernières en sont beaucoup moins souvent affectées que les premières.

Les bubons vénériens naissent de deux causes essentiellement différentes l'une de l'autre ; & l'on n'a pas fait en général à cette différence une attention aussi particulière que l'importance du sujet sembloit l'exiger. On a supposé jusqu'ici que les bu

bons naissent toujours du virus vénérien absorbé par les vaisseaux lymphatiques, & porté à la glande par leur moyen ; mais il n'en est pas toujours de même. Les bubons doivent souvent leur origine au virus logé à la surface du corps, & irritant en cette partie les orifices des vaisseaux lymphatiques, sans être absorbé par eux. Ces vaisseaux étant irrités, produisent une tumeur dans la glande lymphatique la plus prochaine à laquelle ils aboutissent. Dans le premier cas, la cause du bubon gît dans la glande même ; dans le second, elle est ailleurs ; enforte que nous pouvons les distinguer d'une manière convenable, en appelant les premiers *bubons idiopathiques*, & les seconds, *bubons sympathiques*.

Cette distinction étant fondée sur les faits les plus évidens, elle est absolument nécessaire pour régler la méthode qu'il faut suivre dans leur traitement. Mais la division des bubons idiopathiques en *primitifs* & *secondaires* ; c'est-à-dire, en bubons provenans d'une infection immédiate, & en bubons qu'on suppose produits par le virus qui se dépose de la masse générale dans la glande, paroît n'être d'aucun usage dans la pratique.

Les *bubons vénériens idiopathiques* doivent leur origine , ainsi que nous l'avons observé , au virus vénérien absorbé & porté dans la glande. Cette absorption a lieu fort souvent après que le virus par son acrimonie a produit quelque légère excoriation ou exulcération, sur la superficie du gland, du prépuce, de l'uretre, ou de quelque autre endroit des parties génitales ou des extrémités.

C'est encore un problème pour moi, s'il y a jamais des bubons produits, ainsi qu'on l'a généralement assuré, par le virus vénérien qui se dépose de la masse générale dans la glande affectée, de la même manière que le bubon pestilentiel est produit dans la peste. Cette assertion paroît jusqu'à présent plutôt fondée sur une supposition hypothétique que sur l'observation réelle. Mais il est probable par plusieurs observations authentiques que les bubons peuvent quelquefois provenir, quoique rarement, d'une absorption immédiate, sans être précédés d'aucune excoriation ni d'aucun ulcère à la surface du corps, quoique cela ait été contredit par quelques Auteurs modernes.

Il y a environ douze ans que dans l'espace d'une semaine il se présenta dans l'hôpital militaire trois soldats, tous affectés d'un bubon qu'ils avoient pris de la même femme. Ils avoient tous été en parfaite santé quelques jours auparavant ; aucun d'eux n'avoit à son arrivée la moindre excoriation aux parties génitales, ou aux cuisses, ni même aucune apparence d'écoulement.

Je ne prétends pas déterminer s'il faut attribuer cette absorption immédiate à un engourdissement ou défaut d'irritabilité dans la complexion, ou à une plus grande ténuité, ou à une qualité moins irritante dans le virus en certains cas. Mais c'est peut-être à raison de cette absorption immédiate, qu'on ne peut pas toujours éviter de prendre des bubons ou peut-être même la vérole, en employant les meilleurs préservatifs, quoiqu'ils puissent prévenir très-efficacement les gonorrhées & les chancres primitifs.

L'expérience confirme que les bubons idiopathiques procedent non-seulement de l'absorption du virus vénérien que contiennent les ulcères des parties génitales

ou de l'uretre; mais encore de l'absorption du virus qui se trouve dans les ulcères vénériens de quelque partie que ce soit des extrémités supérieures ou inférieures. Je rapporterai quelques exemples pour éclaircir cette théorie.

Un de mes plus intimes amis eut le malheur, il y a quelques années, d'être attaqué de chancres. Etant alors en voyage il prit des pillules mercurielles, & par ce moyen les ulcères furent guéris en dix jours ou environ. Pour lors il cessa d'en prendre; & il n'eut aucun mal pendant six mois. Au bout de ce tems, il fut éveillé une nuit par une vive démangeaison à son coude droit. La nuit suivante, il éprouva la même chose, & le matin en examinant la partie affectée, il la trouva couverte d'une croute jaune épaisse comme une dartre. Se trouvant alors en route, il différa de consulter, croyant que son incommodité pourroit se dissiper. Mais deux jours après, il s'apperçut d'une tumeur sous son aisselle, & en trois jours de plus elle s'accrut à un tel point, que lorsqu'il vint me trouver il étoit obligé de tenir son bras considérablement écarté de son corps. Je

lui

lui dis que son mal étoit de nature vénérienne : en peu de jours, au moyen des applications convenables, la tumeur fut dissipée; & mon malade se trouva parfaitement guéri au bout de quelques semaines.

Bientôt après, je fus consulté par un homme qui avoit essuyé depuis environ quinze mois un traitement mercuriel, pour une maladie vénérienne dont il se croyoit parfaitement guéri. Quelques semaines avant de s'adresser à moi, il éprouva dans le milieu du sternum une douleur qu'il prit pour rhumatismale. D'après cette supposition, il frotta la partie affectée, matin & soir, avec un morceau de flanelle. Par ce moyen, la douleur du sternum fut dissipée; mais le sur-lendemain matin, le gros orteil & le second orteil du pied gauche furent affectés de la même manière. La douleur ayant été déplacée par la friction avec la flanelle, comme auparavant, retourna au sternum, d'où étant de nouveau chassée par une semblable friction, elle retourna encore au pied. Il commença de s'imaginer alors que sa douleur étoit de nature goutteuse. Mais ayant occasion d'aller dehors ce jour-là, il baigna son pied dans de l'eau

178 OBSERVATIONS PRATIQUES

chaude, & coupa un cors qu'il avoit sur l'un des orteils affectés, afin de pouvoir marcher plus à son aise. En faisant cette opération, il tailla un peu dans le vif : ce qui donna quelques gouttes de sang. Il se désista sur le champ ; mais le lendemain en examinant la partie, il trouva qu'il s'y étoit établi une petite suppuration. Il couvrit alors la plaie avec un morceau de linge propre. Le soir du jour suivant, il sentit à l'aîne une douleur légère, à laquelle il ne fit point attention. Mais peu de jours après, une des glandes inguinales étant devenue de la grosseur d'un œuf de pigeon, il me demanda mon avis. Je lui déclarai qu'il n'avoit pas été radicalement guéri de sa maladie précédente, & que les symptômes actuels en étoient la conséquence ; que la douleur tant du sternum que des orteils étoit vénérienne ; & que de la blessure de l'orteil & de la suppuration qui s'en étoit suivie, le virus avoit été absorbé par les vaisseaux lymphatiques, & porté à la première glande qu'ils avoient rencontrée, & qui dans ce cas étoit une des glandes inférieures de l'aîne. L'ulcère de l'orteil subsistoit toujours, mais il étoit très-petit &

réndoit une matiere semblable à du pus. J'ai appliqué un emplâtre mercuriel ; & je guéris le bubon aussi-bien que sa cause par le moyen des frictions mercurielles.

Il y a quelques années qu'un fameux Accoucheur à Londres fut appelé pour délivrer une femme qui sans qu'il le sût étoit affectée de chancres. Il en résulta des ulceres à la main de cet Accoucheur & une tumeur de la glande lymphatique de son avant-bras. Et ce qu'il y eut de plus désagréable, c'est que ces accidens furent très-opiniâtres.

Les bubons vénériens sympathiques doivent leur origine, comme je l'ai dit plus haut, non pas à l'absorption du virus vénérien ; mais à une irritation des orifices des vaisseaux lymphatiques du voisinage. L'on rencontre souvent cette espece de bubons dans les simples gonorrhées vénériennes ; ou bien lorsqu'une des glandes est idiopathiquement affectée, on en voit quelquefois deux ou trois de celles qui sont contigues, s'enfler par sympathie. Dans ce cas néanmoins, il n'y a que celle qui est réellement infectée qui continue de grossir, tandis que les autres demeurent dans le

même état, & enfin disparoissent sans que leur volume ait jamais augmenté.

Les bubons sympathiques se dissipent spontanément, aussi-tôt qu'on a détruit la cause irritante qui est dans leur voisinage. Et c'est seulement cette espèce de bubons que les Charlatans avec leurs prétendus secrets semblent quelquefois dissiper en peu de jours. Tandis que d'un autre côté, l'on entend fréquemment les malades se plaindre des meilleurs Médecins, parce qu'ils n'ont pas assez promptement guéri leurs bubons, ou parce qu'ils ne les ont pas empêchés de venir à suppuration; au lieu qu'ils ont autrefois été guéris par un Empirique, au moyen d'un simple onguent ou d'un emplâtre mercuriel, appliqué sur la partie affectée. Si cependant ces malades connoissoient la différence qui se trouve entre la nature de leur mal actuel & celle du mal qu'ils ont eu précédemment, ils reconnoitroient que dans le premier cas il ne falloit pas attribuer la guérison du bubon à l'onguent ou à l'emplâtre qu'on y avoit appliqué, mais uniquement à la nature de la maladie; tandis que dans le dernier, il faut souvent beaucoup d'habileté

& d'attention, soit pour résoudre un bubon, soit pour le guérir après que les tentatives qu'on aura faites pour le résoudre ont été sans succès.

Après avoir établi cette distinction essentielle entre les bubons idiopathiques & les bubons sympathiques, je devrois maintenant passer à la méthode de les traiter. Mais je pense qu'il sera utile d'examiner & dissiper auparavant quelques préjugés, qui sont assez répandus, concernant la nature & le traitement de cette maladie.

Bien des personnes, & sur-tout parmi les habitans des parties méridionales de l'Europe, regardent comme une pratique dangereuse de résoudre ou dissiper un bubon vénérien. Ce préjugé est né de l'opinion où l'on est, que par cette méthode le virus est répercuté & repompé dans la masse générale, où il occasionne ensuite une infection universelle. Au lieu que si le bubon se guérit par la suppuration, ils s'imaginent qu'il n'y a point à craindre d'infection générale. Mais qu'au contraire, dans le cas même où il y auroit du virus absorbé pendant la formation de l'abcès, la suppuration expulseroit & le

virus contenu dans la glande , & celui qui auroit été absorbé. D'après cela , ils imaginent que l'abcès formé par la suppuration du bubon , est une espece d'égout par lequel le corps est entierement purgé de tout le virus vénérien. Mais comme cette opinion , outre qu'elle est entierement erronée , peut encore devenir nuisible au malade , au moins en le privant d'un avantage dont il auroit pu jouir sans cela ; je dois faire deux remarques sur ce sujet. La premiere est que moyennant la méthode d'appliquer des frictions mercurielles , telle qu'elle a été perfectionnée dans la pratique moderne , la résolution d'un bubon ne peut jamais occasionner la rétropulsion du virus vénérien dans la masse générale ; mais qu'au contraire en suivant cette méthode , on parvient à détruire le virus qui est niché dans la glande même. La seconde est que quand même le virus seroit effectivement répercuté de la glande dans la masse générale , une pareille rétropulsion seroit encore préférable à la méthode de guérir le bubon par la voie de la suppuration.

Mais afin de mettre cette matiere dans le plus grand jour , je me prévaudrai des

découvertes anatomiques qu'on a faites sur le système lymphatique, & je considérerai d'après cela quel peut être l'effet des frictions mercurielles appliquées comme je le dirai ci-dessous.

On fait par les observations du Professeur Alexandre Monro, & par celles du Docteur Guillaume Hunter; & particulièrement par les planches d'Hewson, que les vaisseaux lymphatiques ou absorbans commencent par-tout à la surface du corps par les plus petites ramifications (1); qu'en remontant des extrémités inférieures, ils se réunissent en branches plus grosses qui se terminent dans les glandes inguinales, dans lesquelles ils versent le liquide qu'ils ont absorbé de la surface du corps par leurs extrémités; ce liquide qui dans l'état naturel n'est qu'une lymphe douce plus ou moins étendue d'eau, après avoir été déposé dans les glandes lymphatiques des

(1) Ce point de doctrine anatomique sera encore mieux éclairci avec l'anatomie de tout le système lymphatique, & l'exposition des maladies qui en dépendent, par des planches d'une beauté & d'une exactitude singulieres, que fait exécuter M. Sheldon, Professeur d'Anatomie à Londres; & dont il est à desirer que le Public soit bientôt mis en possession. P. S. Le 1^{er} cahier vient de paroître.

aines, y est absorbé de nouveau par d'autres vaisseaux lymphatiques qui le portent à l'abdomen, & de-là il se rend par le canal thorachique dans le torrent de la circulation. Supposons maintenant qu'une portion de virus vénérien ait été absorbée par les vaisseaux lymphatiques des parties génitales ou des extrémités inférieures, & que par conséquent elle ait été portée conjointement avec la lymphe dans une ou plusieurs des glandes inguinales. Le virus étant une fois parvenu à la glande; ou il sera repris par les vaisseaux absorbans opposés, & dans ce cas il sera porté dans la masse des humeurs; ou, ce qui arrive plus fréquemment, il excitera par son acrimonie une irritation, au moyen de laquelle non-seulement il préviendra sa propre absorption par les vaisseaux opposés; mais encore il enflammera & tuméfiera la glande. Dans ces circonstances, le meilleur parti qu'il y ait à prendre, est de détruire radicalement, s'il est possible, le virus niché dans la glande. L'on sait que le mercure est le spécifique pour cet effet; mais la question est de l'amener dans la glande affectée. Les Praticiens qui nous ont précédés se sont

imaginés, faute de connoissances anatomiques, qu'ils introduiroient le mercure dans la glande en faisant des frictions avec l'onguent mercuriel sur la glande même; mais bien loin que cette pratique eût l'effet qu'on s'en promettoit, les bubons traités de cette maniere s'enflammoient communément davantage, suppuroient, & même quelquefois se gangrénoient. En opérant ainsi, on n'introduit point de mercure dans la glande affectée, ou si cela arrive de tems en tems, c'est un pur hasard; car nous savons que les vaisseaux lymphatiques qui partent de la peau dont la glande est immédiatement couverte, ne prennent pas leur cours vers la substance de la glande; mais marchent obliquement en montant vers l'abdomen. D'où il résulte qu'on ne doit point attribuer au mercure les bons ou mauvais effets qu'on éprouve dans ce cas, mais plutôt à l'irritation mécanique occasionnée par les frictions; & ils auroient probablement eu lieu si l'on eût employé tout autre onguent. Mais si, au lieu de faire les frictions avec l'onguent mercuriel sur la glande même, on les fait sur la cuisse ou sur la jambe du côté affecté,

186 OBSERVATIONS PRATIQUES

on peut s'attendre, d'après les connoissances nouvelles qu'on a acquises sur le cours des vaisseaux lymphatiques, que le mercure sera absorbé par leurs extrémités, & de-là conduit à la glande affectée, où rencontrant le virus vénérien, il exercera très-efficacement contre lui son pouvoir spécifique. Les heureux succès qu'on obtient de cette méthode dans la pratique prouvent la vérité de cette théorie. Car si l'on a appliqué les frictions mercurielles sur l'endroit convenable & à tems, c'est-à-dire, avant que l'inflammation ait fait trop de progrès, on observe que sur dix bubons, il y en a huit dans lesquels le virus se trouve ou détruit ou tellement dénaturé, qu'il n'est plus capable d'irriter ultérieurement la glande. Et nous n'observons pas que le virus ainsi altéré, & ensuite absorbé conjointement avec le mercure, produise jamais après cela aucun symptôme vénérien dans la masse générale.

Mais supposons même que le mercure n'ait pas détruit le virus niché dans la glande, mais qu'il l'ait poussé dans le sang comme les malades le croient communément : quelle en sera la conséquence ? La

même sans doute que quand un héros victorieux déloge & chasse un ennemi fuyant devant lui. Le même remède qui a poussé le virus de la glande dans la masse générale, l'y poursuivra, & l'en expulsera entièrement, ou le rendra de manière ou d'autre incapable de nuire à l'économie animale.

Pour éclaircir encore davantage cette matière intéressante, je dois répondre à une question que j'ai souvent entendu proposer : savoir, pourquoi la méthode d'appliquer les frictions mercurielles aux extrémités ne réussit pas toujours à résoudre le bubon dans toutes les périodes de la maladie ? Il faut encore avoir recours à l'anatomie pour la solution de ce problème. Elle nous enseigne qu'il y a dans l'aîne deux séries de glandes lymphatiques, qu'on distingue en supérieures & inférieures. Il existe dans la plupart des sujets une communication entre ces deux ordres de glandes. Dans ce cas, les vaisseaux lymphatiques des glandes inférieures communiquent avec les supérieures, desquelles il naît encore d'autres vaisseaux lymphatiques qui prennent leur cours à travers l'abdomen vers

le canal thorachique. Mais dans certains sujets, il n'y a point de pareille communication. Les vaisseaux lymphatiques des glandes inguinales inférieures, marchent directement vers l'abdomen sans s'aboucher avec les supérieures. Or, le virus vénérien étant absorbé par les vaisseaux lymphatiques des parties génitales est communément porté par leur moyen aux glandes inguinales supérieures, où il produit le bubon. Par conséquent toutes les fois que les glandes inguinales inférieures ont avec les supérieures la communication dont nous venons de parler, le mercure appliqué par les frictions à la partie latérale interne de la cuisse ou de la jambe sera absorbé & porté aux glandes inguinales inférieures; & de-là aux supérieures, où il produira l'effet désiré. Mais d'un autre côté, lorsque cette communication n'a pas lieu, le mercure est porté de l'extrémité aux glandes inguinales inférieures, & de-là à l'abdomen sans jamais atteindre à la glande affectée, sur laquelle il ne peut produire aucun effet (1).

(1) La même chose doit arriver aussi, lorsque l'inflammation du bubon est trop forte, ou lorsqu'il s'est formé une dureté squir-

Mais allons même plus loin, & supposons qu'on n'ait pas suivi la méthode curative que nous venons de recommander, & qu'au lieu de cela on ait simplement adouci la matiere irritante, & procuré l'absorption du virus de la glande par d'autres topiques sédatifs ou discutifs; quelle en sera la conséquence? Je réponds : au lieu d'un bubon, le malade sera atteint d'une maladie de tout le système, qu'on peut, si elle est récente, guérir sûrement & radicalement en peu de semaines, sans qu'il en reste de mauvaises suites. Tandis que le mal dont il étoit auparavant attaqué est quelquefois très-dangereux, quelquefois extrêmement opiniâtre, & toujours d'une nature très-ennuyeuse. D'ailleurs lors même que la suppuration est de la meilleure espece : ce qui cependant n'arrive pas toujours à beaucoup près; le virus avant & après la formation de l'abcès, au lieu de s'évacuer entier, est absorbé, sinon toujours, du moins très-souvent dans la masse générale,

reuse dans la glande. Le mercure, dans ce cas, ne peut avoir que peu ou point d'accès à la glande, ou, s'il y parvient, il n'a que très-peu d'action contre une maladie qui a changé de nature.

& produit ainsi réellement la maladie que le malade croyoit éviter ; & il est enfin obligé d'avoir recours pour s'en délivrer, à ce mercure auquel il avoit craint mal-à-propos de se soumettre.

Procédons maintenant à la

Méthode curative.

Il suit des observations que je viens de faire, que tout praticien impartial doit toujours tenter de résoudre les bubons idiopathiques le plutôt qu'il est possible, par quelque méthode que ce soit, pourvu que l'inflammation ne soit pas montée à un trop haut période, ou qu'il n'ait pas déjà paru des signes de suppuration. La méthode la plus efficace pour résoudre les tumeurs de ce genre, est, comme je l'ai dit, de faire des frictions mercurielles à la partie latérale interne de la cuisse ou de la jambe, du côté affecté, si le bubon est inguinal, ou au bras, si le bubon est sous l'aisselle. Quelquefois aussi dans le premier cas on peut faire les frictions au périnée ou au scrotum ; mais comme le succès de ces frictions est limité à un petit nombre de jours, il faut non-seulement les faire avec

beaucoup de soin & d'attention ; mais il faut encore, si les circonstances le permettent, les réitérer deux fois par jour. La saignée ou la purgation, peuvent aussi, suivant l'exigence du cas, contribuer beaucoup à l'effet qu'on se propose.

Je n'applique jamais autre chose à la glande qu'un emplâtre mercuriel ; non point dans l'espérance qu'il contribue aucunement à la guérison, mais pour tranquiliser l'esprit au malade. On a beaucoup recommandé depuis peu un cataplasme fait avec la racine de mandragore (*Atropa mandragora. Linn.*) pour résoudre les bubons. D'autres ont vanté un cataplasme fait avec la racine de lauréole (*Daphne mezereum. Linn.*). Ces remèdes méritent certainement l'un & l'autre qu'on les éprouve, soit seuls, sur-tout lorsque les frictions paroissent n'avoir aucun effet, soit conjointement avec les frictions. Je conseillerois aussi dans des cas opiniâtres l'application des ventouses sèches à la glande tuméfiée : ce qu'on a pratiqué avec succès à Edimbourg. On a proposé l'usage des vomitifs réitérés, avec l'application de topiques froids à la partie affectée, comme propres à procurer la

réolution des bubons ; mais je n'ai jamais eu besoin d'essayer aucun de ces remèdes ; pas même la ciguë qu'on a tant vantée pour cet effet tant à l'intérieur qu'en topique.

Pendant tout le tems qu'on travaille à procurer la résolution du bubon , le malade doit s'abstenir de l'exercice , & se borner à une diète très-stricte ; par la raison qu'un régime contraire tendroit à augmenter l'inflammation. A l'égard des frictions mercurielles sur la glande même , j'ai déjà donné mes raisons pour les désapprouver. Dans le fait , la plupart des bubons idiopathiques que j'ai eu l'occasion de voir traités , soit de cette manière , soit avec tout autre remède irritant , se sont enflammés & ont suppuré , quoiqu'on y appliquât ces remèdes dans la vue de prévenir cette fâcheuse circonstance. Et il est maintenant bien peu de Praticiens qui , étant instruits des nouvelles découvertes qu'on a faites sur le système lymphatique , voulussent se fier à de pareils moyens pour procurer la résolution d'un bubon vénérien.

Lorsque je dis que l'irritation de la glande sera plutôt suivie de l'inflammation & de la
suppuration

suppuration que de la résolution, je parle expressément des bubons vénériens idiopathiques. Car les bubons sympathiques peuvent certainement disparaître après l'usage des frictions mercurielles faites sur la glande même, comme je l'ai fréquemment observé. Cependant, même dans ce cas, il ne faut pas attribuer leur résolution aux frictions mercurielles, ou aux cataplasmes, &c. qu'on peut y avoir appliqués, mais à la simple opération de la nature. Car les bubons sympathiques s'évanouissent toujours d'eux-mêmes sans le secours d'aucun topique quelconque. Il ne faut faire autre chose, pour les dissiper, comme je l'ai dit ci-dessus, que détruire le stimulus, ou l'éloigner des orifices des vaisseaux lymphatiques. Ce point de fait suffit, à mon avis, pour prouver de quelle importance il est de distinguer dans la pratique les *bubons idiopathiques*, ou qui doivent leur origine au virus vénérien pompé dans les chancres des parties génitales ou des extrémités, des *bubons sympathiques*, qui n'ont pour cause que la simple irritation des vaisseaux lymphatiques, & qui accompagnent communément les gonorrhées simples, les tumeurs

des testicules, &c. sans qu'il y ait aucune apparence d'ulcère vénérien.

J'en ai dit assez sur le traitement des bubons vénériens par résolution ; je vais traiter maintenant de ceux qui sont trop avancés pour être susceptibles de résolution, ou qui y résistent par toute autre raison.

On reconnoît qu'un bubon ne se résoudra point, lorsque la tumeur continue de grossir, & devient rouge & douloureuse après quatre ou cinq jours d'usage des frictions mercurielles, ou des autres résolutifs qu'on a employés. Aussi-tôt qu'on voit que toutes les tentatives qu'on a faites pour procurer la résolution sont inutiles, il faut employer toute sorte de moyens pour amener une suppuration aussi douce & aussi prompte qu'il est possible. Ici cependant on rencontre trois espèces de bubons entièrement différens l'un de l'autre, chacune desquelles exige un traitement particulier, & même diamétralement opposé à celui des autres. Cette distinction est si essentielle, que le traitement qui conduira une espèce de bubons à une douce suppuration, peut, si on l'applique à une autre, occasion-

ner des symptomes très-dangereux , & même devenir funeste.

Dans l'une , tous les symptomes de l'inflammation montent au plus haut période , & vont même quelquefois jusqu'à la gangrene ; au lieu que dans l'autre , les remedes les plus irritans sont à peine capables de porter l'inflammation au degré nécessaire pour amener une suppuration. Dans la premiere espece , il est nécessaire de modérer l'inflammation ; dans l'autre , de l'exciter & de l'augmenter. Lors donc que le malade est d'ailleurs d'une constitution saine , forte & vigoureuse , que l'inflammation est vive , accompagnée d'une douleur cruelle & d'une fièvre inflammatoire , la saignée même réitérée , selon les circonstances , peut être nécessaire. Cependant les sangsues , ou à leur défaut , les scarifications sur la partie affectée sont souvent préférables aux saignées générales. L'on doit en outre insister , dans ces sortes de bubons , sur une diete légère & sur les boissons rafraîchissantes , donner un purgatif antiphlogistique , faire prendre des bains chauds , & appliquer chaudement à la glande un cataplasme émollient , qu'on

aura soin de changer lorsqu'il se refroidira.

Dans la seconde espece , les symptomes de l'inflammation ne paroissent portés à un très-haut degré , que par l'effet d'une trop grande irritabilité ; mais on distingue facilement cette sorte d'inflammation de la précédente , par le pouls qui est plus foible , plus mol & plus fréquent , comme aussi par le tempérament du malade. J'ai observé que les évacuations générales , au lieu d'être utiles dans ces circonstances , sont pour l'ordinaire réellement préjudiciables. On doit au contraire permettre au malade de prendre plus d'alimens. Il faut lui administrer le quinquina dans la journée , & lui donner de l'opium tous les soirs , ou de deux jours l'un ; & il est à propos d'ajouter des remedes sédatifs aux topiques émolliens qu'on applique à la partie affectée. Il faut probablement rapporter à cette classe le cas que M. Brambilla rapporte d'un jeune homme qui mourut d'un bubon devenu gangréneux après qu'on lui eut administré pendant quelque tems le calomel avec une forte décoction des bois. Je dois faire à

cette occasion une remarque générale ; c'est qu'il ne faut jamais administrer du mercure, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, à moins qu'il n'y ait quelque raison très-particulière pour le faire, pendant l'état inflammatoire d'un bubon, ou de toute autre affection vénérienne. Je n'ai jamais observé que le mercure ait fait aucun bien dans cette période ; mais j'ai vu souvent qu'il produisoit de très-mauvais effets, & sur-tout lorsqu'on l'employoit en frictions sur la glande enflammée.

On rencontre assez souvent la troisième espèce de bubons qui diffère essentiellement des deux autres, dans des malades dont l'habitude du corps est relâchée ou affoiblie, ou qui sont cachectiques ou affectés d'un vice scorbutique. Dans ces circonstances, la tumeur de la glande, quoiqu'elle paroisse rouge & enflammée, s'élève très-peu & très-lentement ; le malade ne sent que peu de douleur ; il n'y a point de fièvre, ou s'il y en a, c'est une espèce de fièvre lente ; le pouls est foible, & les esprits sont abattus. Dans des cas pareils, si l'on en excepte celui du scorbut de mer, le mercure est quelquefois utile & nécessaire ; mais les

198 OBSERVATIONS PRATIQUES

évacuations, de quelque genre que ce soit, sont nuisibles. La diete nourrissante avec l'usage du vin, est celle qui convient le mieux. Et l'on éprouve de bons effets du quinquina en infusion dans du vin, ou des autres remedes fortifiants & aromatiques, auxquels on doit joindre l'application locale des stimulans plus ou moins actifs.

Si les symptomes du scorbut de mer prévalent, il ne faut jamais employer le mercure. Le malade doit aussi faire usage du vin de quinquina, &c., & peut en même-tems manger des oranges & autres fruits mûrs, ou prendre le suc des herbes antiscorbutiques, & faire chaque jour un exercice modéré en plein air.

Lorsque le bubon est enfin venu à suppuration, soit par ces moyens, soit par toute autre méthode, plusieurs Auteurs conseillent d'ouvrir l'abcès; mais j'aime mieux le laisser faire à la nature. J'ai trouvé par expérience que la nature livrée à elle-même ne manque presque jamais de faire une ouverture au tems qu'il faut; au lieu que les ouvertures artificielles sont souvent faites avant le tems opportun, c'est-à-dire, avant que l'abcès soit entierement formé,

& qu'il ait acquis sa maturité. Je trouve encore un autre avantage à laisser faire à la nature ; c'est que l'abcès qu'elle a ouvert se consolide en général beaucoup plus aisément ; au lieu que ceux qu'on ouvre au moyen de l'incision , ou par l'application d'un caustique , ont quelquefois des suites fâcheuses. Non-seulement leur traitement est ennuyeux & pénible , mais ils laissent en outre de grandes cicatrices ; & l'on doit toujours se faire une loi d'éviter ce dernier inconvénient, sur-tout chez les femmes , par des raisons qui se présentent d'elles-mêmes. L'on y réussit, pour l'ordinaire, en laissant faire l'opération à la nature : l'abcès alors ne s'ouvre communément que lorsque la glande est entièrement suppurée , & bientôt après il se forme une cicatrice , qui, la plupart du tems , est à peine visible , ou qui même disparoît tout-à-fait.

Il se rencontre néanmoins quelques cas particuliers dans lesquels il peut être à propos d'aider la nature , soit en dilatant l'ouverture , soit en faisant tout - à - fait une ouverture artificielle. Lorsqu'on trouve des bubons qui , nonobstant les remèdes

que nous avons indiqués ci-dessus , demeurent durs ou enflammés , sans se résoudre ou sans suppurer , on peut , indépendamment des autres remèdes , appliquer au milieu du bubon un petit morceau de pierre infernale , ou de pierre à cauter , à - peu - près gros comme un pois , & l'y laisser pendant deux ou trois heures tout au plus. Il faut ensuite oindre l'escarre avec un peu d'*unguentum cæruleum fortius* , & couvrir le tout d'un cataplasme émollient chaud. J'ai vu plusieurs fois employer avec succès cette méthode que M. Plenck a proposée le premier.

Je dois ajouter ici que j'ai vu dans plusieurs occasions , que la méthode usitée d'appliquer un large caustique sur le bubon , & de l'y laisser pendant dix ou douze heures , pour l'amener à suppuration , avoit de très-fâcheuses suites. J'en ai vu résulter deux fois la gangrene , & d'autres fois de très-grands & très-mauvais ulcères ichoreux ; & l'un de ceux-ci devint vraiment cancéreux , & finit par causer la mort au malade. Je n'ai jamais vu que l'application du petit caustique dont j'ai fait mention ci-dessus , ait été suivie de pareils inconvénients.

Dans d'autres cas , au lieu d'employer le caustique , on peut quelquefois obtenir le même effet de l'application de l'emplâtre commun *cum gummi* , ou d'un cataplasme d'oignons simplement rôtis ou bouillis dans l'huile. On a recommandé aussi un liniment suppuratif fait avec parties égales d'onguent *de arthanita* , d'onguent mercuriel & de racine de mandragore pilée , mêlées avec une suffisante quantité de miel ; mais je n'ai jamais eu occasion de l'essayer.

Lorsque l'abcès a été ouvert par la nature ou par l'art , on conseille communément d'administrer le mercure , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur , & de traiter ainsi l'ulcere comme un ulcere vénérien. Cette pratique est sans doute très-bonne en général ; mais dans certains cas , les frictions mercurielles , ou le mercure donné intérieurement , peuvent être nuisibles & souvent même donner naissance à des symptômes très-dangereux.

On ne peut conséquemment prescrire aucune méthode générale pour le traitement d'un bubon ulcéré. Mais le Praticien doit être dirigé par la nature de la maladie , & par la constitution du malade , ainsi

202 OBSERVATIONS PRATIQUES

que je l'ai dit ci-dessus , en traitant de l'état inflammatoire des bubons. Si le malade est vigoureux & sans fièvre , si le pus est d'une bonne consistance & de nature douce , il paroît qu'il n'est besoin d'appliquer aucun topique sur la plaie ; mais la continuation du même cataplasme qui a favorisé la suppuration , avancera certainement plus la guérison que ne feroit tout autre remède. Si l'abcès prend le caractère d'un ulcère vénérien , on peut joindre des injections mercurielles à l'usage intérieur du mercure.

Mais il y a d'autres cas de bubons ulcérés qu'on a ou entièrement négligés , ou auxquels on n'a pas fait jusqu'ici toute l'attention convenable. Quelquefois l'abcès , au lieu de se guérir , demeure dans le même état pendant plusieurs semaines , malgré qu'on ait continué l'usage du mercure , ou bien il paroît relâché & mollaſſe : l'écoulement est abondant , clair & ichoreux ; & dans le même tems , la santé du malade , au lieu de devenir meilleure , paroît empirer de jour en jour. Dans ces circonstances , il faut avoir recours à un traitement tout différent. Si le mercure qu'on

avoit administré auparavant, a donné quelques signes évidens de son absorption dans la masse générale, il ne faut pas attribuer obstinément les symptômes actuels à l'inefficacité de la préparation mercurielle qu'on a employée, & recourir en conséquence à une autre. On doit plutôt écouter la voix de la nature, & ne pas persister davantage dans l'usage d'un remede dont on ne voit aucun bon effet. Le mercure est un poison pour ces malades. Ils ont besoin d'une diete nourrissante, de boire du vin, de prendre du quinquina, de respirer l'air libre & pur de la campagne, & de faire un exercice modéré. L'ulcere n'exige d'autre pansément qu'une injection avec de l'eau vitriolique camphrée; ou, suivant les circonstances, on peut faire deux ou trois fois par jour une fomentation avec le quinquina. Il faut couvrir la plaie avec de la charpie fine, ou avec un morceau d'éponge douce, afin que la matiere puisse s'évacuer librement; & contenir l'appareil avec un morceau d'emplâtre agglutinatif étendu sur du linge. Pour empêcher que la cuisse ne soit excoriée par la matiere âcre que rendent ces ulceres, il suffit d'appliquer un peu de

cerat blanc sur les parties environnantes.

L'observation suivante servira d'éclaircissement à ce que je viens d'établir. Un bubon ulcéré fut traité, selon le cours ordinaire de la pratique, comme vénérien, par l'usage intérieur & extérieur du mercure. Cette méthode réduisit en deux mois de tems le malade à un si mauvais état, & l'ulcere avoit alors une si mauvaise apparence, qu'on jugea à propos d'avoir l'avis d'un autre Médecin, & je fus consulté. Je trouvai, à l'examen, un ulcere dont l'aspect annonçoit le relâchement & l'atonie. Je dis au Médecin & au Chirurgien qui avoient jusques-là traité ce malade, qu'à mon avis le mercure ne lui convenoit point, mais que les seuls remèdes dont il avoit besoin étoient les fortifiants, à l'intérieur & à l'extérieur, une diete nourrissante & l'usage du vin. Ils furent tous deux d'opinion que mon avis étoit déraisonnable, & qu'il falloit continuer l'usage du mercure, & l'employer seulement sous une différente préparation. Cependant, après une longue conversation, j'obtins d'eux d'essayer seulement pendant huit ou dix jours ce que j'avois proposé; & le malade

trouvant que ce traitement lui convenoit, il le continua pendant environ six semaines, & fut parfaitement rétabli.

Il se présenta un cas semblable à Londres, il y a quelque tems, à un de mes amis. Il donna le même conseil à un malade qui avoit été traité auparavant de la même manière pendant long-tems, & ce malade en éprouva le même avantage. Je dois rapporter une circonstance remarquable qu'on observa chez ce dernier malade. Pendant le traitement mercuriel, il suoit beaucoup toutes les nuits. Il prenoit chaque matin une chemise blanche faite de toile neuve: toutes ces chemises, environ au nombre de douze, après avoir été lavées avec d'autre linge, deux ou trois fois, se trouverent si fort affoiblies, qu'on eût dit qu'elles étoient entièrement pourries.

Si, après que la suppuration s'est établie, & que l'abcès a été ouvert, une partie de la glande demeure encore enflée & dure, les purgatifs réitérés & la continuation des remèdes indiqués ci-dessus acheveront la cure de ce reste de maladie.

Il est facile d'empêcher la formation des sinus & des fistules qui viennent quelque-

fois à la suite de pareils ulcères , tant par le moyen des injections appropriées , qu'en ayant soin de faire prendre une position convenable au malade dans son lit , & de faire sortir la matiere matin & soir , en faisant une pression douce , mais exacte tout autour de l'ulcere.

S'il s'est formé des sinus ou des fistules autour d'un bubon ulcéré , & qu'elles résistent aux injections dont j'ai parlé ci-dessus , il faut employer le bistouri. Cependant elles n'arrivent que rarement ou jamais , si le Chirurgien est attentif à la position du malade , s'il dilate l'ouverture dans le tems , lorsque cela est nécessaire , & si le malade se conforme exactement à ses avis.

On a beaucoup recommandé la ciguë , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur , pour le traitement des bubons cancéreux , aussi bien que de ceux qui ne sont que squirreux. Je n'ai cependant jamais vu que ce remede ait opéré une guérison radicale lorsqu'il y avoit un vrai cancer , quoique rien n'empêche de l'essayer. Mais en pareil cas , la seule méthode que je connoisse pour éviter la mort , ou du moins une vie très - misérable , c'est

l'extirpation de la glande cancéreuse , si elle est praticable , & il ne faut pas la différer trop long-tems.

Après avoir ainsi terminé le traitement des maladies vénériennes locales , je vais passer à celle qui procède d'une infection universelle , & qu'on appelle communément *vérole confirmée*.



CHAPITRE XI.

Du SYPHILIS , ou de la MALADIE VÉNÉRIENNE , ou VÉROLE proprement dite.

J'AI cru devoir commencer par donner quelques observations qui m'ont paru nécessaires , concernant la contagion vénérienne , la nature du virus , & les différentes apparences des maladies syphilitiques en général. Je vais maintenant considérer en particulier la nature , les symptômes & le traitement de la maladie syphilitique , ou vénérienne proprement dite , qu'on appelle communément *vérole confirmée*.

Voici , en peu de mots , les effets ou symptômes que peut produire le virus vénérien lorsqu'il est absorbé dans la masse générale.

1. *Aux yeux*. La plus violente de toutes les ophthalmies , accompagnée d'un écoulement de matiere puriforme (par l'effet de la répercussion d'une gonorrhée) , & terminée communément par une cécité complète ; ou bien une inflammation d'une espece plus chronique , à l'œil même ou
aux

aux paupieres ; & quelquefois aussi la fistule lacrymale.

2. *Aux oreilles.* La surdité , avec ou sans écoulement puriforme , provenant d'une gonorrhée répercutée , ou produite par le virus vénérien qui affecte ou les oreilles ou l'orifice des trompes d'Eustache dans l'arrière-bouche.

3. *Au nez.* Des ulcères aux narines ; l'exulcération de la membrane muqueuse du nez , avec carie des os & un écoulement ichoreux & fétide , connu sous le nom d'*ozæna*.

4. *À la bouche & à la gorge.* Des ulcères ; la carie des os palatins ou *antrum maxillare* ; l'érosion du voile du palais , &c. ; des maux de gorge , le *coryza* , la paraphonie.

5. *Aux parties génitales ou aux environs.* Il y produit , ou , comme cela arrive plus fréquemment , il y entretient perpétuellement des excoriations , des ulcères , des fistules , des gonorrhées invétérées , des poireaux , des condylomes , des polypes. Quant aux gonorrhées , aux tumeurs des testicules & aux bubons , le manque de faits authentiques me laisse encore douter , comme je l'ai dit ci-devant , si ces affections

proviennent jamais du virus déposé de la masse générale déjà infectée.

6. *A la peau.* Des taches cuivreuses , des dartres , des galles , sur-tout au bord du cuir chevelu , ou dans la barbe ; la teigne ; & lorsque la maladie est très-invétérée , elle produit quelquefois , quoique rarement , une espee de lepre sur toute la surface du corps , une corruption des ongles , & des ulceres de l'espee la plus maligne en différentes parties.

7. *Aux os.* Ou les tumeurs les plus douloureuses & les plus inquiétantes , qu'on appelle communément *tophus* , *exostoses* , &c. , qui sont sur-tout incommodes la nuit lorsque le malade se réchauffe dans son lit ; ou une exulcération de leur substance extérieure , ou une corruption de leur substance intérieure : maladies connues sous le nom de *carie* & de *spina ventosa*. Les os les plus sujets à être affectés de cette maladie sont ceux qui ne sont pas couverts de muscles , comme le tibia , le radius , le cubitus , le processus coracoïde , le sternum , le coronal & les autres os de la tête , &c.

8. Quelquefois le virus vénérien produit des effets dont la nature est si cachée , qu'ils

paroîtroient plutôt provenir de quelque autre cause. Telles sont des douleurs semblables à celles du rhumatisme , en différentes parties du corps ; des douleurs dans les articulations , qu'on prendroit pour goutteuses ; des tumeurs blaffardes ; des fièvres nerveuses ou hectiques ; des phthysies pulmonaires , ou une simple émaciation , sans vice apparent dans aucun viscere du corps. Les Médecins ont nommé ces symptomes *morbi venerei larvati*.

9. Quelquefois la vérole est réellement combinée avec d'autres maladies, telles que le scorbut de mer , les fièvres intermittentes , les consomptions , &c. : c'est ce qu'on appelle *morbi venerei complicati* ; & elles méritent la plus grande attention de la part du Praticien , parce que le succès du traitement dépend souvent en grande partie de la connoissance & de la distinction exacte de ces maladies.

Le remede spécifique qu'on applique maintenant à toutes les especes de maladies vénériennes en général, c'est le mercure sous ses différentes préparations. Quoiqu'il y ait peut-être dans le regne végétal des remedes aussi puissans que le mercure pour guérir la

maladie vénérienne dans tous ses périodes , comme ces remèdes ou sont inconnus ou difficiles à rencontrer , on leur préfère le mercure , non - seulement à cause de son pouvoir spécifique contre cette maladie , mais encore parce que c'est un remède peu cher , facile à trouver , prompt & certain dans ses effets. De même , quoique l'on puisse guérir les fièvres intermittentes par d'autres remèdes, il est rare qu'on y emploie maintenant autre chose que le quinquina.

On a imaginé plusieurs hypothèses pour expliquer de quelle manière le mercure produit ces merveilleux effets. Aucune n'est fondée sur des faits réels : toutes sont par conséquent peu satisfaisantes. Les uns disent que le mercure agit par sa pesanteur métallique ; d'autres , par sa qualité astringente ; d'autres , par le pouvoir qu'il a d'augmenter toutes les sécrétions ; & ainsi du reste. Si ces Auteurs avoient seulement fait attention que quelquefois deux ou trois grains de mercure portés dans la masse font disparaître les plus violens symptômes vénériens, je pense qu'ils n'auroient jamais eu recours à de pareilles explications. Peut-être , s'il est permis d'avancer une opinion sur cette

matiere , la chymie nousourniroit-elle une théorie plus raisonnable & plus satisfaisante que les autres. Nous supposerions que le mercure a un pouvoir attractif particulier , ou ce qu'on appelle communément une *affinité chymique* avec le virus vénérien , en vertu de laquelle toutes les fois qu'il rencontre ce virus , il s'y unit promptement , le neutralise , & forme avec lui un composé qui n'a plus aucune des qualités que chacune des deux substances avoit avant leur union ; & conséquemment l'effet du virus ne doit pas manquer de cesser , & le malade doit se trouver soulagé au moment où se fait cette union ; ou si le virus a été saturé avec une quantité suffisante de mercure , il doit être radicalement guéri. Cette théorie nous mettroit peut-être en état d'expliquer non-seulement de quelle maniere quelques grains de mercure soulagent quelquefois les plus affreuses douleurs osteosopes , mais encore pourquoi le mercure pris à l'intérieur guérit les ulceres vénériens sans qu'il soit besoin d'application extérieure , &c. Ces effets sembleroient prouver , de plus , que le mercure a une plus grande affinité chymique avec le virus vénérien qu'avec

aucun des acides , & que lorsqu'il est administré sous quelqu'une de ses préparations salines , il quitte immédiatement l'acide avec lequel il étoit combiné, pour s'unir avec le virus par - tout où il le rencontre.

Je fortifierois peut-être encore cette opinion si j'ajoutois que le mercure guérit d'autant plus facilement & plutôt la maladie vénérienne , qu'il est divisé en plus petites molécules ; que pour produire l'effet désiré , il doit toujours nécessairement être absorbé dans la masse générale des humeurs ; mais qu'il ne guérit jamais les accidens vénériens ; quoiqu'il soit absorbé dans la masse , s'il n'est pas transporté à l'endroit ou à la partie où le virus est niché. De cette manière , l'on expliqueroit peut - être plus facilement pourquoi il guérit souvent le mal vénérien sans augmentation sensible d'aucune des différentes sécrétions ou excrétions du corps , & pourquoi lorsqu'il procure le dévoiement , les sueurs immodérées ou la salivation , il laisse très-souvent le mal vénérien après lui dans toute sa force. Mais quoique nous puissions résoudre ainsi tous ces différens problèmes d'une manière

plus satisfaisante , je dois avouer que cette théorie n'est fondée, ainsi que les premières, sur aucun fait réel ; qu'elle ne porte que sur de simples conjectures , & que tant qu'elle n'aura pas des fondemens plus solides , elle sera aussi inutile que toutes les autres hypothèses dans la pratique de la médecine ; car on peut se contenter de connoître le spécifique pour guérir la maladie , sans être obligé de savoir comment il produit ses effets , quoiqu'il soit hors de doute que cette connoissance , si on pouvoit y parvenir , contribueroit à perfectionner le traitement de ces maladies (1).

Méthode curative.

Si le malade est assez fort pour supporter l'usage immédiat du mercure , je commence ordinairement par lui donner un purgatif , & le lendemain je le fais mettre dans un bain d'eau chaude , soit pure , soit avec du son en décoction. Je le fais rester une demi-heure ou une heure dans ce bain , dont le

(1) Je renvoie ceux de mes Lecteurs qui desireroient d'être instruits plus à fond concernant la manière d'opérer & les usages du mercure , aux observations que le Docteur Duncan a publiées sur ce sujet à Edimbourg.

216 OBSERVATIONS PRATIQUES

degré de chaleur est déterminé par la sensation agréable que le malade doit y éprouver. Vers la fin de ce tems , on le frotte par tout le corps avec une brosse ou avec un morceau de flanelle. Au sortir du bain , il peut prendre un doigt de bon vin , & ensuite se mettre au lit. Par ce moyen , la peau se trouve bien nétoyée , & en état de transmettre la transpiration. Si le malade est pléthorique , ou accoutumé à la saignée , il peut être utile & nécessaire de le saigner avant de le mettre à l'usage du mercure.

Je parlerai ci-dessous des différentes préparations mercurielles. On doit d'abord observer avec attention si le traitement mercuriel qu'on a commencé convient à l'état du malade ; & s'il n'y convient pas , il faut le changer sans balancer. Les malades qui ne supportent pas les frictions, soutiennent quelquefois très - facilement l'usage intérieur du mercure crud ou de ses préparations salines , & *vice versâ*. D'autres qui ne peuvent supporter le mercure à l'intérieur , s'accommoderont très - bien des frictions , ou quelquefois ils seront incommodés par une préparation mercurielle , au lieu qu'ils se trouveront bien d'une autre.

Quelques - uns supportent mieux ces préparations en pilules ; d'autres , en poudre ou dissoutes dans quelque liquide. On peut donner à ceux dont la constitution , les circonstances ou la volonté répugnent aux frictions mercurielles , la dissolution de mercure dans la gomme arabique , de Plenck , réduite en pillules. Elle convient à beaucoup d'estomacs , même à ceux qui ne peuvent quelquefois supporter aucune autre préparation mercurielle ; ou , suivant les circonstances , on peut leur administrer le mercure crud éteint dans de la conserve de roses ou de la confection cordiale. L'*hydrargirum nitratum cinereum* , ou *pulvis mercurii cinereus* de la nouvelle pharmacopée d'Edimbourg est une des préparations qui convient le mieux pour les estomacs qui ne peuvent supporter aucune autre préparation mercurielle saline. Le mercure trituré avec du sucre candi , ou le précipité *per se* mêlé avec l'opium , peuvent aussi , suivant les circonstances , être très - avantageux ; mais il faut , ainsi que je l'ai dit plus haut , beaucoup de jugement & d'attention pour administrer ces remèdes , aussi bien que pour régler la diète , les bains , &c. Il est

218 OBSERVATIONS PRATIQUES

impossible d'entrer dans le détail de chaque circonstance du traitement ; mais voici quelques règles qu'on peut suivre , indépendamment de celles dont nous ferons mention plus bas , à l'article des *préparations mercurielles*.

Le malade qu'on entreprend de guérir de la vérole doit avoir assez de force pour supporter l'usage du mercure , & n'être attaqué d'aucune fièvre nerveuse , putride , hectique ou inflammatoire , ni du scorbut de mer , ni de maladies cancéreuses , ni d'ulcères gangréneux. J'ai constamment observé que dans tous ces cas non-seulement le mercure étoit nuisible aux malades , mais que si l'on insistoit sur son usage , il pouvoit encore leur devenir funeste. Il faut donc commencer par guérir , s'il est possible , ces différentes maladies , ou si les symptômes vénériens prévalent si fort qu'ils rendent indispensable l'usage immédiat du mercure , il faut y joindre les remèdes qui peuvent convenir à ces mêmes maladies.

Lorsqu'il s'agit de rendre au malade un degré suffisant de force & de vigueur , l'air salubre d'une campagne bien située est une des premières choses qu'il faut prescrire ,

ensuite le lait d'ânesse ou de vache, tel qu'il sort de l'animal ; ou , ce que j'ai trouvé incomparablement meilleur dans certains cas , pour les malades qui sont dans l'aisance , une nourrice de campagne , forte & saine , que le malade tette lui-même ; ou , s'il trouve cela trop désagréable ou dangereux , on peut traire la femme avec un instrument approprié à cet effet , & faire avaler tout de suite le lait au malade. Ce lait est pour les personnes affoiblies le meilleur fortifiant que je connoisse. On peut autrement nourrir le malade de poudings légers , de viande tendre d'animaux de moyen âge de toute espece , qui ne soit pas trop grasse , sur-tout rôtie ; & s'il aime la biere forte , il peut en boire à son diner. A défaut de biere , quelques petits verres de vin d'Espagne ou de Hongrie lui seront salutaires. L'exercice modéré en tout genre , & de tems en tems les frictions sur tout le corps contribueront beaucoup aux bons effets de ce régime. Quant aux remedes , il n'en faut communément aucun ; ou si leur usage est absolument nécessaire , ou si le malade en desire , il n'y a rien de mieux que de lui faire prendre de petites doses d'excellent quinquina en

poudre subtile , soit seul , soit mêlé avec de bon vin vieux d'Allemagne. Lorsque le malade est très - abattu , la teinture de fer dissous dans l'éther vitriolique , est le remède que j'ai trouvé le plus efficace. Le bain froid est quelquefois très-utile ; mais dans certains cas, il ne convient nullement. Tous ces moyens joints à une compagnie agréable , moyennant qu'on évite les pollutions vénériennes & nocturnes , contribueront beaucoup à rendre au malade les forces qui lui sont nécessaires pour qu'il puisse supporter l'usage du mercure. Je dois cependant faire ici une remarque qui , autant que je puis le savoir , a échappé à tous les Auteurs qui ont écrit avant moi sur ce sujet. C'est que la foiblesse , l'abattement des esprits & l'anaphrodisie sont quelquefois les effets immédiats du virus vénérien caché dans le corps ; & j'ai trouvé que dans ce cas le meilleur de tous les fortifiants est le mercure. J'ai vu des personnes dans cet état acquérir tant de force en huit ou dix jours , par l'usage intérieur de ce minéral , qu'elles en étoient dans l'enchantement.

Pendant l'usage du mercure , une diète mêlée de végétaux & d'animaux , comme

la plus naturelle à l'espèce humaine , est celle qui convient le mieux , pourvu toutefois qu'on évite les alimens gras , durs , & difficiles à digérer. Les acides causent quelquefois des tranchées ou le dévoiement pendant l'usage du mercure. Lorsque cela arrive , on doit les éviter. A table , l'usage modéré du vin ne sauroit être nuisible. Quant à la biere forte , ou de toute autre espèce , tous les estomacs ne s'en accommodent pas pendant le traitement mercuriel. Lorsque l'estomac la supporte , je ne vois pas de raison pour ne pas en permettre l'usage modéré , & je n'ai jamais vu qu'il en soit résulté aucun mal dans ces circonstances. Mais une chose sur laquelle j'insiste principalement , c'est de faire coucher les malades de bonne heure. Il est plus avantageux que nuisible de bien dormir pendant qu'on passe par les remèdes. J'ai toujours trouvé plus utile de permettre au malade un exercice modéré à pied , à cheval ou en voiture , si l'air est chaud & sec , que de le confiner dans sa chambre. Mais si la saison est froide & humide , il est plus sûr de le faire rester chez lui. L'air de la nuit est particulièrement dangereux ; car il est com-

munément froid & méphitique. Ainsi, tout malade qui passe par le mercure doit s'en garantir avec le plus grand soin. J'ai eu plusieurs exemples de malades vénériens qui pour n'avoir pas fait attention à cette circonstance pendant l'usage du mercure, ont ruiné leur santé & leur constitution pour plusieurs années, & même pour toute leur vie. Lorsque les affaires ou des circonstances indispensables obligent le malade à sortir par un tems très-froid ou humide & mal-sain, il ne doit jamais s'y exposer sans être vêtu chaudement, sans avoir une camifolle de flanelle ou de toile de coton sur sa chair, & de bons bas de laine bien chauds.

L'on continue ainsi l'usage du mercure, si aucun symptôme particulier ne s'y oppose. Il faut que le malade prenne le bain chaud une ou deux fois par semaine, si sa constitution est assez forte. Les tempéramens foibles & relâchés ne s'en accommodent point. Mais toutes les fois que le malade sent dans sa bouche un goût nauséeux comme celui du cuivre, que son haleine est puante, qu'il y a tuméfaction aux gencives, que les dents sont comme agacées, & qu'il se fait une sécrétion de

salive ou de crachats plus abondante qu'à l'ordinaire ; il faut suspendre aussi-tôt l'usage du mercure pendant quelques jours , mettre le malade dans un bain chaud , le frotter avec la brosse , lui donner un léger purgatif , qu'on réitérera selon l'exigence du cas , & on lui fera éviter avec soin de s'exposer au froid dans ces circonstances. Si pendant l'usage du mercure il paroît des symptômes d'une irritation générale , on le suspendra pendant quelques jours , & l'on donnera à sa place une dose d'opium ; mais si les symptômes d'une diathèse inflammatoire prévalent , on fera précéder la saignée.

Il faut continuer ainsi l'usage du mercure comme je l'ai dit plus haut , jusqu'à ce que le virus soit totalement déraciné : ce qui doit être fait en vingt-cinq ou trente jours , si la maladie n'est pas d'ancienne date , & si les symptômes n'ont pas été très-violens. Mais si la maladie est invétérée , & si la peau & les os sont grièvement affectés , il ne faudra quelquefois pas moins de trois mois pour opérer une guérison complète & radicale.

C'est un point de jugement pratique des plus délicats de connoître si la vérole est

radicalement guérie ; & quand je dirai que l'insouciance des malades & le défaut de connoissances de la part du Praticien relativement à cet article essentiel , sont deux sources fécondes d'inquiétudes & de douleurs , je n'avancerai rien que l'on ne voie journellement confirmé dans la pratique. Si nous étions en possession d'un remede qui eût le pouvoir de rendre active la moindre particule de virus cachée dans le corps , & de nous mettre ainsi en état de découvrir sa présence , comme l'aimant décele la présence du fer , il n'y auroit qu'à donner ce remede au moment où l'on pense que le malade a pris assez de mercure. J'ai fait quelques expériences sur ce sujet , & j'ai tout lieu d'espérer que les résultats seront satisfaisans ; mais comme je n'ai pas encore un assez grand nombre de faits authentiques pour les rendre certains , je n'en dois pas dire davantage sur ce sujet.

Aussi-tôt que le mercure affecte la bouche du malade , l'on est assuré du point le plus essentiel : savoir, qu'il est entré dans la masse générale ; & cela est absolument nécessaire pour déraciner le virus qu'elle contient. La disparition des symptômes vénériens
internes,

internes, & encore plus celle des symptomes extérieurs , est un autre signe non équivoque de l'action que le mercure a exercée sur le virus syphilitique. Si les ulcères vénériens qui étoient provenus de l'infection de la masse générale commencent à s'amender ou à se guérir , si les douleurs & les *tophus* des os commencent à disparoître , &c. pendant l'usage du mercure , on est sûr qu'il a corrigé les effets du virus vénérien ; mais l'on n'est pas encore assuré qu'il ait déraciné entièrement toutes les particules de ce virus qui étoient répandues dans le corps. Pour y parvenir , il faut continuer le même usage du mercure pendant quinze jours ou trois semaines après que tous les symptomes vénériens ont disparu , & alors on peut en général être assez certain que le malade est radicalement guéri. J'ai observé plusieurs sujets qui supportoient à merveille l'usage du mercure tant que la maladie subsistoit , tandis qu'au moment où le virus étoit déraciné , ils commençoient à le rebuter ; & cet effet se trouvoit être l'indice qu'ils étoient radicalement guéris.

Mais il est à remarquer que quoique le virus vénérien ait été parfaitement déraciné

de la masse générale , & que par conséquent la maladie vénérienne ait été radicalement guérie , il se présente dans la pratique beaucoup d'exemples d'exostoses , de nodus ou tumeurs des os , procédant du virus vénérien , qui subsistent néanmoins tout le reste de la vie, sans aucun inconvénient ultérieur. Il est telle carie qui reste souvent jusqu'à ce que la nature seule , ou aidée des secours de l'art , ait opéré l'exfoliation de l'os. On doit regarder les excroissances vénériennes qui restent après un traitement mercuriel , comme des maladies locales , & les détruire par des remèdes locaux.

On a généralement observé , & je l'ai vu dans plusieurs occasions , que la maladie vénérienne cede plus aisément à un bon traitement dans les régions & dans les saisons chaudes & seches , que dans des circonstances opposées ; & c'est - là vraiment ce qui a rendu Montpellier si fameux pour la guérison des véroles les plus opiniâtres & les plus invétérées. C'est aussi par cette raison que des personnes qui n'ont pas été guéries des maladies vénériennes à Pétersbourg ou à Stockholm, &c. trouvent quelquefois leur guérison en Italie ou en Portugal ; & par la

même raison, elles y peuvent quelquefois supporter le mercure sans le moindre inconvénient, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement guéries, tandis qu'elles pouvoient à peine en recevoir quelques grains dans les régions froides & humides, sans tomber aussi-tôt dans la salivation. J'ai vu plusieurs exemples frappans en ce genre. Ce n'est pas qu'il y ait dans l'air du midi de la France, de l'Italie ou du Portugal, des particules balsamiques particulieres, ou que les Médecins de Montpellier soient plus habiles que ceux de Londres, de Stockholm, &c., comme souvent les malades le supposent; mais c'est tout simplement parce que l'athmosphère y est chaude & sèche, & quelquefois parce que le malade, qui auparavant étoit négligent, devient alors plus soigneux, & apporte une attention plus exacte à suivre les avis de son Médecin & de son Chirurgien. Cependant un Médecin habile est en état, dans quelque pays que ce soit, de mettre son malade dans la situation qu'il peut trouver nécessaire pour guérir cette maladie, en le tenant, pendant quelques semaines ou quelques mois, dans un climat artificiel aussi convenable pour lui que le climat naturel.

lement chaud de Montpellier , de Naples ou de Lisbonne.

Une autre circonstance qu'il ne faut pas oublier , c'est de prévenir les malades qui passent par le mercure , des effets qu'il produit sur l'or , comme anneaux , gallons , montres , &c. La négligence à cet égard peut quelquefois donner lieu à des découvertes désagréables , que les personnes du sexe ont principalement intérêt d'éviter.



CHAPITRE XII.

Des PRÉPARATIONS MERCURIELLES en général.

AVANT de m'occuper de l'examen des différentes préparations mercurielles , je crois faire plaisir à mes Lecteurs en leur présentant un tableau synoptique de toutes les préparations & compositions de mercure qu'on a inventées jusqu'à ce jour. J'ai arrangé les acides qui entrent dans les préparations salines du mercure , suivant la table des attractions électives que vient de publier M. Bergman , Professeur de Chymie à Upsal.

TABLEAU de toutes les différentes
PRÉPARATIONS & COMPOSITIONS
MERCURIELLES connues jusqu'à ce
jour.

I. PRÉPARATION par laquelle le mercure
est simplement purifié.

* *Hydrargyrum purificatum.*

Mercurius crudus purificatus officinarum.

230 OBSERVATIONS PRATIQUES

Argentum vivum purificatum. *Pharm. Lond.*

Anglis, Quicksilver, crude purified mercury; *Germanis*, Reines queckfilber; *Gallis*, Mercure pur.

II. PRÉPARATIONS dans lesquelles le mercure est simplement divisé.

1. Par les gommess ou mucilages; tels que la gomme arabique, la gomme adragant, &c.

* *Hydrargyrum gummosum.*

Mercurius gummosus de *Plenck*, qui en est l'inventeur.

COMPOSITA.

* *Pilulæ ex hydrargyro gummofo.*

Pilulæ ex mercurio gummofo. Plenck. Pharm. Chir.

Solutio mercurialis gummofo. Ibid.

Mixtura mercurialis. Pharm. Nosocom. St. Georgii.

Potio mercurialis. Dispensatorii Novi Brunswicensis.

Lac mercuriale. Plenck.

Syrupus hydrargyri. Pharmac. Suec.

2. Par les résines & baumes; tels que la térébenthine, le baume de copahu, &c.

* *Hydrargyrum terebinthinatum, &c.*

COMPOSITA.

* *Pilulæ ex hydrargyro terebinthinato.*

Pilulæ mercuriales. L.

Pilulæ mercuriales laxantes. G.

Pilulæ mercuriales sialagogæ. Pharm. Danic.

Injectio mercurialis. Pharm. Edimb. pauperum.

3. Par les huiles grasses, animales ou végétales; telles que la graisse de

porc, la graisse d'oie, ou le beurre de cacao.

* *Hydrargyrum unguinosum.*

* *Unguentum hydrargyri.*

Unguentum ex hydrargyro cœruleum. *E.*

Unguentum mercuriale, seu unguentum Neapolitanum. *Pharmac. Austriaco-Provincialis.*

COMPOSITA.

α. Unguentum cœruleum fortius. *L.*

Unguentum cœruleum mitius. *L.*

Unguentum mercuriale. *D.*

β. Ceratum mercuriale. *L.*

γ. Emplastrum mercuriale. *O.*

Emplastrum ex hydrargyro. *E.*

Emplastrum ex gummi ammoniaco cum mercurio. *L.*

Emplastrum commune cum mercurio. *L.*

Emplastrum de ranis cum mercurio. *A.*

4. Par les terres calcaires; telles que la craie, les pattes d'écrevisses, &c.

Mercurius alkalifatus. *E.*

Pulvis mercurialis. *G.*

III. PRÉPARATIONS dans lesquelles le mercure est calciné par la chaleur & l'air.

* *Hydrargyrum calcinatum.*

Mercurius calcinatus. *L. S.*

Mercurius præcipitatus per se. *L.*

COMPOSITA.

* *Pilula ex hydrargyro calcinato.*

Pilulae syphiliticæ: *Pharm. Nosoc. Sti. Thomæ.*

Pilulae ex mercurio calcinato. *G.*

Pilulae ex mercurio calcinato anodynæ. *G.*

232 OBSERVATIONS PRATIQUES

IV. PRÉPARATIONS dans lesquelles le mercure est en partie divisé & en partie dissous.

1. Par le sucre candi, ou par les compositions saccharines, telles que la conserve de roses, de kinorrhodon, &c.

* *Saccharum hydrargyratum.*

COMPOSITA.

* *Bolus ex hydrargyro saccharato.*

Bolus coeruleus. Th.

Bolus mercurialis. G.

2. Par le miel.

* *Mel hydrargyratum.*

COMPOSITA.

Pilulæ Æthiopicæ. E.

Pilulæ mercuriales purgantes. E. Paup.

Pilulæ Bellosti.

3. Mercure combiné avec le soufre (les fleurs de soufre).

* *Hydrargyrum sulphuratum.*

a. Par simple trituration, ou par fusion.

* *Hydrargyrum sulphuratum nigrum.*

Æthiops mineralis. O.

COMPOSITA.

Pulvis Æthiopicus. G.

b. Par sublimation.

* *Hydrargyrum sulphuratum rubrum.*

Cinnabaris factitia, seu artificialis. O.

COMPOSITA.

Pulvis antilyssus Sinensis. O.

4. Mercure combiné avec le soufre d'antimoine.

a. Par simple trituration.

* *Sulphur antimonii hydrargyratum nigrum.*

Æthiops antimonialis. O.

COMPOSITA.

Pilulæ Æthiopicæ. E. D..

b. Par sublimation.

Sulphur antimonii hydrargyratum rubrum.

Cinnabaris antimonii. O.

COMPOSITA.

Bolus Cinnabarinus. G.

5. Mercure combiné avec le soufre par précipitation.

[Voyez ci-dessous les Préparations avec l'acide vitriolique.]

V. PRÉPARATIONS dans lesquelles le mercure est réduit sous la forme d'un sel ou d'une chaux métallique par les acides.

1. L'acide de la graisse. 2. L'acide du sel marin. 3. L'acide du sucre. 4. L'acide du succin. 5. L'acide de l'arsénic.
6. L'acide de surelle. 7. L'acide phosphorique. 8. L'acide vitriolique. 9. L'acide du sucre de lait. 10. L'acide tartareux. 11. L'acide du citron ou limon. 12. L'acide nitreux. 13. L'acide spathique. 14. L'acide acéteux.
15. L'acide du borax. 16. L'acide du bleu de Prusse. 17. L'acide aérien.

234 OBSERVATIONS PRATIQUES

1. Mercure combiné avec l'acide de la graisse ou du suif (acidum sebi).

Hydrargyrum sebinum.

2. Mercure combiné avec l'acide muriatique, ou l'acide du sel commun ou marin.

* a. *Hydrargyrum muriatum*:

* *Hydrargyrum muriatum fortius* { Par sublimation,
ou
par précipitation.

Mercurius sublimatus corrosivus. O.

Mercurius sublimatus albus. O.

Mercurius corrosivus albus. S. L.

Mercurius corrosivus viâ humidâ paratus. Monnet.

COMPOSITA.

Solutio sublimati spirituosâ, de Van-Swieten.

Solutio mercurii sublimati corrosivi. E.

Mixtura mercurialis. S.

Mercurius sublimatus solutus. G.

* *Solutio hydrargyri saliti fortioris aquosa.*

Pilulæ e mercurio corrosivo albo. S.

* *Lotio syphilitica flava, (lotio ex hydrargyro muriato fortiori.)*

Aqua phagedænica. O.

Liquor mercurialis. A.

Lotio mercurialis. Th.

Solutio sublimati balsamica. Plenck.

* *Liquor ad condylomata.*

Aquâ caustica pro condylomatibus. Plenck.

b. *Calx hydrargyri muriata.* C'est-à-dire, la chaux de mercure unie avec l'acide marin.

Par la sublimation.

SUR LES MALADIES VÉNÉRIENNES. 235

* *Hydrargyrum muriatum mitius.*

Mercurius dulcis (sublimatione paratus). *O.*

Mercurius dulcis sublimatus. *L.*

Calomel seu calomelas. *L.*

Aquila alba.

Panacea mercurialis.

Mercurius dulcis lunaris. *Schroeder.*

COMPOSITA.

Bolus mercurialis. *E.*

Bolus jalappæ cum mercurio. *Ibid.*

Bolus rhei cum mercurio. *Ibid.*

Pilulæ calomelanos. *G.*

Pilulæ Plummeri. *E.*

Pilulæ alterantes Plummeri. *O.*

Pilula depurans. *Th.*

Pulvis Plummeri. *O.*

Pilulæ mercuriales purgantes. *A.*

Pilulæ catarrhales purgantes. *D.*

Pilulæ laxantes cum mercurio. *Ibid.*

Pulvis e scammonio cum mercurio. *Th.*

* *Lotio syphilitica nigra, (lotio ex hydrargyro muriato mitiori).*

Lotio mercurialis. *G.*

Par précipitation.

a. De sa dissolution dans l'acide nitreux par le sel commun.

* *Calx hydrargyri muriata Scheelii.*

Mercurius præcipitatus dulcis, de Scheele (son inventeur).

b. De sa dissolution dans l'acide muriatique par l'alkali végétal.

Mercurius præcipitatus albus. *L.*

c. De sa dissolution dans l'acide muriatique par l'alkali minéral.

Mercurius præcipitatus albus. *A.*

d. De sa dissolution dans l'acide muriatique par l'alkali volatil.

236 OBSERVATIONS PRATIQUES

Mercurius præcipitatus albus. *E.*

c. De sa dissolution dans l'acide muriatique par le cuivre.

Mercurius præcipitatus viridis. *E.*

COMPOSITA.

Unguentum e mercurio præcipitato. *L.*

Linimentum mercuriale. *E. Paup.*

3. Avec l'acide saccharin.

Hydrargyrum saccharatum. *Bergman.*

4. Avec l'acide du succin.

Hydrargyrum succinatum. *Bergman.*

5. Avec l'acide arsénical.

Hydrargyrum arsenicatum. *Bergman.*

6. Avec l'acide de surelle blanche ou alleluia (oxalis acetosella Linnæi).

Hydrargyrum oxalinum. *Bergman.*

7. Avec l'acide phosphorique.

Hydrargyrum phosphoratum. *Bergman.*

Par précipitation de sa dissolution dans l'acide nitreux
par l'urine récente.

Rosa mineralis. *O.*

8. Avec l'acide vitriolique.

* a. *Hydrargyrum vitriolatum.*

Vitriolum mercurii. *O.*

Oleum mercurii. *O.*

b. *Calx hydrargyri vitriolata (flava).*

Turpethum minerale. *O.*

Mercurius emeticus flavus. *L.*

Mercurius flavus. *E.*

Mercurius præcipitatus luteus. *D.*

Turpethum nigrum. *O.*

- c. Mercure précipité de sa dissolution dans l'acide nitreux
par le foie de soufre ou par l'*hepar calcaire*,
Mercurius præcipitatus niger. O.

9. Avec l'acide du sucre de lait.

10. Avec l'acide tartareux.

- a. *Hydrargyrum tartarifatum. Bergman.*
b. Avec le tartre purifié, vulgairement appelé *crème de tartre* (*alkali végétal sur saturé d'acide tartareux.*)
* *Tartarus hydrargyratus.*
Terre feuilletée mercurielle du Docteur *Pressavin*
(son inventeur).
c. Mercure précipité de sa dissolution dans l'acide nitreux
par l'acide tartareux.
* *Calx hydrargyri tartarifata flava; vulgo, Pulvis Constantinus.*
d. Mercure précipité de sa dissolution dans l'acide muriatique & dans l'acide tartareux par l'alkali fixe végétal.
* *Calx hydrargyri tartarifata alba; vulgo, Pulvis argenteus.*

11. Avec l'acide du citron.

Hydrargyrum citratum. Bergman.

12. Avec l'acide nitreux.

- * *Hydrargyrum nitratum.*
A. Simplement dissous.
* *Acidum nitri hydrargyratum.*
Solutio mercurii. E.

COMPOSITA.

- Unguentum citrinum. E. A. S.
B. Evaporé & calciné par le feu.
* *Hydrargyrum nitratum rubrum.*
Mercurius corrosivus ruber. L. E.

258 OBSERVATIONS PRATIQUES

Mercurius præcipitatus ruber. *O.*
Pulvis principis. *O.*
Mercurius corallinus. *L.*
Mercurius tricolor. *O.*
Panacea mercurii. *O.*
Arcanum corallinum. *O.*
Panacea mercurii rubra. *O.*

COMPOSITA.

Balsamus mercurialis. *Plenck.*
Unguentum ophthalmicum. *St. Yves.*
Balsamum ophthalmicum rubrum. *D.*
Unguentum præcipitatum. *G.*
Unguentum ad lippitudinem. *Th.*
Unguentum mercuriale rubrum. *D.*
Unguentum pomatum rubrum. *D.*

C. Précipité de sa dissolution dans l'acide nitreux.

a. Par l'alkali volatil.

* *Hydrargyrum nitratum cinereum.*

Pulvis mercurii cinereus. *E.*

Turpethum album. *O.*

Mercurius præcipitatus dulcis. *O.*

COMPOSITA.

Gouttes blanches du Docteur Ward (mercure précipité de l'acide nitreux & redissous par le sel ammoniac).

Syrop végétal.

Syrop de *Bellet.*

b. Par l'alkali volatil vineux, (spiritus salis ammoniaci vinosus).

Turpethum nigrum.

Mercurius præcipitatus niger.

c. Par l'alkali fixe végétal.

Mercurius præcipitatus fuscus. *Wurtz.*

d. Par le cuivre.

Mercurius præcipitatus viridis. *B.*

13. Avec l'acide du spath, (fluor mineralis).

Hydrargyrum fluoratum. Bergman.

14. Avec l'acide acéteux.

* *Hydrargyrum acetatum. Bergman.*

COMPOSITA.

Trochisques ou pilules de *Keyser.*

15. Avec l'acide du borax.

Hydrargyrum boraxatum. Bergman.

16. Avec l'acide du bleu de Prusse.

17. Avec l'acide aérien (air fixe).

Hydrargyrum aëratum. Bergman.

La plupart des préparations mercurielles que j'ai rassemblées dans ce tableau ont été recommandées en différens tems par différens Chymistes & Praticiens , pour le traitement de la maladie vénérienne. Nous nous bornerons à examiner celles (marquées d'un astérique *) qu'on emploie principalement de nos jours , & qui ont soutenu leur réputation depuis qu'on a commencé à les introduire dans la pratique , ou qui ayant été découvertes de notre tems , semblent posséder des qualités propres à leur concilier la même confiance.

Les voici en peu de mots.

Le mercure, dans son état de crudité, trituré, ou comme on dit communément, *éteint* avec de la graisse ou des huiles, avec la gomme arabique, la térébenthine, la conserve de roses, &c.

Dans un état de dissolution plus complète, trituré avec le sucre candi, que j'ai cru devoir appeller alors *saccharum hydrargyrum*.

Uni avec le soufre, sous le nom de *cinnabre* pour les fumigations.

Le mercure calciné seul (précipité *per se*) mieux appelé *hydrargyrum calcinatum*.

Le mercure dissous par les différens acides, & formant avec eux des sels métalliques; ou précipité de ces combinaisons sous la forme d'une chaux plus ou moins âcre. Savoir,

Avec l'acide muriatique : le sublimé corrosif, auquel j'ai donné, dans le tableau, le nom plus convenable d'*hydrargyrum muriatum fortius*, afin de le distinguer, tant du calomel ou mercure doux, que j'ai appelé *hydrargyrum muriatum mitius*, que du mercure doux préparé par précipitation, suivant la découverte de M. Scheele, & que j'ai nommé *calx hydrargyri muriata Scheelii*.

Avec

Avec l'acide vitriolique : le turbith minéral, ou mercure émétique, ou précipité jaune (*calx hydrargyri vitriolata*).

Avec l'acide tartareux : le mercure tartarisé, *hydrargyrum tartarifatum*, qu'il faut distinguer de ce que j'appelle *tartarus hydrargyratus*, ou terre feuilletée mercurielle du Docteur Pressavin de Paris, laquelle est une combinaison du mercure avec le tartre purifié ou *crème de tartre*.

Avec l'acide nitreux : l'*hydrargyrum nitratum*, dans son état de dissolution étendue d'eau ; ou sous une forme plus solide, comme dans le *syrop de Bellet*, & dans l'*onguent citrin*. Le *pulvis mercurii cinereus* de la nouvelle pharmacopée d'Edimbourg, lequel est du mercure dissous dans l'acide nitreux & précipité par l'alkali volatil ; mais il n'est pas entièrement privé de son acide, d'où il prend le nom d'*hydrargyrum nitratum cinereum*. Les gouttes blanches du Docteur Ward, dans lesquelles le mercure dissous dans le même acide est précipité & redissous par le sel ammoniac. L'*hydrargyrum nitratum rubrum*, improprement appelé *précipité rouge*, dans lequel le métal, après avoir été dissous dans cet acide, a été

exposé à un certain degré de feu, au moyen duquel il a acquis cette couleur.

Et enfin avec l'acide acéteux : l'*hydragryum acetatum*, connu sous le nom de *pilules* ou *trochisques de Keyser*. Dans cette préparation, on met le mercure, au moyen d'une longue trituration, en état de s'unir avec cet acide.

On administre toutes ces différentes préparations sous diverses formes, comme de poudres, pilules, bols, dissolutions, lotions, injections, onguents, &c. quelques-unes pour l'usage extérieur, mais le plus grand nombre pour être prises intérieurement. Il est bon d'observer en général, que toutes les préparations mercurielles salines sont d'autant meilleures & plus sûres, qu'elles sont réduites en poudre plus subtile.



CHAPITRE XIII.

*Des PRÉPARATIONS MERCURIELLES en particulier.*I. *Des FRICTIONS MERCURIELLES.*

DE toutes les différentes méthodes qu'on a découvertes jusqu'ici , pour le traitement de la maladie vénérienne , celle des frictions mercurielles est peut-être la plus efficace , de même qu'elle est la plus sûre & la plus douce. Cependant , pour que cette maniere d'appliquer le mercure produise de la maniere la plus prompte l'effet qu'on desire , il faut , non-seulement beaucoup d'habileté & une grande attention de la part du Praticien ; mais encore une obéissance très-stricte , & l'observance exacte du régime de la part du malade. Et l'on peut , dans le fait , en dire autant de l'usage de toutes les préparations du mercure.

Telle est la différence des constitutions , que quelques personnes seront plus affectées par un petit nombre de frictions , que d'autres , qui paroissent dans des circons-

tances parfaitement semblables, ne le font par vingt ou trente. Et si l'on continue de donner des frictions aux premières, dans la vue d'en augmenter le bon effet, on court le risque de faire naître au contraire des symptômes très-fâcheux, tels que la salivation, les vertiges, la chaleur fébrile, les tremblemens des extrémités, & les douleurs violentes & chroniques dans les articulations.

Lorsque les frictions produisent l'effet qui leur est propre, ce traitement n'est accompagné d'aucun mauvais symptôme; le malade est aisément guéri sans souffrir beaucoup pendant le tems des frictions, & sans se trouver beaucoup affoibli dans la suite. Bien des personnes sont délivrées à un certain point des symptômes de la maladie par quatre ou six frictions, quoiqu'il en faille quelquefois quatorze ou quinze pour produire cet effet.

Le mercure qu'on destine à cet usage doit être très-pur. Et comme les Praticiens ne peuvent être certains de la pureté de celui qu'on vend dans les boutiques, ils doivent le purifier eux-mêmes. La plus grande partie du mercure dont nous nous servons vient

d'Idria, & passe par les mains des Hollandois qui savent le sophistiquer avec des substances hétérogenes, sans qu'il éprouve aucune altération sensible dans sa fluidité & dans son brillant métallique. Mais tout Médecin qui a la santé de son malade à cœur, n'emploiera jamais du mercure, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, sans s'être assuré qu'il est parfaitement pur. Car si l'on se sert de ce métal dans un état d'impureté, on peut, non-seulement être trompé dans les effets qu'on s'en promet, mais encore causer beaucoup de mal à son malade. J'espère que d'après ces considérations mes Lecteurs excuseront la digression suivante.

Remarques sur la sophistication & sur la purification du mercure.

On trouve dans les mines le mercure, ou natif : & dans cet état on l'appelle *mercure vierge* ; ou minéralisé : & on lui donne alors le nom de *mine de mercure*, de laquelle on le sépare ensuite par la distillation.

Ces mines de mercure sont de plusieurs espèces & sous différentes formes. Le cin-

246 OBSERVATIONS PRATIQUES

nabre natif est cependant celle qui contient la plus grande quantité de mercure. Quoique plusieurs Auteurs recommandent le cinnabre natif comme remède, c'est une vérité de fait qu'il est souvent souillé par un mélange de particules hétérogènes. C'est conséquemment courir des risques, que d'employer le cinnabre natif, sur-tout pour l'usage intérieur. Quoiqu'il soit quelquefois plus beau dans sa couleur que le cinnabre factice, on peut toujours compter plus sûrement sur ce dernier, pourvu toutefois qu'il soit bien préparé.

Le mercure, dans le cinnabre ou dans les autres mines de mercure, étant communément minéralisé par le soufre, ou du moins masqué par ce mixte, le procédé pour l'en séparer consiste à unir avec la mine de mercure, une substance qui ait une plus grande affinité avec le soufre qu'avec le mercure. Tels sont, par exemple, les sels alkalis, la terre calcaire, le fer, les scories de fer, &c. Si l'on mêle par conséquent avec la mine de mercure l'une ou l'autre des substances que je viens de nommer (dont cependant on choisit toujours la moins coûteuse), & qu'on expose ce

mélange à la distillation , cette substance s'unira avec le soufre , & le mercure se trouvant en liberté par ce moyen , s'élèvera sous forme de vapeurs , & passera dans le récipient.

L'intérêt a malheureusement enseigné aux commerçans l'art de sophistiquer le mercure , en y mêlant du plomb , avec lequel il s'unit avec facilité. On parvient à rendre cette fripponnerie plus difficile à reconnoître , en y ajoutant du bismuth ; car l'amalgame qu'on forme par cette addition est beaucoup plus fluide , & conserve beaucoup mieux le brillant métallique & argenté du mercure. Il est donc évident que la couleur & le brillant du mercure ne sont pas toujours des signes certains de sa pureté ; & il ne faut nullement compter sur la purification ordinaire du mercure , qui consiste à le faire passer par la pression à travers un sac de peau ; par la raison , que l'amalgame composé de mercure , de plomb & de bismuth , est souvent si parfait , que , quoique l'alliage fasse le quart de la masse entière , il ne reste cependant que très-peu de ces matieres hétérogenes dans le sac de peau qu'a traversé le mercure.

248 OBSERVATIONS PRATIQUES

Le seul moyen assuré de purifier le mercure est la distillation. On regarde les vaisseaux de fer comme les plus convenables, parce que le fer est le seul métal avec lequel le mercure refuse de s'unir ; & qu'il n'y a d'ailleurs aucun danger que les vaisseaux de fer soient brisés par le procédé , comme pourroient l'être ceux de verre , à raison sur-tout de la grande expansion que le mercure éprouve dans cette opération. Plus on fait monter haut le mercure avant qu'il se condense , plus on est sûr de le débarrasser des particules de plomb , qui ne peuvent par ce moyen le suivre dans le récipient. Le vaisseau destiné à cette opération doit donc être un pot de fer avec un long col du même métal , pareil à un canon de mousquet. Mais afin de condenser mieux & plus aisément le mercure qui s'élève sous forme de vapeurs , il faut que l'extrémité de ce tube , qui doit être recourbé , plonge de deux ou trois pouces dans du vinaigre. Par cette méthode , on obtient tout le mercure sans perte ; la personne qui opere n'est exposée à aucun danger ; & de plus , on dépouille parfaitement le mercure de toutes les particules de plomb

& de bismuth qui pourroient être montées avec lui , & qui sont solubles par le vinaigre , au lieu que le mercure ne l'est pas.

Voici les caracteres du mercure pur : 1°. il faut que lorsqu'on le verse sur une table de bois , il forme des globules qui conservent toujours leur figure sphérique , & ne s'étendent jamais en longueur comme un fil ou une ligne. 2°. Qu'il ne soit pas couvert d'une pellicule ; mais que sa surface soit brillante. 3°. Lorsqu'on l'agite avec de l'eau , il ne doit pas la rendre noirâtre & sale. 4°. Lorsqu'on l'agite , ou qu'on le met en digestion dans du vinaigre , il ne doit pas lui communiquer un goût douceâtre. 5°. Etant mis sur le feu dans une cuiller de fer , il doit s'évaporer en entier , sans laisser rien après lui.

On prépare communément l'onguent mercuriel , en éteignant le mercure avec de la graisse de porc & de la térébenthine. Cette maniere de le préparer est très-sujette à caution. Il produit bientôt , dans beaucoup de personnes dont la peau est tendre , des pustules d'une espece inflammatoire qui sont très-douloureuses , & qui empêchent qu'on ne continue les frictions. Il est

250 OBSERVATIONS PRATIQUES

donc plus avantageux de préparer l'onguent mercuriel pour cet objet, en triturant avec de la graisse de porc fraîche, lavée & nettoyée à plusieurs reprises & pendant plusieurs jours avec de l'eau pure, le mercure purifié, sans y ajouter de la térébenthine. Il faut continuer de triturer l'onguent pendant deux heures après que tous les globules de mercure ont disparu, afin d'être certain qu'il soit dans la plus parfaite division. On doit le tenir ensuite dans un lieu frais, non-seulement pour l'empêcher de devenir rance, mais aussi pour éviter qu'il ne se fonde : ce qui procureroit la séparation, & par conséquent la précipitation du mercure au fond du vaisseau.

Mais malgré cette précaution, on rencontre très-souvent des malades dont la peau paroît être d'une si grande irritabilité, qu'ils ne peuvent supporter l'application de l'onguent, lors même qu'il est préparé suivant la méthode que nous venons de décrire. La grande propensité qu'a la graisse de porc à devenir rance, sur-tout dans les saisons & dans les régions chaudes, contribue beaucoup à occasionner cette fâcheuse irritabilité. Dans ces circonstances, il est à pro-

pos de mêler avec l'onguent ci-dessus une petite quantité d'onguent de réglisse récemment fait, ou de préparer l'onguent mercuriel uniquement avec du mercure & du *beurre de cacao*, qui est l'huile butyreuse qu'on retire des noix de cacao, en les faisant bouillir avec de l'eau ; ou bien l'on peut, au lieu d'onguent quelconque, employer le mercure divisé par le mucilage de gomme arabique. Alors, à la vérité, le procédé devient plus pénible & plus coûteux ; mais le Praticien qui desire rendre le traitement facile & agréable à son malade, fait peu d'attention à des inconvéniens de cette espece.

On peut prévenir efficacement par cette méthode le prurit & les pustules qui proviennent de quelqu'une des causes dont nous venons de parler ; sur-tout si après avoir eu l'attention de raser la partie sur laquelle on doit faire la friction, l'on a soin de ne pas frotter trop rudement avec la main dans les commencemens. Car ces pustules paroissent quelquefois provenir de ce qu'on a violemment tirailé les poils dans des directions opposées : ce qu'il est

252 OBSERVATIONS PRATIQUES

facile d'éviter par le moyen que nous venons de voir.

Quand on s'est déterminé à l'application des frictions mercurielles, les principaux objets qu'on doit avoir en vue, sont, 1°. de disposer le lieu où l'on va faire les frictions, pour que l'absorption du mercure se fasse le mieux qu'il est possible; 2°. de disposer la surface du corps à transmettre le métal à travers ses pores aussi promptement qu'il est possible, après qu'il a produit les effets désirés dans le système, & prévenir ainsi la salivation & le dévoiement, ou empêcher qu'il ne s'arrête dans aucune des cavités du corps. Pour remplir ces différens objets, il est toujours à propos de prescrire un purgatif avant de commencer les frictions, & de faire mettre le malade dans un bain dont la chaleur soit environ à 86 degrés du thermometre de Fahrenheit, pendant une demi-heure ou une heure. Après qu'il y sera resté un quart-d'heure, on le frottera par-tout le corps avec une brosse, ou avec un morceau de flanelle & du savon, pour nettoyer la peau & l'adapter mieux au double objet dont nous venons de parler.

Il faut faire cette opération, si rien ne s'y oppose, un jour avant, ou le même jour que l'on commence les frictions, & la réitérer une ou deux fois par semaine pendant tout le tems qu'elles durent.

Le même soir, ou le lendemain du premier bain, avant de se mettre au lit, le malade doit commencer les frictions, en se frottant à la partie latérale interne ou externe de la cuisse ou de la jambe avec une drachme de l'onguent mercuriel, préparé comme nous l'avons prescrit ci-dessus. La friction doit être faite auprès du feu dans l'hiver, & il faut continuer de frotter doucement pendant une demi-heure ou une heure, jusqu'à ce que toute la dose y soit entrée. On couvrira ensuite la partie avec un linge arrêté par un bandage, ou bien le malade peut mettre un caleçon, ou une paire de bas, si la friction a été faite à la jambe. Les mêmes linges, &c. peuvent servir pour tout le tems du traitement : l'objet qu'on se propose en les mettant n'étant que d'empêcher les chemises & les draps de lit d'être salis & noircis par l'onguent.

Avant chaque nouvelle friction, on aura

soin de bien nétoyer la partie & d'enlever la graisse & la noirceur avec de l'eau chaude & du savon. Il vaut mieux que le malade se fasse les frictions avec sa propre main ; mais comme cette opération peut être fatigante pour les gens réplets ou pour les personnes du sexe , on peut dans ces cas mettre un domestique au fait de cette opération , & la lui faire exécuter avec un gant de vessie de cochon. Je ne conseillerois à personne de rendre ce service à une autre , sans se servir d'un gant pareil ; parce que j'ai vu des exemples de salivation produite chez des personnes qui avoient fait des frictions mercurielles avec leur main nue. D'ailleurs on ne peut être entièrement certain de la quantité d'onguent qu'on introduit dans le corps du malade par les frictions , lorsqu'il y en a une partie d'absorbée par la main du serviteur.

Après la premiere friction , il faut observer attentivement si le mercure occasionne quelque dérangement dans le corps ; & si cela arrive , il faut attendre pendant deux jours , en ayant soin que le malade observe le même régime , qu'il soit bien vêtu , & qu'il garde son appartement , sur-tout si le

climat est froid , ou si c'est dans une mauvaise saison.

Si au bout de deux jours , le malade ne s'apperçoit d'aucun symptome défagréable , il faut faire la seconde friction de la même manière que la première. Le lendemain il faut l'omettre encore , & si alors il n'en résulte aucun mauvais effet , les frictions peuvent être continuées chaque jour , le matin ou le soir , sans interruption , à moins qu'il ne survienne quelque accident. Cependant il faut changer l'endroit de la friction , tous les jours ou de deux jours l'un , afin d'éviter l'irritation de la peau , & d'empêcher qu'il n'y survienne des pustules. Si après cinq ou six frictions , l'on trouve que la constitution du malade supporte le mercure , & qu'il n'éprouve ni fièvre , ni diarrhée , ni salivation , ni sueurs immodérées , on peut employer à chaque friction deux drachmes d'onguent , sur-tout si les symptômes vénériens sont opiniâtres.

Dans cet état des choses , lorsque la saison est belle , ou même si elle n'est pas extrêmement froide & humide , le malade peut sortir tous les jours pendant l'usage des frictions , pourvu qu'il soit vêtu chau-

256 OBSERVATIONS PRATIQUES

dement, & qu'il évite le vent froid & surtout l'air de la nuit; mais il doit prendre bien garde de ne pas laisser arrêter sa transpiration; & par conséquent, si le tems est froid & humide, il vaut mieux qu'il reste chez lui dans une chambre chaude, & qu'il tâche, autant qu'il est possible, de ne pas souffrir de froid. Dans la mauvaise saison, le malade portera des bas de laine & une camisolle de flanelle sur la peau ou sur la chemise, selon les circonstances.

Pendant tout le tems des frictions, on continuera, s'il est possible, l'usage des bains chauds, une ou deux fois par semaine, comme nous l'avons déjà prescrit, & l'on continuera de cette manière jusqu'à ce que la santé du malade soit parfaitement rétablie. C'est ce qui arrivera au moyen de trente ou trente-cinq frictions, si les parties molles sont les seules qui aient été affectées; mais si c'est une vérole confirmée ou d'ancienne date, de sorte que les os soient affectés; il en faudra absolument cinquante, soixante, ou même soixante-dix pour opérer une guérison parfaite & radicale; mais il est hors de doute que cela doit varier suivant la constitution du malade.

Il se présente ici une observation très-essentielle, tant pour le malade que pour le Médecin. C'est qu'il ne faut jamais regarder comme une preuve assurée de la guérison radicale, la simple cessation des symptômes. On doit dire aux malades, dès le commencement, sur-tout si ce sont des personnes du sexe, que le soulagement des douleurs & la diminution des symptômes de la vérole sont des choses très-différentes de la destruction totale du virus & de la guérison radicale de la maladie. On peut souvent produire les premiers effets en trois ou quatre jours, au moyen d'un très-petit nombre de frictions ; au lieu qu'il faudra quelquefois tout autant de mois pour produire les derniers. Il arrive quelquefois à cet égard, lorsqu'on cesse les frictions aussitôt que les symptômes disparoissent, la même chose que lorsqu'on abandonne le quinquina dans les fièvres intermittentes, aussitôt que la fièvre est coupée. Elle revient bientôt, quoique peut-être sous un type différent ; au lieu qu'en continuant plus long-tems de donner le quinquina, on s'assure d'une guérison parfaite, & l'on s'affranchit de la crainte des rechûtes.

Il faut donc , pour l'intérêt des malades , continuer l'usage du mercure aussi long-tems qu'il est nécessaire. Mais c'est ici que le Praticien doit donner des preuves de son jugement & de son expérience.

Lorsque le malade , pendant les frictions , ou pendant qu'il prend du mercure de toute autre maniere , s'apperçoit que ses gencives commencent à se gonfler , que son haleine devient puante , & que l'intérieur de la gorge lui fait mal ; ou lorsqu'il crache plus fréquemment que de coutume , il faut aussi-tôt suspendre l'usage du mercure jusqu'à ce que ces symptômes disparoissent ; & alors on peut le continuer de nouveau. Mais je pense qu'il est à propos de pousser d'abord les frictions un peu vivement , si le malade peut d'ailleurs les supporter , jusqu'à ce que la bouche soit un peu affectée. Parce que l'on est assuré par-là que les frictions ont eu leur effet convenable , & que le mercure a été absorbé dans le système.

La plupart des malades éprouvent , comme je l'ai déjà dit , un certain soulagement après quelques frictions ; mais il en est , & ce sont sur-tout ceux qui ont les

os affectés de tophus , de caries , &c. dans lesquels on n'observe aucune rémission des symptômes , jusqu'à ce qu'ils aient reçu quinze ou vingt frictions. Et quelquefois , dans cet état de la maladie , il faut jusqu'à dix-sept onces d'onguent mercuriel pour opérer une guérison complète.

Dans tous les cas de cette espèce , il faut tâcher de faire exhaler le mercure par la transpiration ; mais on ne doit pas exciter des sueurs abondantes , de crainte qu'elles n'affoiblissent le malade , ou ne le jettent dans la phthisie ; sur-tout chez ceux qui sont cachectiques , ou d'une constitution délicate. Lorsqu'on trouve le corps naturellement disposé à la salivation ou aux sueurs immodérées , il faut procéder avec la plus grande circonspection. Dans ce cas , le malade doit rester chez lui , sur-tout pendant le mauvais tems , dans une chambre modérément chaude , sans être trop couvert , sur-tout à la tête ou au col. La température qu'il faut donner à la chambre pendant l'hiver est entre les 75^e & 78^e degrés du thermometre de Fahrenheit. Et si dans cette saison , il étoit obligé de sortir , il doit porter toujours une camisolle de

flanelle sous sa chemise. Mais lorsque le tems est beau & sec, je suis d'avis que ces malades sortent; car j'ai trouvé dans bien des cas, que la jouissance de l'air libre & pur contribue à empêcher la salivation. Ces précautions sont inutiles dans les climats chauds ou dans la belle saison. Si le malade est foible, on peut lui donner avec succès depuis un scrupule jusqu'à une drachme de quinquina dans du lait matin & soir.

J'ai communément réussi par ces moyens à prévenir les mauvais effets du mercure dont j'ai parlé ci-dessus; ainsi qu'à l'empêcher de s'enfuir par les selles : circonstance à laquelle on doit toujours faire beaucoup d'attention pendant un traitement mercuriel; car lorsque les remèdes mercuriels occasionnent le dévoiement, ils ne sont plus absorbés dans la masse & ils n'ont que peu ou point d'effet contre la maladie. J'ai vu plusieurs malades traités de cette manière, qui après avoir pris, pendant six semaines ou deux mois, du mercure qui leur avoit donné une diarrhée continuelle durant tout cet intervalle, se trouvoient à la fin du traitement à peu

près dans le même état qu'au commencement. Il arrive dans ce cas exactement la même chose que lorsque par défaut de ménagement on a imprudemment excité la salivation. Le mercure alors, quoique absorbé dans le système, semble s'écouler par les glandes salivaires dans la même proportion qu'on l'introduit, sans produire dans le corps ces effets salutaires qui sont indispensables pour déraciner le virus vénérien, & pour compléter la guérison. Les sueurs immodérées occasionnées par le mercure paroissent avoir les mêmes inconvéniens.

II. *Des FUMIGATIONS MERCURIELLES.*

J'ai peu de chose à dire sur ce sujet. Les fumigations mercurielles ne sont maintenant plus en usage pour guérir la vérole; mais elles nous fournissent souvent un remède très-efficace contre des maladies vénériennes locales. On met pour cet effet du cinnabre sur des charbons ardents, & l'on conduit la fumée qui s'en élève à la partie affectée, par le moyen d'un entonnoir adapté à cet usage.

III. Des PRÉPARATIONS MERCURIELLES SALINES & autres.

Le *mercure gommeux*, (*hydrargyrum gummosum*) est une préparation mercurielle douce, dans laquelle le mercure crud se trouve divisé par le moyen de la gomme arabique. M. Plenck, inventeur de cette préparation, la prescrivit d'abord délayée dans l'eau sous la forme d'une mixture; mais cette forme s'étant trouvée incommode, à cause que le mercure ne demeurait pas suffisamment suspendu, il proposa, il y a quelque tems, de réduire ce médicament en pilules. Il ordonne pour cet effet qu'on triture deux gros de mercure parfaitement purifié avec trois gros de gomme arabique en poudre & suffisante quantité de conserve de mûres de ronce, dans un mortier de marbre, jusqu'à ce que le mercure ait disparu; qu'ensuite après avoir continué la trituration pendant une heure de plus, on mêle la masse avec une demi-once de mie de pain blanc pour la former en pilules de trois grains chacune, & qu'on fasse prendre au malade six de ces pilules matin & soir. Cette forme est sans doute moins

incommode ; mais elle est encore sujette à un autre inconvénient , qui est que ces pilules , comme toutes celles qui sont faites avec de la mie de pain , deviennent si dures , lorsqu'on les garde un peu long-tems , qu'il arrive fréquemment qu'elles passent dans l'estomac sans s'y dissoudre , & sortent par les selles sous la même forme globulaire qu'elles avoient lorsqu'on les a prises. On peut prévenir à la vérité cette objection en les préparant de frais tous les deux ou trois jours ; & moyennant cette attention , on doit les regarder comme une acquisition très-précieuse pour notre pharmacopée syphilitique. Un bol composé de cinq à dix grains de mercure éteint dans une suffisante quantité de conserve de roses , ou de confection cordiale , &c. peut , suivant les circonstances , remplir le même objet.

Le mercure divisé par le moyen de quelque baume seroit un remède aussi agréable qu'utile en bien des cas. On a fait une tentative de ce genre dans les pilules de mercure térébinthiné , dans lesquelles on unit une once de mercure avec une once & demie de térébenthine. Mais outre que la trituration est très-ennuyeuse : ce à quoi

l'on pourroit obvier en y ajoutant quelques gouttes d'huile de térébenthine ; cette composition est quelquefois très-propre , ainsi que toutes les autres préparations mercurielles salines, à exciter des tranchées & à donner le dévoiement. Il est hors de doute que cet effet provient de la mauvaise qualité de la térébenthine ; il faut donc choisir la meilleure pour cet objet. Et suivant les circonstances, on pourroit essayer, au lieu de la térébenthine, le baume de Giléad, ou le baume de Canada, unis avec quelque poudre végétale, & donner cette composition à prendre tous les soirs sous la forme d'une pilule de cinq à sept grains.

Le *saccharum hydrargyratum*, ou mercure trituré avec deux ou trois fois son poids de sucre candi, est en bien des cas un remède excellent ; tant à prendre intérieurement que pour les usages extérieurs. La dose, à l'intérieur, est de quatre à huit grains par jour, sous la forme de poudre, pilules, ou trochisques.

J'ai constamment observé que le précipité *perse* ou mercure calciné, (*hydrargyrum calcinatum*,) est sujet à donner des tranchées : ce qu'on peut éviter à certains

égards , en le donnant tous les soirs à la dose d'un demi grain avec un grain d'opium sous la forme de pilule.

L'*hydrargyrum acetatum*, connu sous le nom de *pilules* ou *trochisques de Keiser*, a fait grand bruit en France dans ces derniers tems. On l'a recommandé comme le meilleur & le plus sûr de tous les remedes pour guérir les maux vénériens de l'espece même la plus invétérée & la plus opiniâtre; sans jamais occasionner la salivation, ou produire aucun de ces mauvais symptomes qui quelquefois accompagnent l'usage des autres préparations mercurielles. Le tems & l'expérience ont cependant fait voir que ce remede manquoit quelquefois de guérir les maladies vénériennes, & qu'il produisoit souvent les mauvais effets qu'on reproche aux autres remedes mercuriels. En effet, tant que le mercure n'aura pas changé de nature, il fera saliver s'il n'est pas administré avec prudence, ou si les malades n'observent pas les règles qui leur sont prescrites. D'ailleurs il ne peut pas se faire que dans le nombre de malades auxquels on donne ce remede, il ne s'en rencontre plusieurs pour lesquels il ne fera pas

266 OBSERVATIONS PRATIQUES

aussi efficace qu'on l'a prétendu. Tout Médecin qui a quelque pratique des maladies vénériennes doit avoir rencontré des cas où une préparation mercurielle n'ayant produit que peu ou point d'effet, une autre qu'on essaye ensuite réussit au-delà de toute espérance. Nous ne sommes point en état de rendre raison de ces différences, & nous ne connoissons pas assez parfaitement la nature du corps humain pour les prévoir *à priori*. Les pilules de Keyser sont une préparation mercurielle saline, dans laquelle le mercure, après avoir été divisé par une longue trituration, est ensuite dissous dans le vinaigre. Elles peuvent par conséquent produire quelquefois de très-bons effets & guérir parfaitement la maladie syphilitique aussi bien que les autres préparations mercurielles, tandis que dans d'autres occasions elles peuvent être moins utiles ou même nuisibles (1).

(1) L'*hydrargyrum acetatum*, qu'on fait en mêlant une dissolution d'*hydrargyrum nitratum* dans l'eau avec une dissolution de sel diurétique ou terre foliée de tartre, *alkali vegetabile acetatum*, est une préparation ingénieuse & peut-être beaucoup meilleure que celle de Keyser. Elle contient certainement plus de mercure que celle-ci, parce que les métaux ne peuvent se dissoudre dans les acides qu'à proportion qu'ils perdent leur phlogistique ;

Nous appellons *hydrargyrum tartarifatum* une combinaison du mercure avec le simple acide du tartre , afin de le distinguer du *tartarus hydrargyratus* inventé à Paris, par le Docteur Pressavin, qui lui a donné le nom de *terre-feuilletée mercurielle*. Cette dernière préparation est une combinaison du mercure avec le tartre purifié , ou crème de tartre, qui est un sel moyen composé de l'alkali végétal surfaturé de l'acide tartareux. Ces deux préparations sont de nature à-peu-près analogue avec celle qui précède ; quoiqu'elles lui soient peut-être préférables à quelques égards.

On a employé l'*hydrargyrum nitratum*, ou mercure uni avec l'acide nitreux, sous différentes formes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour l'usage extérieur, on se sert de la dissolution étendue d'eau, comme d'un détersif, & c'est un très-bon remède pour les chancres, &c. La même dissolution faite avec une once de mercure sur

& dans la préparation dont je parle, le mercure est mieux calciné par l'union qu'il a déjà contractée avec l'acide nitreux : ce qui le rend soluble dans l'acide acéteux, aussi-tôt que l'acide nitreux dégagé du mercure par l'alkali fixe végétal, laisse le premier en liberté d'agir sur le mercure.

268 OBSERVATIONS PRATIQUES

trois onces d'acide nitreux, & unie pendant qu'elle est encore chaude avec une livre de graisse de porc par une trituration exacte, fournit, sous le nom d'*unguentum citrinum*, un des remèdes les plus efficaces que je connoisse pour les affections vénériennes opiniâtres de la peau. Le précipité rouge, *hydrargyrum nitratum rubrum*, qu'on prépare avec la même dissolution exposée au feu jusqu'à ce que le résidu ait acquis cette couleur, est d'une nature corrosive, & ne s'emploie conséquemment que comme un caustique, dont on saupoudre les ulcères vénériens. On donne communément à l'intérieur l'*hydrargyrum nitratum* depuis un demi grain jusqu'à un grain dans une pinte de quelque décoction appropriée.

Les gouttes blanches du Docteur Ward, qui ont eu de la réputation, ne sont autre chose que le mercure dissous par l'acide nitreux, précipité & redissous, par le moyen du sel ammoniac.

Mais l'*hydrargyrum nitratum cinereum* de la nouvelle Pharmacopée d'Edimbourg, appelé par le Docteur Black qui l'a inventé, *pulvis mercurii cinereus*, est une

des préparations mercurielles salines les plus douces ; & on peut le donner à la dose d'un grain tous les soirs, & même au besoin deux fois par jour. Voici la maniere de le préparer.

Prenez du mercure , de l'acide nitreux affoibli : de chaque , égales quantités en poids.

Lorsque le mercure est dissous, il faut étendre la dissolution avec de l'eau pure , & y verser ensuite autant d'alkali volatil fluor (*spiritus salis ammoniaci*) qu'il en faut pour séparer le mercure de l'acide ; il faut après cela laver avec de l'eau pure la poudre grise qui s'est précipitée & la sécher.

Le sirop de Bellet, qu'on appelle communément *sirop végétal* , composition vantée & dont on fait un secret en France , n'est , à ce que j'ai appris de personnes dignes de foi , que du mercure précipité de l'acide nitreux par l'alkali fixe végétal , & ensuite dissous dans l'éther vitriolique , mêlé avec quelque sirop agréable au goût.

Je vais maintenant m'occuper de la préparation mercurielle que le célèbre Van-Swieten a recommandée le premier. C'est le sublimé corrosif, *mercurius sublimatus*

corrosivus, ou comme j'aimerois mieux l'appeller dans le langage plus exact de la chymie, *hydrargyrum muriatum (fortius)*. Ce remede excita, il y a quelques années, l'attention de toute l'Europe. Il étoit prôné par quelques-uns comme un remede excellent, très-efficace contre les symptomes les plus invétérés, & les modifications les plus rebelles de la maladie vénérienne. On le recommandoit particulièrement dans les éruptions cutanées, & dans les affections vénériennes des os; pendant que d'autres s'élevoient contre, & l'accusoient de produire souvent les plus mauvais effets, sans jamais guérir radicalement la maladie. Les deux partis paroissent avoir été trop loin, tant sur la louange que sur le blâme. J'ai vu des cas où ce remede a parfaitement guéri les affections vénériennes les plus invétérées & les plus rebelles. Tandis que dans d'autres il produisoit les plus mauvais effets, tels que le dégoût des alimens, les tranchées, le dévoiement, la céphalalgie, la fièvre, les anxiétés, l'oppression de poitrine, & même le crachement de sang; sans guérir, ou même sans paroître avoir la moindre action sur la maladie primitive;

mais j'ai fréquemment observé que ce remède mitige pour l'ordinaire très-promptement les plus fâcheux symptômes de la maladie vénérienne, sans opérer une guérison radicale; même après qu'on en a fait usage pendant un tems très-considérable; & je suis porté maintenant à penser, que le sublimé corrosif doit la grande réputation qu'il eut d'abord, à cette propriété d'adoucir souvent les symptômes d'une manière si remarquable.

Quoiqu'il soit certain, après tout, qu'il est des constitutions qui ne supporteront jamais ce remède sans danger, il me paroît cependant assez probable, d'après les observations que j'ai été en état de faire, que les mauvais effets qu'on a attribués au sublimé corrosif sont quelquefois provenus de ce qu'il étoit mal préparé, ou de ce qu'on l'avoit pris à des doses immodérées, ou de quelque défaut de jugement pratique dans les personnes de l'art qui l'avoient administré. D'après cela, quoique je n'aime point à employer des remèdes violens quand je puis opérer la guérison par des moyens plus doux, je dois convenir qu'il se présente quelquefois dans la pratique

des cas où les symptômes sont tels qu'ils exigent l'usage des remèdes les plus puissans; ne fut-ce que dans l'unique objet d'obtenir un soulagement prompt, quoique momentané. Dans des occasions pareilles, il est quelquefois extrêmement à propos d'avoir recours au sublimé corrosif; quoique j'aie des raisons de croire que ces cas sont beaucoup moins fréquens qu'on ne le pense communément. Mais en tout état de cause, il faut considérer attentivement la constitution du malade avant de recourir à ce remède. S'il est d'une constitution forte, & que ses poumons soient sains, on peut en sûreté essayer le sublimé corrosif en prenant les précautions nécessaires relativement à sa dose & à la manière de l'administrer. Mais je ne voudrois jamais l'ordonner lorsque le malade est d'une constitution foible, délicate, irritable, ou lorsqu'il a la poitrine étroite, ou lorsqu'il a été précédemment attaqué d'une hémophthysie ou de quelque autre maladie du poumon; car j'ai toujours observé que ces malades se trouvoient mal de l'usage du sublimé corrosif. J'ai même vu des gens qui paroissoient d'une forte constitution

être

Être affectés de la même manière par ce remède; c'est pourquoi il est toujours nécessaire d'être circonspect en le mettant en usage. On ne doit jamais commencer par en donner plus d'un quart de grain, ou tout au plus un demi grain par jour, en dissolution dans du lait, ou dans de l'eau d'orge, ou dans une décoction de fausse-pareille. Lorsqu'on le donne de cette manière, si le sujet est propre à le supporter, il n'est pas à craindre qu'il produise de mauvais effets, ou du moins que l'usage en devienne dangereux; sur-tout si on l'administre dans la belle saison ou dans un climat chaud. Il faut d'ailleurs se souvenir toujours, quand on emploie le sublimé corrosif, qu'on ne sauroit être trop attentif au choix de ce remède, & que malgré le plus grand soin & la plus grande exactitude dans la préparation de cette substance active, il n'est presque jamais possible de l'obtenir du même degré de force, quoique l'on suive toujours précisément le même procédé. Dans tous les cas, il faut par conséquent ordonner au malade d'en cesser l'usage, dès qu'on s'apperçoit de quelqu'un des mauvais symptômes dont nous avons

fait mention ci-dessus. On le trouve quelquefois sophistiqué avec de l'arsénic dans le commerce : ce qu'on peut découvrir en le mêlant avec de l'eau de chaux ; car dans ce cas il présente une couleur noire ; au lieu que quand il est pur , il donne avec la même eau un précipité de couleur orangée , auquel on donne le nom de *lotio syphilitica flava* , si l'on a mis une drachme de sublimé corrosif dans une livre d'eau de chaux. D'ailleurs lorsqu'il est pur , sa texture doit paroître rayonnée , au lieu qu'il a plutôt l'air granulé lorsqu'il est sophistiqué.

L'hydrargyrum muriatum (mitius) , ou encore plus proprement , *calx hydrargyri muriata* , communément appelé *mercure doux* , *mercure sublimé doux* , *aquila alba* , *calomel* , *panacée mercurielle* , &c. est une préparation plus douce que le sublimé corrosif ; mais c'est encore une préparation âcre, & par-là très-propre à causer des tranchées & à s'évacuer par les selles. D'ailleurs , comme sa manière d'agir dépend beaucoup de l'exactitude de sa préparation , & d'autres circonstances dont nous ne sommes pas les maîtres , il ne faut pas compter beaucoup sur son efficacité pour guérir la vérole. En

effet , le mercure doux , dans les différens pays, dans les différentes boutiques du même pays , & même dans les mêmes boutiques en différens tems , est un remede très-différent. Par cette raison, quoiqu'on ne puisse pas nier que bien des personnes n'aient été guéries de la maladie vénérienne par ce remede , je ne l'emploie jamais à l'intérieur que comme un purgatif mercuriel. Cependant comme il peut être excellent pour des applications topiques, & comme M. Scheele a parfaitement levé toutes les difficultés auxquelles il étoit sujet , au moyen de sa nouvelle méthode de le préparer par la voie humide (1) , je crois faire plaisir au plus grand nombre de mes Lecteurs , en leur donnant ici la description exacte du procédé de M. Scheele.

« Il faut mettre une demi-livre de mercure & la même quantité d'eau-forte pure dans un petit vaisseau à long col , dont on bouchera l'orifice avec du papier. On placera ce vaisseau dans un bain de sable chaud ; & quelques heures après , lorsque l'acide

(1) On a inféré depuis peu cette méthode dans les *Actes de Stockholm*.

ne donnera plus aucun signe d'action sur le mercure , il faut augmenter le feu au point que la dissolution soit prête à bouillir. On continuera le même degré de chaleur pendant trois ou quatre heures , en ayant soin de remuer le vaisseau de tems en tems ; & enfin , il faut laisser bouillir doucement la dissolution pendant un quart-d'heure. On aura fait dissoudre dans le même - tems quatre onces & demie de beau sel commun dans trois ou quatre pintes d'eau. Il faut verser cette dissolution bouillante dans un grand vaisseau de verre , & y mêler peu-à-peu la dissolution de mercure dont nous venons de parler , aussi dans un état d'ébullition , en ayant soin de tenir le mélange dans un mouvement perpétuel. Lorsque le dépôt sera reposé , il faut décanter la liqueur claire qui est au dessus ; après quoi , on le lavera plusieurs fois avec de l'eau chaude , jusqu'à ce qu'il cesse de communiquer aucun goût à l'eau. Il faut mettre à égoutter sur un filtre le précipité qu'on aura obtenu par cette méthode , & le sécher ensuite à une chaleur modérée ».

« On pourroit supposer que lorsque l'acide nitreux cesse de faire effervescence

avec le mercure, il en est saturé : mais il s'en faut de beaucoup que cela soit ainsi ; car l'acide, lorsqu'on augmente la chaleur, est encore capable d'en dissoudre une quantité considérable ; mais avec cette différence que le mercure est calciné par l'acide au commencement du procédé, & qu'ensuite il est dissous sous sa forme métallique. Ce qui le prouve, c'est que non-seulement il s'élève alors plus de vapeurs élastiques, mais encore qu'en y ajoutant de l'alkali caustique, fixe ou volatil, on obtient un précipité noir ; au lieu que quand la dissolution ne contient que du mercure calciné, le précipité qu'on obtient par cette addition est de couleur jaune. Si l'on distille à un feu doux ce précipité noir, il s'élève sous la forme de mercure coulant, & laisse dans la cornue une poudre jaune qui n'est autre chose que la portion de mercure qui a été calcinée par l'acide nitreux au commencement de l'opération ».

« Il est nécessaire de faire bouillir la dissolution de mercure pendant environ un quart - d'heure, pour tenir l'*hydrargyrum nitratum* dans un état de liquidité, parce qu'il est très-disposé à cristalliser. Il reste

278 OBSERVATIONS PRATIQUES

ordinairement du mercure non - dissous ; mais il vaut toujours mieux en mettre trop que trop peu , parce que plus la dissolution contient de substance métallique , plus on obtient de mercure doux ».

« On doit verser la dissolution mercurielle en petite quantité à la fois , & avec précaution , dans la dissolution de sel , pour empêcher qu'il n'y tombe en même - tems aucun globule du mercure qui n'est pas dissous ».

« Deux onces de sel commun suffiroient pour précipiter tout le mercure ; mais si l'on n'en emploie que cette quantité, il peut facilement arriver qu'il s'attache à ce précipité quelque particule de sublimé corrosif superflu , que l'eau seule est incapable d'en séparer complètement. C'est-là, sans doute, ce qui est cause que le mercure précipité blanc est toujours corrosif. J'ai trouvé que le sel commun a, comme le sel ammoniac, la propriété de dissoudre une grande quantité de sublimé corrosif. C'est pourquoi j'emploie quatre onces & demie de sel commun , afin de séparer entièrement le sublimé corrosif de mon précipité ».

« Si l'on considère de quelle manière on

obtient le mercure doux par la voie sèche dans la sublimation , on ne trouvera point difficile de donner l'ætiologie de ce nouveau procédé ».

« Le sublimé corrosif (*mercurius corrosivus albus*) est un sel moyen , composé , comme tout le monde sait , de l'acide marin combiné avec la chaux de mercure. Ce sel est capable de dissoudre une bonne quantité de mercure sous sa forme métallique ; mais il faut , pour cet effet , que les molécules les plus fines de l'un & de l'autre s'unissent réciproquement : c'est ce qui arrive lorsque par le moyen de la chaleur ils sont tous deux réduits en vapeurs. La même chose se présente dans le procédé que nous venons de décrire. La dissolution dont j'ai parlé en premier lieu contient la chaux de mercure & le mercure même , réduits à leurs plus petites molécules. Si nous ajoutons de l'acide marin ou (pour éviter la dépense) du sel commun , l'acide marin s'unira avec la chaux de mercure , & le résultat de cette union sera un vrai sublimé corrosif : & comme la dissolution contient aussi du mercure dans son état métallique , celui-ci attirera immédiatement autant de sublimé

280 OBSERVATIONS PRATIQUES

corrosif qu'il lui en faut pour se saturer ; & par ce moyen , il se formera un vrai mercure doux, qui étant insoluble, se précipitera sur le champ ».

« Les faits suivans prouvent que ce précipité est un bon & vrai mercure doux. 1°. Il est entièrement insipide. 2°. Je l'ai sublimé ; j'ai examiné la portion qui étoit montée la première , & qui auroit dû être corrosive si le précipité avoit contenu quelque chose de cette nature, puisque c'est un fait connu que le sublimé corrosif monte plutôt que le mercure doux ; au lieu que ce qui s'est élevé pendant tout le cours de la sublimation étoit de pur mercure doux , exactement semblable à celui qu'on obtient de la maniere ordinaire. 3°. J'ai mêlé ce précipité avec une quatrieme partie de mercure coulant, & je l'ai sublimé, en supposant que s'il contenoit un excédent de sublimé corrosif, il seroit en état de se charger d'une nouvelle quantité de mercure. Mais bien loin que cela soit arrivé, le mercure coulant que j'avois employé n'a rien perdu de son poids dans cette expérience. 4°. On fait que les alkalis caustiques & l'eau de chaux donnent une couleur noire au mercure doux.

La même chose est arrivée avec le mien. La couleur noire n'est autre chose que le mercure divisé en particules très-fines ».

« Je ne puis douter que le procédé que je viens de décrire ne soit plus avantageux que celui qu'on a mis en usage jusqu'à présent. 1°. Parce que l'on peut préparer ce mercure doux avec moins de difficulté, moins de dépense, & sans employer du sublimé corrosif. 2°. Comme on n'a jamais lieu de craindre qu'il contienne rien de corrosif, pourvu qu'il ait été suffisamment édulcoré, on peut toujours le donner en toute sûreté. 3°. La personne qui opère n'est pas exposée à la poussière nuisible qui s'élève pendant la trituration du sublimé corrosif avec le mercure dans l'ancienne méthode. 4°. Ce mercure doux est toujours en poudre plus fine que le mercure doux ordinaire, parce qu'il est impossible de rendre ce dernier égal à l'autre à cet égard, quelque long-tems qu'on puisse le broyer ».

Ce calomel, ainsi préparé, sera excellent non-seulement comme purgatif, mais surtout pour l'usage extérieur, soit en poudre, soit suspendu dans de l'eau simple, ou dans quelque dissolution mucilagineuse; ou

bien l'on peut aussi , dans l'occasion , en mêler une drachme avec quatre onces d'eau de chaux , qu'on emploie sous le nom de *lotion syphilitique noire* , pour la distinguer de la *lotion syphilitique jaune* qu'on fait avec le sublimé corrosif & l'eau de chaux. Le calomel ou mercure doux , lorsqu'il est bien préparé , doit donner à l'eau de chaux la couleur *noire* , comme le sublimé corrosif doit lui donner la couleur *jaune*.

Le *turbith minéral* (*calx hydrargyri vitriolata*) , qu'on appelle aussi *mercurius emeticus flavus* , est un remède très - peu employé maintenant , si ce n'est par quelques personnes qui pensent qu'un vomitif mercuriel est préférable au tartre stibié ou à l'ipécacuanha , pour guérir les tumeurs vénériennes des testicules. J'ai cependant vu quelques cas où ce remède , donné journellement à très-petites doses , a détruit efficacement des affections vénériennes cutanées du plus mauvais genre.

Je dois parler enfin d'un remède que bien des personnes ont employé depuis quelque tems , & emploient même encore pour le traitement de la vérole ; je veux dire la poudre ou les *pilules de Plummer* , qui ne sont

pas , à proprement parler , une préparation mercurielle , mais un simple mélange mécanique de mercure doux & de soufre d'antimoine. J'ai déjà observé que le mercure doux , lorsqu'il est préparé par la sublimation, est un remède très-différent en différens pays & dans les différentes boutiques ; que ce n'est par conséquent pas un médicament sur lequel on puisse compter. Par cette raison , je ne conseillerois à personne , tant pour sa propre satisfaction que pour l'avantage des malades , de se fier aux pilules de Plummer pour guérir les maladies vénériennes. Plummer a combiné le calomel avec le soufre d'antimoine , probablement dans l'objet que semblent encore avoir en vue ceux qui emploient cette composition : savoir , de prévenir la salivation par le moyen du soufre , & de diriger le mercure vers la peau. C'est sur - tout , à ce qu'il paroît, ce qu'on se propose de faire dans les éruptions cutanées de l'espèce vénérienne. Mais quoique ce remède puisse réussir quelquefois à dissiper les affections cutanées , je dois prononcer , tant d'après ma propre expérience que d'après celle de plusieurs Praticiens impartiaux , qu'il est très - peu

284 OBSERVATIONS PRATIQUES

propre pour guérir une vérole confirmée. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'observer que ces pilules ayant été prises pendant un tems considérable , ont seulement écarté les symptomes pour un tems , sans opérer une guérison radicale ; & ce font - là pour moi des motifs suffisans pour les regarder comme un remede incertain , & pour penser qu'aucun Praticien ne doit mettre sa confiance en ces pilules pour la guérison de la vérole , tandis qu'il a un remede plus sûr entre ses mains.

Je ne suis point en état de dire si le mercure crud bouilli avec de l'eau simple lui communique quelque portion de ses vertus , & je ne fais avec quel succès on pourroit administrer une pareille décoction pour guérir les maladies vénériennes. J'ai vu donner cette décoction aux enfans attaqués des vers dans différentes parties du continent , & je n'ai pas eu l'occasion de déterminer quel en est l'effet. Mais je fais qu'à Londres un chien a été guéri radicalement d'une gale très-opiniâtre , pour laquelle on avoit essayé en vain une foule de remedes , par l'usage de cette décoction pour boisson ordinaire.

I V. *De la SALIVATION.*

On a mis en question si une vérole confirmée peut être guérie radicalement sans salivation ; & quoiqu'il n'y ait peut-être pas maintenant un seul homme de l'art qui doute de la possibilité d'une guérison radicale sans cette évacuation , il en est encore un grand nombre qui emploient la salivation , non-seulement pour le traitement de la vérole , mais encore , en certains pays , pour celui de la gonorrhée. Cette manière de traiter la vérole est encore fort en vogue dans la pratique particulière , aussi-bien que dans les hôpitaux , sur-tout en France. Dans les autres pays , elle est presque entièrement bornée aux seuls hôpitaux.

Je vais examiner jusqu'à quel point on peut justifier cette pratique de faire saliver les malades dans le traitement de la vérole , ainsi que dans celui de la gonorrhée.

Bien des Auteurs ont été d'opinion , & le Docteur Freind , ainsi que plusieurs Ecrivains modernes , ont soutenu que non-seulement la salivation est nécessaire pour opérer une guérison radicale , mais encore que plus la salivation est abondante , plus la

guérison de la vérole est assurée , sur-tout quand les os sont affectés.

Je dois avouer que l'expérience m'a toujours fait voir tout le contraire. Parmi un très-grand nombre de malades , différens par leur âge , par leur constitution , & par les climats qu'ils habitoient , que j'ai eu occasion de traiter , je n'en ai pas rencontré un seul qui eût besoin de la salivation ; & j'ai constamment observé , au contraire , que plus la salivation avoit été considérable , moins la guérison de la vérole étoit assurée. Cela est si vrai , que les partisans modernes de la salivation avouent unanimement qu'une forte salivation est nuisible , & qu'il n'en faut exciter qu'une douce. Si je pouvois accorder ce dernier point , j'observerois que dans beaucoup de cas , c'est une chose plus facile à dire qu'à exécuter , que d'arrêter , ou même de modérer la salivation lorsqu'elle est une fois établie. Il est souvent tout - à - fait hors de notre pouvoir d'y parvenir , & c'est encore un des grands *desiderata* en Médecine de connoître un remède spécifique qui produise cet effet. Nous avons si peu de puissance à cet égard , que j'ai vu plus d'une fois des malades que

la salivation a tués en épuisant leurs forces, sans qu'on ait pu la diminuer ou l'arrêter par quelque remède que ce pût être. D'autres qui n'y succomboient pas entierement, demeuroient languissans pendant des mois & des années entieres par l'effet de cette salivation, & j'en ai vu mourir plusieurs d'une phthisie occasionnée par un pareil traitement. D'ailleurs, la salivation est très-pénible pour le malade en l'obligeant à cracher nuit & jour, & en remplissant sa chambre d'une odeur très-désagréable; & elle a de plus l'inconvénient de causer des ulceres douloureux dans la bouche, dans la gorge, &c. : & si l'on ne fait pas assez d'attention dans le tems à ces ulceres, qu'on les prenne pour vénériens, & qu'on insiste sur l'usage de mercure, ils deviennent plus dangereux que la maladie vénérienne même.

Il peut donc paroître surprenant qu'on ait conservé & qu'on pratique encore dans les hôpitaux, pour le traitement de la maladie syphilitique, une méthode aussi dangereuse que celle de la salivation. J'ai entendu, il est vrai, alléguer en sa faveur les trois raisons suivantes. 1°. L'avantage de

tenir enfermés dans la chambre les malades qui ont la gonorrhée ou la vérole , & de les empêcher de gagner une nouvelle infection avant qu'ils soient guéris de la première. 2°. De se débarrasser de ces pauvres malades dans l'espace d'un mois ou de cinq semaines , afin d'en admettre d'autres à leur place dans l'hôpital , pour les traiter & les renvoyer de la même manière. 3°. Parce qu'il regne parmi les gens du peuple un malheureux préjugé en faveur de cette méthode , & qu'ils s'imaginent ne pouvoir être radicalement guéris , sans ce qu'ils appellent une bonne & longue salivation. Quant à moi , ces raisons me paroissent tout-à-fait insuffisantes. On pourroit facilement trouver de meilleurs moyens pour empêcher les malades de s'exposer à une nouvelle infection. A l'égard du second point , je pense qu'il est plus raisonnable & plus humain de guérir radicalement , & sans salivation , un moindre nombre de malades , en supposant qu'il faille employer plus de tems pour les guérir , que de soulager & pallier les maux d'un grand nombre en moins de tems , par une méthode incertaine , désagréable , & quelquefois dangereuse.

reuse. Nous pouvons ajouter à cela que l'expérience journaliere fait voir qu'un bon nombre de ces malades , qui semblent être guéris parce que les symptomes ont cessé pendant la salivation , reviennent fort souvent au bout d'un tems très - court à l'hôpital , avec les mêmes symptomes dont ils étoient attaqués auparavant , ou se trouvent obligés de chercher du secours ailleurs , en protestant solennellement qu'ils n'ont pas reçu de nouvelle infection. La troisieme raison qu'on allégué en faveur de la salivation est la plus mauvaise de toutes. Je suis d'opinion que tout homme integre , qui pratique la médecine , doit ne jamais céder aux préjugés de ses malades , lorsqu'ils peuvent leur être préjudiciables , ou lorsqu'il fait que , par une méthode contraire , il est en état de les guérir avec plus de certitude & moins d'inconvéniens. D'ailleurs , il est facile à un Médecin ou à un Chirurgien qui fait se concilier la confiance de son malade , de lui montrer la folie de pareils préjugés. La salivation étant par conséquent une méthode sujette à inconvéniens dans toutes les circonstances , je pense que le parti le plus prudent est de l'éviter dans tous les cas ;

ou si elle est établie , de la modérer & la dissiper le plus promptement qu'il est possible.

J'ai donné ci-dessus , en parlant des frictions mercurielles , la méthode pour prévenir la salivation. Voici , en peu de mots , les moyens qu'il faut employer pour cet effet. 1°. Apporter le plus grand soin dans l'administration du mercure , relativement à sa préparation & à sa dose. 2°. Éviter l'air froid & humide , sur-tout la nuit. 3°. Être vêtu chaudement ; & dans la mauvaise saison ou dans les climats froids & humides , porter constamment de la flanelle sur la peau. 4°. Faire un usage fréquent des bains chauds , & prendre intérieurement des décoctions diaphorétiques ou diurétiques , conjointement avec le mercure. 5°. Éviter les chambres trop chaudes & l'air renfermé. 6°. Couvrir légèrement le col & la tête , tant de nuit que de jour. 7°. Prendre un purgatif doux & rafraichissant , & interrompre l'usage du mercure aussitôt que l'halcine & les dents commencent à s'affecter. 8°. Si le malade n'est pas d'une constitution phlogistique , il faut ordonner plutôt une diète nourrissante avec l'usage modéré du vin , qu'un régime

trop frugal. Ceux qui sont accoutumés à fumer du tabac doivent s'en priver pendant le traitement mercuriel.

Il faut observer aussi qu'en général la salivation s'établit plus facilement quand on fait usage de préparations mercurielles âcres, & dans une saison ou un climat froids & humides ; que certaines constitutions y sont plus disposées que d'autres , & que ceux en particulier qui ont pris du mercure précédemment sont souvent prêts à tomber dans la salivation en l'employant à très-petite dose , quoique peut-être dans la maladie précédente ils n'en eussent pas éprouvé le même effet.

On a aussi recommandé une multitude de remèdes à prendre , soit séparément , soit combinés avec le mercure , pour l'empêcher de se porter à la bouche , ainsi que pour arrêter la salivation lorsqu'elle est établie. Les principaux sont le soufre ordinaire , le soufre d'antimoine , le camphre , le quinquina & le fer. Cependant, moyennant l'observance exacte des règles que je viens de prescrire , je pense qu'il n'est pas très-difficile , en général , d'éviter la salivation , sans avoir recours à aucun de ces remèdes.

Je les conseillerois sur-tout d'autant moins , que j'en ai vu quelques - uns appliqués à plusieurs reprises par d'autres Praticiens, sans aucun succès. Pour ce qui est du dernier point : savoir , de calmer & dissiper la salivation lorsqu'une fois elle a commencé , c'est quelquefois une chose très - difficile. On peut néanmoins éprouver beaucoup de succès de la méthode qui suit , & de l'observance exacte des règles que j'ai prescrites ci-dessus.

Aussitôt que le malade sent sa bouche affectée , il doit cesser l'usage du mercure , & rester chez lui dans une chambre modérément chaude si la saison est froide. Si ses forces & sa constitution le permettent , on peut lui donner un doux laxatif. Mais il faut être circonspect à prescrire des cathartiques , parce qu'ils procurent souvent des diarrhées que l'on a quelquefois beaucoup de peine à arrêter , & qui peuvent avoir des suites dangereuses. Il faut aussi placer tous les soirs le malade dans un bain chaud , s'il peut le supporter , & le frotter en même-tems avec une brosse ou avec un morceau de flanelle ; & au sortir du bain , il doit se revêtir avec de la flanelle. S'il éprouve des

symptomes inflammatoires, il faut le mettre à une diete légère , & lui faire boire de l'eau d'orge , ou quelque'autre décoction mucilagineuse. Mais si ses forces sont épuisées , un bon régime nourrissant , avec l'usage du vin , une infusion de quinquina dans le vin ou dans l'eau de canelle , & l'air libre de la campagne sont certainement les moyens les plus convenables. Lorsque les canaux salivaires sont très-relâchés , & que le crachement continue sans diminution , on peut prescrire avec les précautions nécessaires , un gargarisme astringent , composé avec une décoction de quinquina , ou d'écorce de faule blanc dans le vin rouge ou dans l'eau , & l'on peut , selon les circonstances , y ajouter de la teinture de gomme lacque ou de myrrhe. Si l'air est sec , le malade ne doit pas se confiner dans sa chambre , & il peut sortir un peu , à moins qu'il ne fasse grand froid. On peut donner aussi , au besoin , du soufre ordinaire , soit seul , soit joint à quelque purgatif rafraichissant. On a recommandé , en pareil cas , le soufre d'antimoine , comme diaphorétique. Un Médecin de réputation a proposé l'or fulminant , donné tous les jours , à la dose de

294 OBSERVATIONS PRATIQUES

trois à cinq grains , comme un remede très-efficace pour arrêter la salivation. Mais comme je n'ai jamais eu occasion d'essayer moi-même ce remede , je suis hors d'état de dire si son avis est fondé sur l'expérience , ou seulement sur une théorie établie sur l'affinité chymique ou attraction élective qui est entre le mercure & l'or. Dans un ptyalisme invétéré , un vésicatoire , un séton ou un cautere au col , ou le liniment volatil appliqué à la gorge , sont quelquefois fort utiles : & dans les cas désespérés , on peut essayer aussi de jetter de l'eau froide sur la tête & sur le visage du malade , en tenant en même - tems le reste de son corps plongé dans un bain chaud.



C H A P I T R E X I V.

Pourquoi certaines AFFECTIONS VÉNÉRIENNES ne cedent pas au MERCURE.

VOICI les raisons que les observations pratiques m'ont fournies pour expliquer comment le mercure manque quelquefois de guérir les affections vénériennes. Cela tient, 1°. au mercure & à ses préparations; 2°. à la maniere de l'administrer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; 3°. à la plus ou moins grande irritabilité, ou au plus ou moins de force constitutionnelle du malade, ou aux fautes qu'il peut avoir commises; 4°. à la nature de la maladie même. Je traiterai de ces différentes causes dans le même ordre.

Depuis l'usage de l'onguent mercuriel en frictions: ce qui est la première & l'unique méthode qu'on ait employée dans le seizième siècle; on a découvert & essayé plusieurs autres préparations à l'intérieur & à l'extérieur, tant pour guérir les maladies vénériennes qui ne cédoient pas aux frictions, que dans la vue d'opérer la guérison

d'une manière plus prompte ou moins incommode. Je me dispenserai de faire ici des réflexions sur la préférence que quelques-unes de ces méthodes peuvent prétendre sur les autres , & je me bornerai uniquement à examiner pourquoi les frictions mercurielles , ainsi que d'autres préparations du mercure , sont quelquefois sans effet contre certaines affections vénériennes. Mais je ferai auparavant quelques observations sur ces préparations.

J'ai vu un nombre de personnes attaquées de gonorrhées invétérées , de chancres , de douleurs & caries dans les os , d'éruptions cutanées, de dartres, d'exulcérations au nez , à la gorge , &c. d'excroissances condylomateuses ou verruqueuses en différentes parties du corps , mais sur-tout autour de l'anüs & aux parties génitales , qui sembloient résister obstinément au pouvoir du mercure ; & ces symptômes bien loin d'être dissipés après une salivation copieuse & désagréable , étoient plutôt augmentés par cette évacuation ; ou s'ils étoient guéris, ils reparoissoient souvent peu de tems après.

Après un examen très-attentif , j'ai trouvé qu'il falloit chercher très - souvent dans le

remède même les causes de cette difficulté, & qu'elles consistoient en ce que 1°. il étoit mal préparé ou mal indiqué pour guérir la maladie ; 2°. il n'étoit pas donné en suffisante quantité, ou continué pendant assez long-tems ; 3°. il étoit administré en trop grande quantité, & par cette raison, il excitoit la salivation, les sueurs ou le dévoiement, sans détruire le virus vénérien ; ou enfin, 4°. il étoit mêlé avec d'autres substances propres à détruire son efficacité.

Le grand point dans le traitement de la maladie vénérienne par le mercure étant d'introduire dans l'économie la quantité de mercure qu'il faut pour déraciner totalement le virus vénérien, il est évident que des remèdes mercuriels mal-adroitement ou négligemment préparés doivent avoir de très-mauvais effets. Ainsi, par exemple, si on a mêlé de l'arsénic avec le sublimé corrosif, pour le rendre plus blanc & lui donner une plus belle apparence, ou si l'on a combiné le mercure coulant avec des substances incapables de le tenir suspendu, ou si lorsqu'on l'a mis en pilules on ne l'a pas assez long-tems trituré pour qu'il se trouve également distribué dans toute la

masse pilulaire , ses effets ne peuvent être que précaires. Dans le dernier cas , une pilule peut contenir trois grains & plus de mercure , & une autre n'en contenir qu'un grain , & peut-être point du tout. Alors la dernière ne produira point d'effet , tandis que la première peut faire éprouver au malade des tranchées & une diarrhée des plus violentes.

Nous pouvons remarquer ici qu'une préparation mercurielle est toujours mal adaptée à son objet , toutes les fois qu'elle est incapable d'entrer dans l'économie , ou qu'après avoir pénétré dans la circulation , elle excite la salivation avant d'avoir détruit le virus ; & c'est une erreur de croire qu'au moyen de la salivation , tout le virus soit toujours évacué , & que par conséquent la maladie soit radicalement guérie ; car c'est précisément le contraire. Il est vrai que lorsqu'on fait saliver un malade , il trouve souvent que tous les symptômes disparaissent , & il est induit à se croire guéri. Mais quelquefois au bout de quelques mois , ou même de peu de semaines , ses maux reparoissent avec plus de violence. Je ne nie cependant pas que la maladie vénérienne ,

sur-tout si elle est légère , ne puisse être radicalement guérie par ce moyen ; mais je soutiens, d'après des observations réitérées dans la pratique particulière , aussi-bien que dans celle des hôpitaux , que le Praticien ne peut jamais être certain d'une guérison réelle dans ce cas , & que par conséquent la salivation n'opere que des cures douteuses , & souvent tout-à-fait manquées. Mais j'ai déjà traité ce sujet plus complètement dans le chapitre *des préparations mercurielles en particulier* , à l'article de la *salivation*.

La principale remarque qu'il y ait à faire ici , est que pour être assuré de bien guérir ses malades , tout Praticien qui a leur santé à cœur , & qui n'administre pas des remèdes au hasard , ne doit jamais faire usage d'aucune préparation ou composition mercurielle qu'il n'ait pas préparée lui-même , ou du moins pris soin de faire préparer par quelque personne dont il connoisse l'exactitude & l'intégrité. Les inconvéniens fréquens que j'ai éprouvés moi-même à cet égard , & que j'ai vu arriver aux autres , m'ont rendu scrupuleusement exact sur ce point.

On doit aussi avoir attention à ne pas

300 OBSERVATIONS PRATIQUES

employer des préparations mercurielles combinées avec d'autres remèdes , parce que quelquefois ces remèdes nous font échouer , & souvent ils rendent le traitement moins sûr & plus ennuyeux. J'en ai vu plusieurs exemples relativement aux pilules de Plummer , & j'ai entendu faire la même remarque à des Praticiens d'une exactitude & d'une habileté peu communes.

On ne doit jamais donner des préparations mercurielles âcres lorsqu'on peut opérer la guérison par des moyens plus doux. Les terribles effets que produisent ces drogues , sur-tout le sublimé corrosif , & dont j'ai plus d'une fois été témoin , m'obligent d'insister avec la plus grande chaleur sur ce précepte. Les effets constans de ces compositions âcres , sur-tout dans les personnes de complexion délicate , sont des douleurs à l'estomac & aux intestins , la perte de l'appétit , des tranchées violentes , des diarrhées , & quelquefois des coliques dangereuses ; ou si elles entrent dans le torrent de la circulation , elles excitent des crachemens de sang , des convulsions , des fièvres nerveuses , & d'autres maux plus funestes que ceux qu'elles étoient destinées

à détruire ; ou bien elles excitent une salivation qui empêche qu'on n'en continue l'usage assez long-tems pour compléter la cure. Si on les administre quelquefois , comme cela peut de tems-en-tems être nécessaire , dans des affections vénériennes cutanées , ou dont le siege est profond , on doit examiner avec soin la complexion du malade ; & si elle les admet , commencer par de très - petites doses , afin d'éviter les accidens dont je viens de faire mention , & particulièrement la diarrhée : car lorsqu'elle s'établit , le mercure au lieu d'entrer dans la masse des humeurs , est entraîné dehors par les selles , & tourmente ainsi mal-à-propos le malade , sans lui procurer aucun soulagement. Il faut donc apporter toujours la plus grande attention dans le choix & dans l'administration des préparations mercurielles ; appliquer , dans chaque cas , celle qui paroît s'accorder le mieux avec le tempérament du malade ; ne jamais insister obstinément sur l'usage ou sur la dose d'une préparation qui excite de mauvais symptômes dans le corps , & ne pas suivre l'exemple de ces Charlatans , dont les connoissances se bornent à un arcane , qu'ils donnent indis-

tinctement à tous leurs malades, dans toutes les especes de mal vénérien , & qui prononcent qu'ils sont guéris dès que les symptomes de la maladie ont disparu : assertion à laquelle on ajoute foi d'autant plus facilement , que la plupart des jeunes gens n'aiment pas à être renfermés ou gênés pendant un tems un peu long. Aussi pour un malade qu'ils peuvent guérir de tems à autre , ruinent - ils la constitution au plus grand nombre , & rendent - ils communément la maladie plus opiniâtre & plus rebelle dans la suite. En effet , le virus demeure assoupi pendant des semaines , des mois , & même quelquefois des années ; mais enfin il éclate avec plus de fureur , & produit souvent des symptomes & des maladies, dont on peut à peine deviner la nature, sur-tout chez les personnes du sexe, & qui , dans cet état, éludent les efforts de l'art ; car plus les maladies vénériennes sont anciennes , plus elles résistent au pouvoir spécifique du mercure.

Je vais examiner maintenant la troisieme cause qui empêche quelquefois le mercure de guérir la vérole , & qui tient à la constitution du sujet. On rencontre quelque-

fois , sur-tout parmi les personnes du sexe , ou parmi celles qui ont pris du mercure pour des affections vénériennes passées, des malades dont la constitution est devenue si irritable , qu'après qu'on leur a administré quelques grains de mercure à l'intérieur , ou quelques frictions , ils sont affectés d'une fièvre nerveuse , de spasmes , de douleurs de tête, ou bien ils tombent très-facilement dans la salivation dès le second ou le troisième jour. C'est sur-tout dans ces constitutions qu'on doit être singulièrement attentif à chercher la préparation & la dose qui conviennent le mieux. Il est quelquefois très-avantageux , en pareil cas , d'ajouter au mercure ou le quinquina ou quelque'autre tonique végétal. Si l'on néglige ces précautions , on exposera certainement beaucoup de malades de cette classe à souffrir pendant toute leur vie , sans pouvoir jamais obtenir une guérison radicale.

Il est bon de dire un mot d'une particularité à laquelle on a fait communément fort peu d'attention jusqu'ici. La plupart des Auteurs & des Praticiens tiennent leurs malades vénériens , sans aucune distinction , à une diète légère , tant pour les alimens

que pour la boisson , pendant le traitement mercuriel. Cette règle est cependant très-mauvaise , lorsqu'elle est générale , dans tous les cas. Une pareille diete est très-convenable pour des constitutions fortes & vigoureuses ; mais pour celles qui sont foibles , délicates ou irritables , elle seroit extrêmement défavorable. Il faut leur prescrire un régime nourrissant , avec l'usage modéré du vin , sans quoi le mercure n'exerce aucune action sur le virus , quoiqu'il produise de très-mauvais effets sur la constitution. Le bain chaud est quelquefois d'un grand secours dans ces occasions.

La nature coopere facilement avec le mercure dans certaines constitutions , au lieu que dans d'autres elle n'agit que peu ou lentement & avec difficulté. Mais indépendamment de ces particularités dans les constitutions , l'on observe souvent que les malades concourent à prolonger & aggraver leurs maladies , en essayant de se guérir eux-mêmes , ou en s'adressant à des Empiriques ou à des gens ignorans dans l'art de guérir. Ils se nuisent aussi fréquemment en n'observant pas le régime , ou en ne faisant point usage des remèdes de la manière qu'on

qu'on leur a prescrite , ou en ne les continuant pas assez long-tems , & les quittant aussitôt que les symptomes ont disparu ; en s'exposant imprudemment à une atmosphère froide & humide , sur-tout de nuit ; ou en devenant impatiens & inconstans , en consultant toujours quelque nouveau Médecin , & ne faisant usage d'un remède que pendant quelques jours ou quelques semaines , pour passer ensuite à un autre. Toutes ces différentes circonstances sont très-capables de rendre les affections vénériennes extrêmement opiniâtres.

C'est dans la maladie même qu'il faut chercher la cause qui empêche le mercure de guérir , lorsque le malade , pour avoir pris précédemment du mercure en trop grande quantité , ou sans précaution , peut à peine en supporter quelques grains , ou quelques frictions , sans tomber dans la salivation. Si , dans ce cas , l'on abandonne l'usage du mercure , le malade ne peut se débarrasser de son mal ; & si on le continue , on est sûr de causer un ptyalisme pénible , qui dure quelquefois des semaines ou des mois entiers , qui expose le malade à des suites dangereuses , & souvent laisse la

maladie principale sans guérison. J'ai indiqué en plusieurs endroits dans les chapitres précédens ce qu'on peut faire dans ces circonstances ; mais il arrive bien souvent que l'on n'est trompé dans son attente sur le mercure , que parce qu'on est dans l'erreur sur la nature de la maladie , & parce qu'on regarde comme vénériennes des affections qui sont souvent dûes aux effets du mercure même , ou à des dérangemens , qui quoique originairement produits par le virus vénérien , ont dégénéré , soit par le laps de tems , soit par d'autres causes , en des maladies d'une nature toute différente , pour lesquelles le mercure , loin d'être un remède salutaire , est devenu un vrai poison. J'ai déjà parlé de ces maladies , & j'en parlerai davantage ci-dessous.



CHAPITRE XV.

*Des autres REMÈDES qu'on a recommandés
pour la guérison de la VÉROLE.*

INDÉPENDAMMENT des frictions , des fumigations & de l'usage interne des différentes préparations mercurielles , on a recommandé plusieurs autres remèdes , soit pour guérir les différentes affections vénériennes sans se servir du mercure , soit pour aider celui-ci dans son opération ; & comme il y a plusieurs exemples de cas où le mercure manque de guérir , ou expose les malades à des accidens fâcheux , on a cherché un remède qui , sans avoir aucune des qualités nuisibles du mercure , en eût tout le pouvoir & toutes les bonnes qualités. J'ai pris la peine d'analyser la plupart des arcanes qu'on vend pour cet objet , & qu'on annonce comme de simples préparations végétales , & j'ai trouvé qu'ils ne sont autre chose que quelque-une des préparations mercurielles qu'on a pris soin de déguiser. On a proposé , comme propres à suppléer au mercure pour la guérison de la maladie

vénérienne, plusieurs autres remèdes qui , à ce qu'on nous dit , ont été employés pour cet effet avant qu'on se servît du mercure ; & qui , suivant des témoignages dignes de foi , sont encore employés , même à présent , sans aucune addition de mercure , & avec les plus grands succès contre cette maladie , dans l'Amérique , tant méridionale que septentrionale. Ceux d'entre ces remèdes que j'ai vu employer pour le même objet en Europe , n'ont jamais produit l'effet désiré , du moins dans aucun des cas que j'ai eu l'occasion d'examiner , & je ne connois aucun exemple de vérole confirmée qui ait été guérie par ce moyen. Il en est cependant quelques-uns qui sont dignes de notre attention , & qui méritent certainement des épreuves plus exactes que celles qu'on a faites jusqu'ici pour en constater les vertus. Je parle de ceux qui sont recommandés par des Savans en état de bien observer. Les habitans de l'Amérique septentrionale guérissent la maladie vénérienne aussi efficacement & aussi radicalement que nous pouvons le faire avec le mercure , au moyen de la racine de la *Cardinale syphilitique* (*Lobelia syphilitica. Linn.*) , comme

nous en a instruits le Docteur Kalm, & plus exactement ensuite M. Bartram (1). Ils prennent une poignée de cette racine fraîche, ou sèche, ce qui vaut mieux, à ce qu'il dit; ils la lavent & la font bouillir dans six pintes d'eau. Le malade boit chaque jour une pinte de cette décoction dans le commencement, si sa constitution peut la supporter, & il augmente la dose par degrés, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus soutenir la purgation qu'elle excite. Alors il en suspend l'usage pendant un jour ou deux, pour le reprendre, s'il le faut, jusqu'à ce qu'il se trouve parfaitement bien : ce qui a lieu pour l'ordinaire en quinze jours. Lorsqu'il y a quelque affection extérieure, ils lavent avec cette même décoction les parties affectées. Si la maladie est très-opiniâtre, ils mêlent avec la *Lobelia*

(1) Ce dernier Auteur conseille de faire prendre au malade un demi-septier de la décoction de cette racine, trois fois par jour, l'estomac étant vuide, & d'augmenter la dose suivant les forces du malade, en lui faisant prendre des bains chauds, dans le même tems, & le tenant à un régime convenable. Il faut prendre garde à ne pas employer la *Lobelia longiflora* au lieu de la *Lobelia syphilitica*, parce que la première est de nature beaucoup plus âcre que la dernière.

Il y a maintenant quelques parties de l'Italie où le Gouvernement a fait une loi de ne plus se servir de mercure dans les hôpitaux pour le traitement de la maladie vénérienne.

la racine de *Ranunculus abortivus*, mais en petite quantité , à cause de son acrimonie. Pour consolider les ulcères vénériens , ils font sécher la racine de *Benoite aquatique* (*Geum rivale. Linn.*), & les en saupoudrent. Ils guérissent aussi les ulcères profonds & putrides , en y appliquant l'écorce intérieure du *Ceanothus americanus*.

On a beaucoup vanté dans ces derniers tems les tiges de *Douce-amere* (*Solanum dulcamara. Linn.*) en décoction, & les racines de *Lauréole* (*Daphne mezereum. Linn.*), & de *falsépareille* , tant en substance qu'en décoction , pour le traitement des maladies vénériennes opiniâtres ; mais on n'a point encore déterminé jusqu'à quel point ces remèdes pourroient réussir dans les cas où l'on n'auroit pas déjà fait usage du mercure.

On vante dans l'Amérique méridionale & dans les Indes orientales la décoction des bois de *gayac* , de *fassafras* , &c. comme un remède qui suffit seul pour guérir avec facilité la vérole la plus confirmée. Il se peut que ces bois guérissent les maladies vénériennes entre les tropiques & dans les climats les plus chauds de notre globe ; mais en Europe j'ai vu qu'ils nuisent quelquefois , & pro-

duisent des sueurs immodérées , des crachemens de sang , des phthysies , &c. dans les tempéramens grêles & délicats ; & je n'ai jamais vu un seul cas où ils aient opéré une guérison radicale.

On prétend que la formule suivante est employée avec beaucoup de succès dans le Brésil , en Portugal , & dans d'autres contrées, sous le nom de *decoctum Lusitanicum*, ou *tisane de Lisbonne*.

Prenez racines de falsepareille , fantaux blanc & rouge , de chaque trois onces ; réglisse, mezereum, de chaque demi-once ; bois de Rhodes , gayac , saffrafras , de chaque une once ; antimoine crud , cinq onces : versez sur ces drogues dix livres d'eau bouillante ; faites infuser pendant vingt-quatre heures , & ensuite réduisez par l'ébullition à cinq livres. Passez & exprimez. La dose est depuis trois chopines jusqu'à deux pintes par jour.

Mais c'est , comme je l'ai dit plus haut , encore un problème de savoir jusqu'à quel point ces remèdes agissent sans le concours du mercure. La vérole est certainement plus facile à guérir dans les climats chauds , lorsqu'elle est bien traitée , que dans les climats

froids. Quant aux remèdes que nous voyons tous les jours annoncés par des Empiriques ou de prétendus possesseurs de secrets , comme ne contenant point de mercure , & guérissant radicalement la maladie vénérienne , ce ne sont , pour la plus grande partie , comme nous l'avons dit , que des préparations mercurielles déguisées ; & c'est , selon moi , un grand bonheur pour les malades quand ces remèdes ne leur sont qu'inutiles.



CHAPITRE XVI.

*De certaines AFFECTIONS VÉNÉRIENNES
qui exigent un traitement particulier.*

I. De L'OPHTHALMIE VÉNÉRIENNE.

IL y a deux especes distinctes d'ophthalmie vénérienne. L'une paroît avoir la marche des maladies chroniques ; elle avance par degrés , & provient de l'infection de la masse générale. L'autre est la plus aigue , la plus violente & la plus dangereuse de toutes les ophthalmies que je connoisse. Elle arrive subitement , & doit son origine , autant que j'ai pu l'observer , à la répercussion soudaine d'une gonorrhée vénérienne récente. Voyez l'article de la *gonorrhée vénérienne*.

J'ai vu trois exemples de cette terrible maladie , & dans tous le malade a perdu la vue. Dans deux de ces cas , les deux yeux furent frappés à la fois. Dans le troisieme , il n'y eut d'abord qu'un œil affecté ; mais quelques années après , la vue se perdit aussi dans l'autre , & , à ce qu'il parut , sans cause sensible. Tous les vieux Praticiens avec les-

quels j'ai conféré sur cette redoutable maladie, & qui l'ont observée plusieurs fois dans leur pratique, étoient d'opinion qu'elle doit son origine à une gonorrhée récente répercutée par voie de métastase. Dans les trois cas dont je viens de parler, cette maladie étoit certainement accompagnée de la suppression d'une gonorrhée ; mais je n'ai pu déterminer avec certitude si cette suppression étoit la cause de l'ophthalmie, & je puis encore moins expliquer une pareille métastase, quoique ce soit une chose connue qu'il existe une grande connexion entre les yeux & les parties de la génération.

Mais quelle que puisse être la cause de ces ophthalmies, voici le fait : dans les trois cas que j'ai eu l'occasion d'observer, cette maladie parut en hiver, dans un climat froid, après que les malades, qui étoient attaqués d'une gonorrhée récente, se furent exposés à un froid rigoureux en plein air. Aucun n'avoit eu auparavant le moindre mal aux yeux. L'écoulement par l'uretré fut évidemment diminué ou supprimé. Dans le même tems il s'établit une évacuation de matière puriforme, de couleur verte-jaunâtre, sem-

blable à celle d'une gonorrhée , par les yeux, avec des douleurs déchirantes, qui devenoient insupportables au moindre contact de la lumiere. La même matiere qui découloit des yeux paroissoit extravasée dans toute la chambre antérieure de l'œil, & comme infiltrée entre les lames de la cornée transparente. Tous les remedes qu'on employa furent sans effet , & la maladie se termina par un aveuglement perpétuel.

Comme des cas de cette espece peuvent être instructifs , je vais en transcrire un de mon journal. Le malade étoit un jeune homme de 29 ans, qui servoit à l'armée en qualité de Capitaine. Il fut commandé pour monter la garde dans le mois de Janvier, pendant qu'il étoit affligé d'une violente gonorrhée. Malheureusement la journée étoit excessivement froide, & il fut forcé par devoir de rester exposé à l'air tout le jour & le soir. Dans la nuit suivante, il fut attaqué des douleurs les plus vives aux deux yeux à la fois, & il ne put supporter la lumiere en aucune façon. Le lendemain cet accident fut accompagné d'un écoulement de matiere puriforme par les deux yeux. A l'inspection, l'albuginée parut

316 OBSERVATIONS PRATIQUES

enflammée & fort enflée. Le Médecin qui fut appelé ordonna, outre les remèdes généraux, comme saignées, purgatifs, &c. une fomentation de ciguë. Le troisième jour, en examinant les choses de plus près, on trouva la cornée entièrement opaque & un hypopyon formé; il ne paroissoit point d'exulcération. On continua l'usage de la ciguë. Quelques jours après, l'inflammation se calma, & l'écoulement fut tari. Mais la cornée ne recouvra pas sa transparence. Elle étoit extrêmement épaissie; & le malade demeura entièrement aveugle. Je vis clairement dans ce sujet les artères de la cornée transparente venant de l'albuginée, enflammées & aussi remplies de sang rouge que si elles eussent été injectées comme une préparation anatomique; & elles étoient encore ainsi dans la cinquième semaine de la maladie.

Dans aucun de ces trois cas, les Praticiens n'appliquèrent des remèdes pour rétablir l'écoulement de la gonorrhée, & l'on ne fit point d'incision à la cornée pour évacuer la matière extravasée; ce sont cependant les deux principaux moyens dont j'attendrois quelque soulagement réel dans une pareille

ophthalmie, indépendamment des évacuations générales & locales par les purgatifs, les sangsues, les vésicatoires, &c. & de l'usage du mercure, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

J'ai été quelquefois tenté de croire que cette espece d'ophthalmie peut être occasionnée par la mal-propreté, lorsqu'un malade affecté de gonorrhée ou de chancres aux parties génitales, touche ces parties & ensuite ses yeux avant de s'être lavé les mains, & j'ai certainement vu plus d'une fois des ophthalmies, & des ulceres vénériens aux paupieres, aux narines, aux levres, provenir d'un pareil défaut d'attention. Mais dans ces cas je n'ai observé d'inflammation qu'à un oeil ; elle n'étoit jamais aussi violente que celle dont je viens de parler, & elle cédoit, comme les ophthalmies que produit l'infection de la masse générale, à l'application topique de l'onguent bleu, qui joint avec l'usage du mercure à l'intérieur est, dans le fait, un remede souverain pour ces ophthalmies.

Les ophthalmies vénériennes qui proviennent de l'infection de la masse générale sont extrêmement rebelles dans bien

318 OBSERVATIONS PRATIQUES

des cas , pendant des semaines & des mois entiers. Elles exigent un traitement mercuriel régulier , sur-tout avec le sublimé corrosif , si le malade peut le supporter ; des purgatifs réitérés ; & dans quelques cas , sur-tout si la paupiere est la partie affectée , l'usage externe de l'onguent mercuriel ; ou ce qui , suivant les observations du Docteur Cullen , est préférable , l'onguent citrin qu'on a trituré avec le double de graisse de porc pour le rendre moins âcre. Le laudanum versé dans l'œil affecté procure quelquefois le soulagement le plus marqué. Il est avantageux aussi de baigner l'œil cinq à six fois par jour dans une dissolution étendue de sublimé corrosif.

II. *De la SURDITÉ VÉNÉRIENNE.*

J'ai vu plusieurs exemples de surdité & de violentes douleurs dans l'oreille , produites par des ulcères vénériens qui affectoient l'orifice des trompes d'Eustache dans l'arrière-bouche. Mais j'ai rencontré un cas dans lequel une surdité complete fut la suite d'une gonorrhée supprimée par l'usage intérieur de la térébenthine. Le malade n'avoit

ni chancres ni aucune autre affection vénérienne.

III. *Des MAUX DE GORGE VÉNÉRIENS.*

Il faut distinguer avec soin, comme nous l'avons dit plus haut, les maux de gorge vénériens aussi-bien que les ulcères vénériens de la bouche & du gosier, des ulcères scorbutiques, ou de ceux qui doivent leur origine à l'acrimonie que le mercure a communiquée à la salive ; & particulièrement de ceux qui quoique réellement vénériens dans leur origine, ont depuis changé de nature & pris un caractère tout-à-fait différent. Car si l'on continue l'usage du mercure dans des cas pareils, on peut nuire au malade essentiellement & quelquefois d'une manière irréparable. Le jugement pratique est le seul guide assuré dans ce cas. On risque peu, selon moi, de s'égarer en traitant comme vénériens les ulcères profonds qui sont couverts d'une croûte blanche couenneuse, & terminés par un bord dur & relevé avec une rougeur intense tout autour.

Les ulcères vénériens sont quelquefois tellement situés, ou si avant, dans la gorge, qu'il n'est pas facile de les découvrir à la

premiere vue, & cela peut quelquefois induire en erreur sur la nature de la maladie. L'histoire des deux cas suivans pourra être utile aux jeunes Praticiens.

Un homme âgé de 55 ans, de constitution forte, pléthorique, fut attaqué d'un mal de gorge avec fièvre. Le Médecin, après avoir examiné sa gorge, & tâté son pouls, ordonna la saignée avec un gargarisme & un purgatif antiphlogistique. La maladie n'étant pas diminuée huit jours après, on appella un autre Médecin, qui réitéra la saignée, la purgation, & ordonna un gargarisme différent, dont le malade parut se trouver mieux. Au bout de sept semaines, ce malade sentant, comme il disoit lui-même, que sa maladie n'étoit pas tout-à-fait guérie, je fus consulté. Après qu'on m'eut montré les premières ordonnances, j'examinai sa gorge, & quoique je n'y pusse découvrir aucun ulcere, je lui dis que je soupçonnois une cause vénérienne; il eut de la peine à être de mon avis, & me rapporta qu'il n'avoit eu depuis plusieurs années aucune affection vénérienne, & qu'il avoit joui de la plus parfaite santé dans cet intervalle. Je demandai à examiner encore

une

une fois sa gorge. Il y consentit très-volontiers , quoiqu'il fût de ces personnes dont on ne peut examiner la gorge qu'avec la plus grande difficulté. Tenant donc une bougie d'une main , & comprimant de l'autre avec une large spatule la racine de la langue autant qu'il étoit possible , je découvris très-avant dans la gorge , du côté droit , un ulcere vénérien profond , mais petit , qui avoit échappé à ma vue la première fois , & qui s'y seroit dérobé de nouveau si je n'eusse pas mis une attention aussi particulière à examiner la gorge. Je lui dis la cause évidente de sa maladie ; mon avis fut suivi. Après qu'il eut fait usage du mercure à l'intérieur pendant huit jours , son mal de gorge fut entièrement dissipé ; & l'ayant continué encore un mois , il obtint une guérison radicale.

L'autre malade étoit une dame du haut parage ; elle n'avoit qu'une légère difficulté d'avaler depuis peu de jours , qu'elle attribuoit à un rhume occasionné par le grand froid qu'il faisoit alors. Je découvris sur-le-champ par l'inspection la cause de sa maladie ; & comme les personnes du sexe ont toujours droit à beaucoup de délica-

tesse & de discrétion de la part des Médecins , je lui ordonnai , sans lui faire aucune question , de tenir sa gorge chaudement , & lui promis de lui envoyer un remède qui la guériroit en peu de jours. Je lui fis ensuite continuer le même remède sous une autre forme , & sous quelque nouveau prétexte , pendant quelques semaines , jusqu'à ce que je la jugeasse parfaitement guérie.

L'été dernier , je fus consulté à Paris par un jeune homme d'environ 28 ans , sur un mal de gorge , pour lequel il avoit déjà consulté & pris des remèdes pendant trois semaines , sans éprouver aucun soulagement. Je lui dis qu'à la seule apparence de son visage & de ses yeux , je soupçonnois que sa maladie avoit une toute autre cause que celle que lui ou ceux qui l'avoient traité , s'étoient imaginés. Mon soupçon fut en effet très-évidemment vérifié par un grand ulcère vénérien , que l'inspection me fit découvrir très-profondément au-dessous du voile du palais. Il me donna alors le détail suivant : « qu'étant à Venise deux ans auparavant , il y avoit été attaqué d'une violente gonorrhée , qu'il avoit désiré , par une raison

particuliere , de dissiper ou d'arrêter le plus tôt possible. Qu'il avoit été adressé par un de ses amis à un Chirurgien qui étoit en possession d'une injection infailible pour cet effet. Que ce Chirurgien ne s'étoit rendu à sa demande qu'avec répugnance , & en lui prédisant que quelque tems après la guérison prompte que son injection lui procureroit , la maladie vénérienne feroit explosion dans quelqu'autre partie du corps ; l'assurant qu'il avoit vu son remede produire le même effet chez plusieurs autres malades qui s'étoient adressés à lui de la même maniere. Qu'il avoit négligé cet avertissement ; que l'écoulement avoit été parfaitement arrêté en quarante-huit heures , & qu'il n'y avoit plus pensé , s'étant toujours trouvé depuis parfaitement exempt de maladie vénérienne , ainsi que de toute autre ». Ce cas fut très-instructif pour moi. Il montre que le virus vénérien peut demeurer long-tems caché dans la masse générale , sans produire aucun effet sensible ; il confirme évidemment ce que j'ai avancé plus haut sur l'identité du virus gonorrhœique avec celui de la vérole , & sur la conformité des effets qu'ils produisent lors-

qu'ils sont absorbés dans la masse des humeurs. Mais enfin il montre aussi ce que je n'aurois pas présumé *à priori* : savoir, qu'une gonorrhée récente peut quelquefois être arrêtée ou répercutée, sans produire la tumeur des testicules, l'ischurie, les rétrécissemens de l'uretre, ou d'autres effets immédiats dans la masse générale.

Les ulcères vénériens de la gorge exigent quelquefois, indépendamment du traitement mercuriel, des applications topiques : telles que des injections ou des gargarismes composés d'une dissolution de sublimé corrosif, mêlée, suivant les circonstances, avec la teinture de mastic, &c. ; mais si les ulcères sont dus à l'acrimonie de la salive, il faut les déterger constamment, & discontinuer l'usage du mercure. S'ils ne doivent leur origine à aucune des deux causes dont je viens de parler, & s'ils sont de cette espèce particulière que j'ai décrite ci-dessus à l'article des *ulcères vénériens*, ils exigent, au lieu du mercure, l'usage des puissans toniques, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

IV. *Des AFFECTIONS VÉNÉRIENNES de la peau.*

Les maladies cutanées de nature vénérienne, telles que les dartres, les teignes, la lepre vénériennes, &c. sont souvent très-opiniâtres. C'est proprement dans ces maladies que la dissolution de sublimé corrosif est excellente ; & je crois avoir observé que souvent il dissipe très-bien la maladie de la peau, sans guérir radicalement la vérole ; c'est du moins ce que je puis affirmer qui arrive dans les climats froids. Quant aux climats chauds, je fais, de science certaine, que beaucoup de malades y ont été radicalement guéris de la vérole par le seul usage du sublimé corrosif.

J'ai vu dans certaines affections vénériennes de la peau, qu'indépendamment de l'usage du sublimé à l'intérieur, on se trouvoit très-bien des bains chauds composés d'une décoction de son, dans laquelle on faisoit dissoudre neuf grains de sublimé corrosif par pinte ; en ayant soin de frotter doucement en même-tems la partie affectée. L'application topique d'une dissolution de sublimé, l'onguent citrin quelque-

fois seul, & quelquefois avec l'addition du saturnin, m'ont réussi dans des maladies du même genre, qui étoient plus rebelles, comme des dartres, teignes, &c. contre lesquelles tous les autres remèdes avoient été sans effet. C'est sur-tout pour ces maladies, aussi-bien que pour les autres affections vénériennes rebelles & invétérées, que le *decoctum lusitanicum*, la décoction des tiges de douce-amère, de la racine de lauréole, & sur-tout de celle de *lobelia syphilitica*, méritent à mon avis beaucoup plus d'attention qu'il n'est d'usage de leur en accorder.

J'ai vu une maladie de la peau, de nature vénérienne, des plus obstinées & des plus invétérées, contre laquelle tous les autres remèdes avoient échoué, guérie par une dissolution de turbith minéral, donnée à de très-petites doses. Quelques Médecins prétendent aussi avoir vu de grands succès de l'usage de l'arsénic. Mais je n'ai jamais essayé de ce minéral, & n'en ai pas la moindre envie.

V. Des EXCROISSANCES VÉNÉRIENNES.

Les excroissances vénériennes qui poussent

à la surface de la peau, & qu'on désigne sous les différens noms de condylomes, fics, marisques, verrues, tubercules, &c. proviennent ou d'une infection immédiate, & dans ce cas on les considère comme des maladies locales qui exigent des remèdes locaux; ou de l'infection de la masse générale, & c'est dans le fait, ce qui arrive le plus fréquemment. Alors un traitement mercuriel en règle les fait disparaître, sans qu'il soit besoin d'y appliquer aucun topique. Mais il est souvent nécessaire de combiner ces deux moyens. On a conseillé d'employer les caustiques en pareil cas; mais je n'ai jamais vu qu'ils aient produit des effets salutaires; & je les ai trouvés au contraire souvent très-nuisibles. On a aussi recommandé l'extirpation, & elle est quelquefois nécessaire; mais j'ai vu plusieurs exemples d'excroissances vénériennes qui, après avoir été emportées à plusieurs reprises, repoussent sans cesse, & revenoient quelquefois plus grosses qu'elles n'étoient au commencement, quoiqu'on eût fait précéder un traitement mercuriel complet. On a proposé pour prévenir cette régénération plusieurs sortes de remèdes; mais

dans tous les cas opiniâtres que j'ai été à portée d'observer, il n'y a eu que deux ou trois de ces moyens curatifs qui aient été administrés avec succès, après toutefois que la masse générale a été parfaitement purifiée. L'un consiste dans les fumigations mercurielles, l'autre dans l'application de la poudre de sabine (*Juniperus sabina. Linn.*) soit seule sous la forme de poudre, soit mêlée avec du précipité rouge sous forme d'onguent. Mon ami M. Plenck a proposé depuis peu une liqueur, sous le nom d'*aqua caustica pro condylomatibus*, dont voici la formule : prenez esprit de vin & vinaigre, de chacun une once & demie ; sublimé corrosif, une drachme ; alun, camphre & céruse, de chaque, une demi-drachme : mêlez.

Il assure avoir obtenu les meilleurs effets de cette liqueur appliquée deux fois par jour avec un pinceau. Je l'ai essayée plusieurs fois, & j'ai trouvé qu'elle répondoit extrêmement bien à mes vues. J'ai observé que dans les cas où il a poussé un grand nombre de petits poireaux autour des parties génitales, la dissolution de sublimé corrosif dans l'eau simple ou dans l'eau

de chaux réussit quelquefois à merveille. Si les verrues ont une petite base, & ne sont qu'en petit nombre, le meilleur remède est une ligature qu'on resserre chaque jour.

J'ai vu un homme qui avoit plusieurs centaines de petites verrues à la partie barbue du menton, & j'appris qu'elles provenoient d'une maladie vénérienne mal traitée.

VI. *De la FOIBLESSE OU IMPUISSANCE VÉNÉRIENNE.*

Cette affection, quoiqu'exempte de danger, est très-alarmante, & rend l'esprit du malade extrêmement inquiet. Je l'ai observée maintefois ; mais d'une manière particulière chez un malade qui, plusieurs mois auparavant, avoit été attaqué d'une gonorrhée violente dont il étoit enfin guéri, après avoir essuyé un traitement ennuyeux & très-mal dirigé. Le seul symptôme qui lui restoit étoit une impuissance totale & un défaut de desir vénérien, qui l'attristoient infiniment. Lorsqu'il me consulta, je jugeai que sa maladie provenoit du virus vénérien, qui lui étoit resté ca-

330 OBSERVATIONS PRATIQUES

ché dans le corps ; & je lui prescrivis un traitement mercuriel , & ensuite des remèdes toniques , avec deux petites cueillerées de liqueur minérale anodine d'Hoffman matin & soir. Je lui ordonnai aussi de se laver le scrotum & le cordon spermatique deux fois par jour avec une cuillerée à bouche de la même liqueur mêlée avec de l'eau. En trois semaines de tems il eut lieu d'être aussi gai que jamais.

VII. *Des DOULEURS VÉNÉRIENNES , DES SPASMES VÉNÉRIENS , &c.*

Tous les malades qui ont été précédemment atteints de la maladie syphilitique , attribuent communément aux restes du virus vénérien , les douleurs fixes ou vagues qu'ils éprouvent de tems à autre ; & ils ont quelquefois raison ; mais il faut observer que ces douleurs si généralement attribuées au virus vénérien reconnoissent fort souvent des causes très-différentes , qu'il faut savoir discerner avec précision , si l'on ne veut pas être exposé à voir souvent échouer les remèdes qu'on donne.

Le mercure administré mal-à-propos produit fréquemment des douleurs semblables

aux douleurs vénériennes. Il est essentiel de distinguer attentivement ces cas dans la pratique ; parce que si la maladie vénérienne n'a pas été radicalement guérie, & que les douleurs proviennent d'une vérole manquée, l'usage du mercure sera nécessaire pour compléter la cure ; quoique les malades soient souvent d'une opinion contraire, qu'ils fondent sur la longueur du tems & sur la quantité de mercure qu'ils ont déjà prise. Au lieu que si le virus vénérien a été radicalement détruit, l'usage du mercure devient évidemment nuisible. Je connois des malades qui ayant fait usage du mercure à plusieurs reprises dans leur jeunesse, se trouvent maintenant affectés des douleurs rhumatismales les plus violentes en différentes parties du corps, toutes les fois qu'ils prennent la moindre quantité de mercure. Les Auteurs qui ont parlé de cette dernière maladie, l'attribuent généralement au mercure qui s'est arrêté dans les os. Il y a bien plus : les annales de la Médecine nous fournissent des exemples de pareils malades, après la mort desquels on a trouvé le mercure rassemblé en globules dans les différentes parties du corps, sur-

tout dans les os & dans leurs cavités. Quelque degré de foi qu'on puisse ajouter ou refuser à ces histoires, il est certain qu'on peut guérir en général, & quelquefois assez facilement, ces fortes de maladies par un régime convenable, par des bains chauds auxquels on joint des frictions, & en administrant en même-tems à l'intérieur de grandes doses des remèdes toniques appropriés, soit seuls, soit unis avec les antimoniaux; mais si ces douleurs, au lieu d'être chroniques, proviennent d'une suppression subite de la transpiration pendant le traitement mercuriel, les remèdes toniques ne conviennent point du tout. Un remède que j'ai trouvé très-efficace dans plusieurs cas très-graves en ce genre, dans lesquels le malade sembloit saisi d'un spasme universel ou *tetanos*, c'est, outre le bain chaud & sur-tout le bain de vapeur, le soufre d'antimoine joint au suc épaissi ou extrait de ciguë (*Conium maculatum. Linn.*), à la dose de quinze grains de chacun par jour. La poudre de Dover est quelquefois un remède très-avantageux dans ce cas, aussi-bien que dans les rhumatismes, moyennant qu'on observe un régime convenable.

VIII. *Des AFFECTIONS VÉNÉRIENNES
des os.*

Les os sont rarement affectés par le virus vénérien , si ce n'est dans des véroles confirmées ou négligées. J'ai vu cependant un malade qui , étant affecté d'un chancre au gland , fut attaqué le cinquième jour après , d'une tumeur considérable dans la partie inférieure du cubitus. En pareil cas , plus la maladie a été long-tems négligée , plus le traitement est long & difficile ; & de toutes les affections des os , la carie ou exulcération de leur surface extérieure , & la corruption de leur partie intérieure sont les plus désagréables , & celles qui procurent le plus d'ennuis.

Dans tous les cas de carie aux os , il faut se souvenir qu'il n'y a point de guérison à espérer jusqu'à ce que le virus soit totalement déraciné de la masse générale. Les remèdes topiques paroissent n'avoir que très-peu d'effet dans ces maladies ; quoiqu'on ait beaucoup vanté l'huile essentielle de saffraas pour cet usage. M. Plenck prescrit une lotion composée avec l'essence de mastic , le sublimé corrosif & le miel

rosat. Il ordonne, outre cela, pour l'intérieur, l'usage du quinquina, du mercure mêlé avec l'assa foetida, & d'une décoction de falsepareille, de lauréole (*Daphne mezereum. Linn.*) & de ciguë. Il assure avoir guéri par le moyen de ces remèdes, plusieurs personnes attaquées des maladies dont je viens de faire mention.

Les exostoses vénériennes, & sur-tout celles qui viennent au milieu du tibia, du sternum, & les tophus dans les os de la tête, causent quelquefois, & sur-tout dans la nuit, les douleurs les plus affreuses. Je n'ai éprouvé dans ces cas aucun bon effet des applications topiques quelconques. C'est ici que l'opium donné à grandes doses & avec persévérance, conjointement avec les préparations mercurielles salines, produit quelquefois d'excellens effets. Mais je ne suis pas assez crédule pour me laisser persuader qu'on ait guéri ces maladies, & d'autres affections vénériennes rebelles, par le seul usage de l'opium, ainsi qu'on nous l'a assuré dans ces derniers tems.

Je n'ai vu aucun exemple de la fragilité extraordinaire des os, dont quelques Auteurs ont parlé, comme procédant d'une

cause vénérienne ; mais il ne sera peut-être pas hors de propos de faire mention d'un cas qui me paroît avoir du rapport avec cet effet. Un homme se cassa le tibia par une chute ; mais , quoique la fracture eût été traitée selon toutes les règles , après qu'il fut resté renfermé près de trois mois , à l'examen on trouva qu'il ne s'étoit point formé de callus , & que l'os cassé étoit presque aussi séparé qu'au commencement. On vint à soupçonner , en consultant & faisant des recherches exactes , l'existence du virus vénérien. On prescrivit un traitement mercuriel , dont le succès fut tel , que , peu de mois après , le malade se trouva parfaitement guéri.



CHAPITRE XVII.

Des MALADIES VÉNÉRIENNES déguisées, telles que phthysies, rhumatismes, fievres, &c.

IL est des sujets qui ayant été précédemment affectés de maladies vénériennes, dont ils ont paru guéris pendant des mois & même quelquefois des années entières, s'amaigrissent ensuite, commencent à tousser, & sont attaqués d'une fièvre hectique & des autres symptômes qui accompagnent la consommation des poumons ou phthysie pulmonaire. On attribue pour l'ordinaire ces affections à d'autres causes, & l'on prescrit des remèdes qui n'ont communément aucun succès. Quelquefois aussi, l'on attribue le mal à la trop grande quantité de mercure dont on a autrefois fait usage. Mais j'ai vu plusieurs exemples de fievres lentes, avec de la toux, & quelquefois avec une expectoration puriforme, qui loin de devoir leur origine à une exulcération des poumons, provenoient d'un virus vénérien caché dans le corps, sans y produire

duire aucun autre symptôme vénérien. D'autres ont fait la même observation. M. Brambilla, premier Chirurgien de l'Empereur regnant, rapporte, dans son *Traité sur le Phlegmon*, un exemple si frappant en ce genre, que je crois devoir le transcrire ici. « On ordonna, dit-il, un électuaire pour un phthylique qui étoit dans une situation désespérée. Par une méprise d'Apothicaire, l'électuaire fut donné à un malade vénérien pour s'en frotter, & le phthylique reçut l'onguent mercuriel au lieu de l'électuaire, pour le prendre à l'intérieur. Celui-ci ne se doutant pas du quiproquo, prit de cet onguent environ la grosseur d'une noix muscade, deux à trois fois par jour; & il fut radicalement guéri de sa maladie, à la grande surprise du Médecin, qui apprit ensuite par hasard de l'Apothicaire comment la chose s'étoit faite ». Ce quiproquo fut certainement très-heureux pour le phthylique; & quoiqu'on puisse encore douter si cette phthysie provenoit d'une cause vénérienne, il est du moins certain qu'elle fut guérie par le mercure. J'ai eu plusieurs malades de cette espèce, que j'ai parfaite-

ment guéris de leur phthysie, en ne leur administrant d'autre remède qu'un traitement mercuriel.

Le Docteur Werlhof & d'autres ont observé des fièvres intermittentes produites par le virus vénérien, ou compliquées avec la maladie syphilitique, & dans ce cas-là le mercure combiné avec le quinquina a fait des merveilles. Peut-être quelques-unes des fièvres que le Docteur Lyson a guéries avec le calomel étoient-elles de ce genre.

Les douleurs rhumatismales vagues, les maux de tête violens & les douleurs des îles, proviennent quelquefois de la même source. J'ai vu guérir au moyen du bain chaud, de quelque préparation saline de mercure, & de la décoction des tiges de douce-amère, des affections de cette espèce, qui avoient résisté à tous les autres remèdes. On a recommandé aussi comme un remède très-efficace pour ces maladies, la décoction de l'une ou l'autre espèce de lauréole (*Daphne mezereum*. Linn. & *Daphne laureola*. Linn.).



C H A P I T R E X V I I I.

*Des Affections VÉNÉRIENNES incurables
par le MERCURE.*

J'AI déjà parlé de la nature & du traitement de ces affections sous les différens articles des *ulceres vénériens*, des *bubons ulcérés*, des *maux de gorge vénériens*, des *maladies de la peau* des *douleurs*, des *caries vénériennes*, &c. enforte qu'il me reste très-peu de chose à dire sur ce sujet.

J'observerai seulement que j'ai trouvé que la plupart de ces affections, sinon toutes, sont susceptibles d'un traitement palliatif, ou même d'une cure radicale; & que le grand point pour atteindre à ce but desirable, tient principalement à la connoissance exacte de leur nature. Cette connoissance exige souvent, à la vérité, un discernement pratique plus délicat qu'on ne l'imagine. Le principal objet est de distinguer avec précision si ces ulcers, caries, éruptions cutanées, ou douleurs, &c. doivent leur origine à un virus vénérien caché dans le corps, ou s'ils sont les effets

du mercure, ou, ce qui est peut-être de la plus grande conséquence, si après avoir été originairement produits par le virus vénérien, ils n'ont pas changé de nature, par le laps du tems ou par d'autres circonstances dont nous ne sommes pas encore assez instruits. Dans ce cas, bien loin que ces symptômes cedent au pouvoir du mercure, il semble les aigrir à tous égards; & si l'on insiste imprudemment sur l'usage de ce remède, il peut enfin devenir funeste au malade. J'ai rapporté sous les articles dont je viens de faire mention, plusieurs exemples frappans qui servent de preuve à ce que j'avance; & ceux de mes Lecteurs qui s'intéressent particulièrement à ce sujet, en trouveront beaucoup davantage dans le *Supplément au Traité des Maladies Vénériennes* de M. Fabre (1). Je vais proposer maintenant les remèdes que j'ai trouvés les plus efficaces contre ces accidens terribles & opiniâtres.

Il faut souvent beaucoup de jugement pour distinguer les maladies produites par le mercure. J'ai vu des malades se plaignant

(1) Imprimé à Paris chez Didot le jeune, quai des Augustins.

de douleurs rhumatismales, de douleurs ostéoscopes, de céphalalgie, de spasmes en différentes parties, de tremblement des extrémités, &c. qu'ils attribuoient à l'énorme quantité de mercure qu'ils avoient prise; & je les ai cependant guéris après un examen attentif, en leur donnant encore du mercure; parce que je me suis bientôt convaincu, que leurs maladies actuelles provenoient de ce que le mercure leur ayant été mal administré, il s'étoit toujours évacué ou par les selles, ou par la salivation, ou par les sueurs immodérées, dans la même proportion qu'on le leur avoit fait prendre; de telle sorte qu'il n'avoit jamais pu exercer son pouvoir spécifique contre le virus existant dans leur corps, quoiqu'ils en eussent pris pendant très-long-tems & en très-grande quantité.

Mais dès que l'on s'est assuré que la maladie n'est pas l'effet du virus vénérien, ou que du moins elle n'est pas disposée à céder au mercure, il faut recourir à d'autres remèdes, au lieu de suivre la routine ordinaire de la pratique en donnant de nouvelles préparations mercurielles. Lorsqu'on

en a déjà essayé deux ou plusieurs inutilement, il faut, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, prescrire aux malades, indépendamment d'un bon régime & de l'air de la campagne, &c. des remèdes toniques ou fortifiants. Je range principalement dans cette classe les antimoniaux, & plus spécialement pour les cas auxquels je fais allusion les martiaux. Mais il ne faut pas croire que j'entende qu'il faut administrer ces remèdes à la dose de quelques grains par jour. Je les prescris à des doses beaucoup plus fortes qu'on n'a coutume de les donner. Les préparations que j'emploie d'ordinaire sont l'antimoine crud, ou le soufre d'antimoine, l'æthiops martial ou le vin chalybé; & plus particulièrement une combinaison du fer avec l'éther vitriolique. Je fais prendre ces remèdes à la dose que la constitution du malade peut supporter, soit seuls, soit, suivant les circonstances, avec la décoction de felsepareille, avec le quinquina, ou avec l'extrait de noix vertes. Il est quelquefois très-utile de donner le soufre d'antimoine uni avec l'extrait de ciguë, & l'on peut y joindre aussi l'usage

des bains chauds & d'une décoction de falsepareille, avec la racine de lauréole (*Daphne mezereum. Linn.*). Quelquefois les bains froids & sur-tout les bains de mer contribuent beaucoup aux succès des remèdes que je viens de proposer. Et lorsque la maladie est opiniâtre, il ne faut négliger d'essayer aucun des remèdes que j'ai recommandés ci-dessus au chap. XIV.

J'ai vu dans plusieurs cas le *decoctum lusitanicum* produire évidemment de bons effets ; mais de tous les remèdes qu'on a vantés jusqu'ici pour les affections vénériennes incurables par le mercure, je n'en ai vu aucun dont les effets puissent égaler ceux d'une décoction dont le Docteur Paullini fait usage. J'ai vu guérir radicalement par le moyen de cette décoction, des ulcères des plus malins & des plus rebelles, des affections cutanées, des tophus, des caries, des douleurs dans les os & dans les autres parties du corps, qui avoient résisté au pouvoir de tous les autres remèdes ordonnés par différens Médecins en différens pays ; & ce qui est encore plus remarquable, la plupart de ces guérisons

344 OBSERVATIONS PRATIQUES

ont eu lieu dans un espace de tems très-court. Mais malheureusement ce remede ne sauroit être d'une utilité générale pour l'humanité , par la raison que personne n'a pu jusqu'à présent déterminer ce Docteur à le rendre public.



C H A P I T R E X I X.

OBSERVATIONS sur quelques préjugés fâcheux ou nuisibles, qui sont généralement répandus au sujet de la MALADIE VÉNÉRIENNE.

IL est des malades imbus de cette opinion : que le virus vénérien , quand il a une fois pénétré dans le corps , ne peut plus en être totalement déraciné. Ils croient en conséquence qu'une personne qui a eu le malheur d'être entièrement infectée , ne peut jamais se regarder comme radicalement guérie. Cette opinion absurde rend très-malheureuses les personnes qui en sont entichées. J'ai vu fréquemment , sur-tout chez les personnes du sexe , ce préjugé empoisonner le bonheur de la vie , non-obstant tout ce que les Médecins pouvoient leur dire pour les convaincre de leur erreur. Le moindre mal de tête , la plus légère douleur rhumatique , ou le moindre petit bouton sur la peau , leur paroissent des preuves certaines de l'existence du virus

vénérien caché dans leur corps & prêt à produire les plus cruels effets. Ces malades sont vraiment dignes de pitié. Il est juste de faire les recherches les plus exactes sur leur état, & de leur donner des soins très-attentifs. Car est-il de situation plus affreuse que celle d'un Être qui est perpétuellement en proie à de pareilles terreurs ? Et si enfin après l'examen le plus approfondi, l'on trouve qu'il ne reste aucun symptôme d'espèce vénérienne, il faut tâcher de détruire leur préjugé, en mettant devant leurs yeux l'exemple d'autres personnes de notre connoissance, ou si les circonstances le permettent, de la leur, qui ayant été affectées autant qu'elles-mêmes, ou peut-être beaucoup plus, jouissent de la plus parfaite santé depuis un grand nombre d'années, sont mariées, & ont des enfans sains & vigoureux.

On doit les mêmes attentions à ceux qui s'imaginent que lorsqu'on a pris une fois du mercure pour la guérison de la vérole, ce remède ne peut la guérir aussi efficacement une seconde fois. On rencontre ces préjugés le plus fréquemment chez les

femmes , quoiqu'ils aient quelquefois aussi de l'influence sur des hommes de constitution mélancolique.

Mais il existe un autre préjugé , qui est non-seulement absurde , mais criminel , & dont les fauteurs mériteroient la plus sévère punition , si l'on pouvoit les prendre sur le fait. Il n'existe que parmi quelques jeunes gens d'un caractère libertin , & qui ont une façon de penser brutale & dissolue. C'est une opinion reçue parmi ces malheureux , que la meilleure manière de se débarrasser d'une chaude-pisse , c'est d'avoir affaire avec une ou plusieurs femmes saines ; & j'ai vu de cette manière des maladies vénériennes propagées en peu de jours chez dix ou douze personnes saines , qui avoient eu le malheur de s'abandonner à quelqu'un de ces misérables ou aux objets de sa brutale cruauté. L'absurdité de cette idée est évidente pour toute personne qui a le sens commun , & la moindre connoissance de la nature & du siège de la gonorrhée ; & dans le cas où cet attentat seroit dicté par le simple préjugé , la plus légère information suffiroit pour le détruire. Mais il est à

craindre que la cause de cette infamie ne gisse plus profondément dans le cœur de ces misérables, & que leur abominable conduite ne soit dictée par la méchanceté, ou par le plaisir barbare qu'ils trouvent à se venger sur des personnes innocentes, des maux que l'imprudence & la débauche leur ont attirés.

F I N.

T A B L E

ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

A.

ACCOUCHEUR attaqué d'ulceres vénériens à la main, pages 139; 179.

ÆTHIOPS MARTIAL, 342.

AIR de la campagne, est utile dans certains cas d'ulceres vénériens, 159; & de bubons ulcérés, 203. Nécessaire pour fortifier, avant de commencer un traitement mercuriel, 218. De la nuit, est dangereux pendant l'usage du mercure, 221. Du midi de l'Europe, n'a rien de particulier pour la guérison des maladies vénériennes, 227. Libre & pur, empêche la salivation, 260; froid & humide, la favorise, 290; enfermé, produit le même effet, *ibid.* De la campagne, est utile dans les ptyalismes opiniâtres, 293; & dans certaines affections vénériennes dégénérées, 342.

ALKALI VOLATIL FLUOR. L'Auteur s'en injecte dans l'uretre, 50. Sert à faire l'*hydrargyrum cinereum* du Docteur Black, 269.

ALUN. En injection, 74; 328.

ANCIENS Grecs & Romains, Il n'est pas prouvé qu'ils

350 TABLE ALPHABÉTIQUE

aient connu la maladie vénérienne, 7. Etoient aussi licencieux que les modernes, *ibid.*

ANTIMOINE CRUD, 311 ; 342.

AQUILA ALBA. *Voyez* CALOMEL.

ARSÉNIC. Sophistique le sublimé corrosif, 274 ; 297.

Moyens de le découvrir, 274. Vanté pour certaines maladies vénériennes, 326. L'Auteur ne se propose pas de l'essayer, *ibid.*

ASSA FÆTIDA, 334.

ASTRINGENS. A l'intérieur dans certains cas d'ulceres, 157 & *suiv.* En gargarisme dans le ptyalisme, 293.

ATROPA. *Voyez* MANDRAGORE.

B.

BAIN CHAUD. Est utile dans la tumeur des testicules, 102. Dans l'ischurie vénérienne, 124 ; 125. Dans certains cas de bubons vénériens, 195. D'eau ou de décoction de son est nécessaire au commencement d'un traitement mercuriel, 215. Dans quel cas on doit le continuer deux fois par semaine, 222 ; 256. Est nécessaire pour prévenir la salivation, 223 ; 290 ; avant de commencer les frictions mercurielles, 252 ; & doit être ensuite réitéré, 253 ; 256. Est utile pour arrêter la salivation, 290 ; 292. Dans quel cas il faut y joindre l'aspersion d'eau froide, 294. Est utile pour favoriser les effets du mercure, 304. Avec du son & du sublimé corrosif, est utile dans les affections vénériennes de la peau, 325. Est salutaire dans certaines véroles dégénérées, 343.

BAIN DE MER. Est avantageux dans les gonorrhées habituelles, 83. Dans certains cas d'ulceres vénériens, 159.

BAIN FROID. Recommandé dans les gonorrhées habituelles, ne produit pas toujours de bons effets, 82 ; 83.

BALSAMIQUES. Sont indiqués dans les gonorrhées habituelles, 83. Ne doivent pas être employés au commencement des gonorrhées, 100.

BARTRAM (M.) a donné la maniere d'administrer la *Lobelia syphilitica*, 309.

BAUME DE COPAHU. Utile dans les gonorrhées habituelles, 83 ; sur-tout pris en grande quantité, 84.

BAUME DE GILÉAD. Substitué à la térébenthine, 264.

BAUME DU CANADA. Substitué à la térébenthine, *ibid.*

BAUME TRANQUILLE. Supplée au Copahu, 84.

BELLET (Sirop de). 241 ; 269.

BENOITE AQUATIQUE. Sert aux Américains pour consolider les ulceres vénériens, 310.

BERNARD (M.) Sondes qu'il a inventées, 128.

BEURRE DE CACAO. Excellent pour faire un onguent mercuriel, 251.

BLACK (le Docteur). Préparation mercurielle qu'il a inventée, 268.

BLENNORRHAGIE. Voyez GONORRHÉE.

BOIS DE RHODES. 311.

BOL D'ARMÉNIE. En injection, 74.

BOUGIES. Sont utiles dans les gonorrhées habituelles, 79.

Remarques sur leur usage, *ibid.* & *suiv.* Dans la rétention d'urine, 153 & *suiv.*

BRAMBILLA (M.) Son observation sur des ulceres non vénériens, 149. Son observation sur un bubon gangréneux, 196. Fait l'histoire d'un quiproquo intéressant, 337.

BUBONS VÉNÉRIENS. Leur siege, 172. Leur division, relative à leur cause, en idiopathiques & sympathi-

352 TABLE ALPHABÉTIQUE

ques , 173. Celle en primitifs & secondaires est inutile dans la pratique , *ibid.* Les idiopathiques doivent leur origine à l'absorption du virus provenant d'une excoriation ou exulcération , 174. Et quelquefois d'une contagion immédiate , *ibid.* & *suiv.* Les sympathiques se dissipent spontanément , 180. Préjugés sur le traitement des — , 181 & *suiv.* Il est plus avantageux de les résoudre que de les laisser suppurer , 182 ; 187 ; 189. Méthode curative , 190 & *suiv.*

C.

CALOMEL. Est inutile dans les gonorrhées ordinaires , 63. En injection , est utile dans les gonorrhées habituelles , 74. Suspendu dans l'eau de chaux , en topique pour les ulcères vénériens , 158. En injection pour les ulcères de la matrice ou du vagin , 161. Pour le phymosis , 167. Observation de M. Brambilla sur son usage , 196. Incertitude de sa préparation & de sa manière d'agir , 274 ; 275. Manière de le préparer suivant M. Scheele , 275 & *suiv.* Est excellent comme purgatif & pour l'usage extérieur , 281. Donne à l'eau de chaux la couleur noire , 282. Est un des ingrédients de la poudre de Plummer , 283. Objet qu'on s'est proposé en le combinant avec le soufre d'antimoine , *ibid.* Le Docteur Lyson a guéri des fièvres avec le — , 338.

CAMPBRE. Recommandé pour éviter & arrêter la salivation , 291. Entre dans l'*Eau caustique* de M. Plenck , 328.

CANCER des testicules , dans quel cas , il ne faut pas l'extirper , 107.

CANCÉREUX. Les ulcères de la matrice & du vagin ne
le

le sont pas toujours , 160. Les ulcères vraiment — ne sont guérissables que par l'extirpation , 162. Les bubons deviennent quelquefois — , 200. La ciguë alors ne les guérit pas , 206.

CAOUTCHOUK. *Voyez* RÉSINE ÉLASTIQUE.

CARDINALE. *Voyez* LOBELIA.

CARNOSITÉS. 116 ; 118 ; 133 ; 136.

CATAPLASMES. Sont inutiles sur la tumeur vénérienne des testicules , 101. Il vaut mieux les appliquer à la verge , 104. Cas où il faut en appliquer au testicule même , 105. Utiles dans le phymosis , 167. Recommandés pour résoudre les bubons , 191. Ne servent à rien pour les bubons sympathiques , 193. Utiles dans la première espèce de bubons idiopathiques , 195 ; & pour aider la suppuration des bubons , 200 ; 201.

CAUSTIQUE. Couvert , introduit dans l'uretre , 136. Les — appliqués aux ulcères vénériens , produisent de mauvais effets , 159. Appliqués aux bubons , ont quelquefois des suites fâcheuses , 199 & *suiv.* Un petit — laissé peu de tems produit de meilleurs effets , 200. Inutile ou nuisible contre les excroissances vénériennes , 327.

CAUTERE. Au col , dans le ptyalisme invétéré , 294.

CEANOTHUS AMERICANUS. Les Américains s'en servent pour guérir les ulcères vénériens , 310.

CELSE. Certaines maladies dont il fait mention étoient peut-être de nature vénérienne , 8.

CÉRUSE. Entre dans l'eau caustique de M. Plenck , 328.

CHANCRES. *Voyez* ULCÈRES VÉNÉRIENS.

CHARLATANS. Ont tous quelque secret pour les maladies vénériennes , 17. Guérissent en peu de jours certaines gonorrhées , 56 ; par quelle raison ? *ibid.*

354 TABLE ALPHABÉTIQUE

Diffipent en peu de tems certains bubons, 180; par quelle raison? *ibid.* Donnent à tous les malades vénériens le même remede, 301. Annoncent la guérison dès que les symptomes ont disparu, 302.

CHAUDE-PISSE. *Voyez* GONORRHÉE.

CHAUX DE PLOMB. En injection, 74.

CHEVAUX entiers. Sont sujets à un écoulement par l'uretre, 48.

CHIENS. Sont sujets à un écoulement par l'uretre, 48.

CHIRURGIENS. Peuvent recevoir la contagion vénérienne par les mains, 15; 139. L'introduction de la sonde dépend souvent de leur dextérité, 121; Pourquoi les uns paroissent mieux y réussir que les autres, 122.

CIGUE. A grande dose est utile dans le squirre de la prostate, 90; 114. Dans le squirre des testicules, 105. Vantée pour la résolution des bubons, 192. Est utile dans le *tétanos*, 332; dans la carie des os, 334; Dans des cas non vénériens, 342.

COMMOTION ÉLECTRIQUE. Reçue à travers l'uretre a guéri des gonorrhées habituelles, 82.

CONIUM. *Voy.* CIGUE.

COPULATION. A guéri quelquefois des gonorrhées habituelles, 81; mais on ne peut la prescrire dans ce cas, *ibid.* par quelles raisons, 82.

CORDE DE BOYAU. Introduite dans l'uretre, 123, 134.

CROUTE COUENNEUSE. Caractérise les ulcères vénériens, 151, 319.

CUIVRE JAUNE. *Voy.* LAITON.

CULLEN (*le Docteur*). Ses observations sur la guérison des écoulemens habituels, 81. Sur les ophthalmies vénériennes, 318.

D.

DAPHNE. *Voy.* LAURÉOLE.

DECOCTUM LUSITANICUM. Vanté pour la guérison de la vérole, 311. Sa formule, *ibid.* est utile pour les affections vénériennes de la peau, 326. Pour les maladies vénériennes que le mercure ne peut guérir, 343.

DENT. Empruntée d'une femme saine en apparence ; produit d'affreux symptômes véroliques & la mort, 16.

DOUCE-AMERE. Vantée pour le traitement des maladies vénériennes, 310 ; 326.

DOVER (*la poudre de*). Est utile dans les rhumatismes, 332.

E.

EAU DE CHAUX. Prend une couleur noire avec le sublimé corrosif quand il contient de l'arsenic, 274. Forme un précipité orangé avec le même, lorsqu'il est pur, *ibid.* Mêlée avec le calomel prend une couleur noire, 282.

EAU FROIDE. Sert à réduire les paraphymosis, 170. A la glace, peut servir dans les mêmes cas, *ibid.* On peut en jeter sur la tête dans les cas de ptyalisme opiniâtre, 294.

EAU VITRIOLIQUE CAMPHRÉE. En topique, 158 ; en injection, 203.

ECOULEMENS. *Voy.* GONORRÉE.

ELIXIR ACIDE de vitriol. Est le correctif du baume de copahu, 84.

EMPIRIQUES. *Voyez* CHARLATANS.

356 TABLE ALPHABÉTIQUE

EMPLATRE COMMUN *cum gummi*, 201.

EMPLATRE AGGLUTINATIF, 203.

EMULSION d'amandes. Est utile dans les gonorrhées virulentes, 60; dans la tumeur des testicules, 103.

ENFANS NOUVEAUX NÉS. Ne sont infectés que dans leur passage par le vagin, 13.

EPIDERME. Les parties qui n'en sont pas couvertes sont les plus sujettes aux ulcères vénériens, 138. Ceux qui naissent aux parties qui en sont couvertes sont plus rebelles, 139. Par quelles raisons, 140; 142.

EPIDIDYME. Est la partie affectée dans la tumeur vénérienne du testicule, 96. Est très-dur dans le squirre des testicules, 105.

ERECTIONS DOULOUREUSES. Moyens de les appaiser & de les prévenir, 61.

ETHER VITRIOLIQUE. Entre dans le syrop de Bellet, 269. Combiné avec le fer, fournit un bon remède tonique, 342.

EXCROISSANCES VÉNÉRIENNES, 326 & *suiv.*

EXOSTOSES. Sont très-douloureuses, 334. Moyens de les guérir, *ibid.*

F.

FABRE (M.). Ses observations sur les ulcères que le mercure ne guérit pas, 150, 340.

FER. Recommandé pour prévenir & arrêter la salivation, 291. Combiné avec l'éther vitriolique, comme tonique, 342.

FIEVRE. Accompagne quelquefois la tumeur vénérienne des testicules, 95. Mais ce n'est qu'un symptôme concomitant que le Médecin peut prévenir, 97; 101. L'opium la prévient dans ces cas-là, 103.

Nécessite la saignée dans certains cas de tumeur des testicules, 125; & de bubons, 195. ——— lente, accompagne certains bubons, 197. Les ——— nerveuse, putride, héctique, inflammatoire, contr'indiquent l'usage du mercure, 218. Le malade doit être exempt de ——— pour continuer l'usage des frictions mercurielles, 255. Est occasionnée par le sublimé corrosif, 270. ——— Nerveuse, est excitée par les préparations mercurielles acres, 300. ——— héctique, occasionnée par le virus vénérien, 336.

FIEVRES INTERMITTENTES. Ne sont radicalement guéries que par l'usage constant du quinquina, 257. Produites par le virus vénérien, ou combinées avec la vérole, 338. Celles que le Docteur Lyson a guéries avec le calomel étoient peut-être de ce genre, *ibid.*

FISTULE AU PÉRINÉE. Suite de l'ischurie vénérienne, 135; 136.

FISTULE LACRYMALE vénérienne, 164.

FISTULES VÉNÉRIENNES. Sont des ulcères pénétrants & calleux, 163. Il est facile d'en empêcher la formation, 205. Moyens de les guérir, 206.

FORTIFIANS. Sont indiqués dans les gonorrhées habituelles, 84. Utiles dans certains cas d'ulcères vénériens, 159; de bubons ulcérés, 203. Quelquefois nécessaires avant l'usage du mercure, 218. Le lait de femme est le meilleur des ———, 219; & c'est quelquefois le mercure même, 220. Sont nécessaires dans certaines maladies vénériennes dégénérées, 342.

FREIND (*le Docteur*). A soutenu la nécessité de la salivation, 285.

FRICTIONS MERCURIELLES. Sont utiles dans certaines gonorrhées, 65. Dans certains cas de tumeur des testicules,

358 TABLE ALPHABÉTIQUE

ticules, 105. La méthode des — est perfectionnée, 182. Faites sur les bubons mêmes, sont inutiles & même nuisibles, 185. Lieux où il faut les faire dans ces cas, *ibid.* & *suiv.* Pourquoi elles ne réussissent pas toujours, 187 & *suiv.* Leur succès étant limité à peu de jours, il faut les multiplier, 190; 191. Ne guérissent pas les bubons sympathiques, 193. Peuvent être très-nuisibles dans certains cas de bubons ulcérés, 201. La méthode des — est la plus efficace, la plus sûre, & la plus douce, 243. Combien il en faut pour produire quelque effet, *ibid.* Symptômes qu'elles occasionnent quelquefois, 244. Il faut raser la partie sur laquelle on les fait, 251. Précautions à prendre avant de les faire, 252. Manière d'y procéder, 253 & *suiv.* Combien il en faut pour opérer la guérison, 256; 259. Il ne faut pas les cesser dès que les symptômes ont disparu, 257. Il faut les pousser un peu vivement au commencement, 258; & les suspendre à propos pour éviter la salivation, *ibid.* Combien il en faut dans les cas graves, 259.

FROID. Est nuisible dans les gonorrhées, 62. Est capable de les supprimer, 67; 77. Occasionne la tumeur des testicules, 95. Il faut l'éviter pour la prévenir, 99; 100. Précaution à prendre en l'appliquant au paraphymosis, 170. Topiques — proposés pour résoudre les bubons, 191. Il faut l'éviter pendant le traitement mercuriel, 222 & *suiv.* Et pendant l'usage des frictions mercurielles, 256; & pour prévenir la salivation, 290. Elle s'établit plus aisément dans les climats froids, 291.

FUMIGATIONS MERCURIELLES. Sont utiles dans certaines gonorrhées, 65. Dans certains cas d'ulcères

vénériens, 158. Ne sont plus en usage pour guérir la vérole, 261. Mais sont souvent efficaces contre des maladies locales, *ibid.* Sont utiles contre les excroissances vénériennes, 328.

G.

GAYAC. Vanté dans l'Amérique méridionale pour la guérison de la vérole, 310.

GEUM RIVALE. *Voy.* BENOITE.

GLANDES. Réservoirs de la lymphe, 183 & *suiv.* Comment le virus vénérien y est porté, 184. Comment on peut y amener le mercure, *ibid.* & *suiv.* Il y en a deux séries aux aînes, 187. On explique par ce moyen pourquoi dans certains cas le mercure n'y atteint pas, 188.

GOMME ARABIQUE. Est utile dans les gonorrhées, 60. Sert à faire le mercure gommeux de Plenck, 262.

GONORRHÉE VÉNÉRIENNE. Temps auquel elle se manifeste, 4. Définition; étymologie, 25. Est mal nommée, *ibid.* Symptômes; causes, *ibid.* & *suiv.* La matière de la — n'est ni du pus ni de la semence, 26. C'est une excrétion surabondante de mucus, 27; 32. Ne provient pas toujours d'un ulcère dans l'urètre, *ibid.* Est occasionnée par un stimulus de force suffisante, appliqué dans l'urètre, 29. Son siège ordinaire est la fosse naviculaire, 30. Est produite par le même virus qui donne la vérole, 31. Discussion des objections contre cette doctrine, *ib.* & *suiv.* Est quelquefois suivie de la vérole, & dans quel cas, 32 & *suiv.* Peut être donnée par une personne qui n'a que des chancres, & *vice versa*, 35 & *suiv.* On peut la guérir sans mercure, 38; avec de l'eau simple, *ibid.*; mais non

360 TABLE ALPHABÉTIQUE

pas lorsqu'il y a exulcération dans l'uretre, 41. Peut dans ce cas donner la vérole, 42. Observations à ce sujet, 43 & *suiv.* Est connue dans les Isles de la mer du Sud, 45. Peut être produite par d'autres causes que par le virus vénérien, 47 & *suiv.* & est capable aussi dans ce cas de se propager, *ibid.*; mais le plus souvent ne se propage point, 49. Expérience faite par l'Auteur sur lui-même à ce sujet, 51. Elle lui procure trois ——— consécutives, 51 & *suiv.* Observation du Docteur Cœttinger sur le même sujet, 54. Nécessité de distinguer ces ———, 58. La virulence de la ——— n'est pas toujours proportionnée à la couleur de l'écoulement, *ibid.* Signes de sa guérison radicale, 59. Indications à remplir dans le traitement de la ———, 60. Remedes, *ibid.* & *suiv.* Régime, 62. Les sels neutres sont plus nuisibles qu'utiles dans ce cas, 63. Il en est de même des purgatifs, & il suffit de tenir le ventre libre, 63, 64; mais lorsqu'il y a ulcère il faut du mercure, 65. Conséquences fâcheuses de la suppression de la ———, *ibid.* & *suiv.* L'inoculation du virus vénérien peut être utile dans ce cas, 68. Moyens de rétablir la ——— supprimée, 101 & *suiv.* L'ischurie est un autre effet de la répercussion de la ———, 116 & *suiv.* Méthode curative, 131 & *suiv.* On la traite encore par la salivation en certains pays, 285. Sa répercussion produit la plus violente des ophthalmies, 313. Peut être arrêtée sans aucun des accidens ordinaires, 324. Abominable préjugé sur la ———, 347.

GONORRHÉE HABITUELLE. Ses causes, 69. Est de deux especes, *ibid.* & *suiv.* Son siege varie comme celui de la gonorrhée, 70. Prognostic, 73. Moyens curatifs, 74 & *suiv.* Elude quelquefois les efforts de

l'art , 84. Entretienue par des brides dans l'uretre , 85. Observation finguliere sur ce fujet , 86 & *fuiv.* Eft quelquefois incurable , 89.

GONORRHÉE PROPREMENT DITE. Eft produite ordinairement par la maffurbation , 91. Finit par le *tates dorfalis* , *ibid.*

GONORRHÉE TOMBÉE DANS LES BOURSES. Causes de cet accident , 95. *Voy.* TUMEUR DES TESTICULES.

H.

HENSLER (*le Docteur*). a découvert des manufcrits , qui prouvent l'ancienneté de la maladie vénérienne , 9.

HEWSON (M.). Ses planches anatomiques , 183.

HUNTER (*le Docteur Guillaume*). Ses obfervations fur les vaiffeaux lymphatiques , 183 & *fuiv.*

J.

JEANNE II (*la Reine*). Ses réglemens pour le lieu de débauche d'Avignon , 9.

INJECTIONS. Huileufes & mucilagineufes , font falutaires dans la gonorrhée , 39. Combinées avec les préparations mercurielles douces , font le meilleur remede dans ce cas , 40 ; 60. Acres , ou aftringentes , ou appliquées mal à propos , arrêtent l'écoulement de la gonorrhée , 65. Propres à guérir les écoulemens habituels , 74. Remarques fur l'ufage & fur l'application des — , 75 & *fuiv.* Doivent être employées tièdes dans les gonorrhées virulentes , 77. Danger d'en interrompre l'ufage , 78. D'huile de térébenthine ou d'infufion de noix de galles , dans la gonorrhée habituelle , 82. De teinture d'Ipécacuanha , *ibid.* Maniere de les adminiftrer chez les femmes , 161 & *fuiv.*

362 TABLE ALPHABÉTIQUE

IRRITANS. Réussissent dans certains cas d'écoulemens opiniâtres, 81. Suffisent à peine dans certains cas de bubons pour amener la suppuration, 195 ; 198.

ISCHURIE VÉNÉRIENNE. Ses causes, 115 & *suiv.* Prognostic, 119. Méthode curative, 120 & *suiv.* Lorsqu'elle est causée par la tuméfaction de quelque une des glandes de l'uretre, l'extirpation est le meilleur remede, 137.

JUNIPERUS. *Voyez* SABINE.

K.

KALM (*le Docteur*) a recommandé, d'après les Américains, l'usage de la *lobelia syphilitica*, 309.

KEYSER (*pillules de*), 242 ; leur effet, 265 ; leur composition, 266.

L.

LAIT. D'ânesse, est utile dans certains cas avant l'usage du mercure, 219 ; de femme, est le meilleur fortifiant pour les personnes épuisées, *ibid.* de vache, peut suppléer à celui d'ânesse, *ibid.*

LAITON en poudre. Guérit des ulceres vénériens rebelles, 158.

LANCETTE. Peut communiquer le virus vénérien, 15.

Van-Swieten en rapporte des exemples, 16.

LAUDANUM. *Voyez* OPIUM.

LAVEMENS. Utiles dans la tumeur des testicules, 102 ; 104 ; dans l'ischurie vénérienne, 124.

LAURÉOLE. Cas dans lesquels elle est recommandée, 105 ; 191 ; 310 ; 326 ; 334 ; 343.

LINIMENT VOLATIL. Appliqué au périnée, dans la rétention d'urine, 120 ; 131 ; appliqué au col dans le ptyalisme invétéré, 294.

LITHARGE. En injection, 75 ; 81.

LOBELIA SYPHILITICA. Les Américains s'en servent pour guérir la vérole, 308 ; 309. Il ne faut pas employer à sa place la *lobelia longiflora*, 309, *en note*. Mérite l'attention des Praticiens, 326.

LYMPHATIQUES (*vaisseaux*). Leur marche, 183 & *suiv.* portent le virus vénérien aux glandes, 184 ; y portent aussi le mercure, 185.

LYSON (*le Docteur*). A guéri des fièvres intermittentes avec le calomel, 338.

M.

MANDRAGORE, 105 ; 191 ; 201.

MASTIC (*essence de*). en lotion, 333. *Voy.* TEINTURE.

MERCURE (*le*). Est spécifique contre le virus vénérien, 3. On ignore comment il agit, *ibid.* On guérit beaucoup de gonorrhées sans ———, 38. Est inutile à l'intérieur quand le virus est hors du torrent de la circulation ; mais dans ce cas même son application topique peut avoir de bons effets, 40. Lorsqu'il y a ulcère, & par conséquent absorption du virus, son usage est indispensable, 41 ; 42 ; 154 ; 157. Les ulcères occasionnés par son usage sont très-rebelles, 143. La dissolution de ——— dans l'acide nitreux est utile en topique dans certains ulcères vénériens, 158 ; dans le phymosis, 167. La dissolution de ——— par la gomme arabique, est utile dans le même cas, *ibid.* Ne doit point être appliqué immédiatement sur les bubons, 185. Il y parvient par les frictions faites à l'endroit convenable, & y détruit ou corrige le virus, *ibid.* & *suiv.* Pourquoi il ne produit pas toujours cet effet, 188. Ne doit jamais être administré dans la

364 TABLE ALPHABÉTIQUE

période inflammatoire des affections vénériennes
 quelles qu'elles soient , 197. Ne doit pas être employé
 lorsqu'il y a des symptômes de scorbut , 198. Est utile
 dans les bubons ulcérés , 201 ; mais non pas dans
 tous , *ibid.* & *suiv.* Est un poison dans certains cas ,
 203. Est le spécifique de la vérole , comme le quin-
 quina l'est des fièvres intermittentes , 212. Hypo-
 these , sur sa maniere d'agir contre le virus vénérien ,
 213 & *suiv.* Maniere de l'administrer , 215. La disso-
 lution de — dans la gomme arabique , de Plenck ,
 convient à beaucoup d'estomacs , 217. Trituré avec
 le sucre candi , *ibid.* 240 ; 264. Il faut un degré de force
 suffisant pour supporter son usage , 218. Est le meilleur
 fortifiant en certains cas , 220. Diete & régime
 convenables pendant son usage , *ibid.* & *suiv.* Dans
 quel cas il faut en suspendre l'usage , 222 & *suiv.* Com-
 bien de tems il faut le continuer pour obtenir une
 guérison radicale , 223. Lorsqu'il affecte la bouche ,
 on est sûr de son effet , 224. La disparition des symp-
 tomes est un signe non équivoque de son action , 225 ;
 il faut en continuer l'usage quelque tems après cette
 disparition , *ibid.* 258. Quelquefois les malades le re-
 butent dès l'instant où il cesse d'être nécessaire , 225. Il
 faut avertir les malades de l'effet qu'il produit sur l'or ,
 228. Destiné aux frictions , doit être très-pur , 244. Est
 sujet à être sophistiqué , 245. Ses mines , *ibid.* & *suiv.* On
 y mêle du plomb & du bismuth , 247. Maniere de le
 purifier , *ibid.* & *suiv.* Caractères du — pur , 249. Ma-
 niere de le combiner avec la graisse de porc , 250.
 On peut l'unir aussi avec du beurre de cacao , ou le
 diviser par le mucilage de gomme arabique , 251.
 Moyens de favoriser son absorption & sa transmission

par les pores de la peau, 252. Raisons d'en suspendre l'usage, 258. Cas dans lesquels il faut le faire exhaller par la transpiration, 259. Semble quelquefois ne faire que passer dans le corps, 261. Fait toujours saliver, s'il n'est pas donné avec précaution, 265. Bouilli avec de l'eau simple, fournit un vermifuge, & a guéri un chien de la gale, 284. Danger d'insister sur son usage dans certains cas, 287; 341. Pourquoi il manque quelquefois de guérir les affections vénériennes, 295 & *suiv.* Cas dans lesquels il faut y ajouter d'autres remèdes, 303; sans quoi il n'agit point sur le virus, 304. La nature ne coopere pas toujours avec le ———, *ibid.* Il est des sujets qui pour en avoir trop pris ne peuvent plus le supporter, 305; il est des cas où c'est un poison, 306. On en a défendu l'usage dans quelques hôpitaux d'Italie, 309, *en note.* Administré mal-à-propos, cause des douleurs semblables aux douleurs vénériennes, 330. Il est des malades qui ne peuvent en supporter la moindre quantité; 331. On prétend en avoir trouvé en globules dans des cadavres, *ibid.* & *suiv.* Guérit des malades qui croyoient en avoir déjà trop pris, 341. Préjugés sur l'usage du ———, 346. *Voy.* ONGUENT MERCURIEL; MERCURIELLES (*préparations*).

MERCURE CALCINÉ, 140. Moyen de l'administrer, 265. *Voy.* PRÉCIPITÉ PER SE.

MERCURE DOUX. *Voy.* CALOMEL.

MERCURE GOMMEUX. De M. Plenck, 262 & *suiv.*

MERCURE TÉRÉBINTHINÉ, 263.

MERCURIELLES (*lotions*). Sont utiles dans certains cas d'ulcères, 159.

MERCURIELLES (*injections*). Sont utiles dans certains bubons ulcérés, 202.

366 TABLE ALPHABÉTIQUE

MERCURIELLES (*préparations*). Différens fujets supportent & exigent différentes ———, 216 & *suiv.* Tableau des ———, 229 & *suiv.* Examen des ———, 240 & *suiv.* ———, salines, causent des tranchées & autres symptômes, 264 & *suiv.* Cas où elles sont utiles, 334. ——— âcres, excitent plutôt la salivation que les autres, 291. Il ne faut pas combiner les ——— avec d'autres remèdes, 300; ni donner des ——— âcres, lorsqu'on peut guérir par des moyens plus doux, *ibid.* Il faut apporter la plus grande attention dans le choix des ———, 301; 303. La plupart des arcanes vantés comme ne contenant point de mercure ne sont que des ——— déguisées, 307; 312. Il ne faut pas donner toujours de nouvelles ———, lorsque les premières n'ont pas réussi, 341. *Voy.* MERCURE.

MERCURIELS (*les remèdes*). En injection, sont utiles dans la gonorrhée, 60. Sont nécessaires dans les gonorrhées habituelles, 83. En topique, pour les ulcères vénériens, 157, 158. Dans le phymosis, 167. *Voyez* FRICTIONS MERCURIELLES.

MONRO (*le Professeur Alexandre*). Ses observations sur les vaisseaux lymphatiques, 183 & *suiv.*

MUCUS. *Séparé* plus abondamment, & *altéré*, est la matière des gonorrhées virulentes, 27. Empêche l'exulcération de l'uretère, 32 & *suiv.* & même du prépuce & du gland, dans les cas de fausse gonorrhée, 34. Preuve de cette théorie chez les femmes, *ibid.* Est le moyen que la nature emploie pour délayer & évacuer le virus, 39.

N.

NOIX DE GALLES. En injection, 81.

NOIX VERTES (*extrait de*), 342.

O.

ÖTTINGER (*le Docteur*). Observe une gonorrhée produite par l'usage de l'huile d'olives altérée, 54.

OIGNON. Appliqué au périnée dans une suppression d'urine, 125. En cataplasme sur le bubon, en aide la suppuration, 201.

ONGUENT BLEU, 200 ; 317.

ONGUENT CITRIN, 268 ; 317 ; 318 ; 325.

ONGUENT DE ARTHANITA, 201.

ONGUENT MERCURIEL. Dans quels cas d'ulceres vénériens on peut l'appliquer, 158. Paroît guérir les bubons sympathiques, 180. Il est inutile de l'appliquer sur le bubon même, 185 ; si ce n'est comme maturatif, mêlé avec d'autres topiques, 201. Maniere ordinaire de le préparer, 249. Ses inconvéniens, *ibid.* Corrections, 250 & *suiv.* Maniere de l'appliquer, 253. Quantité qu'il faut en employer, *ibid.* 255 ; 259. Est utile pour l'ophthalmie vénérienne, 318. *Voy.* MERCURE.

ONGUENT SATURNIN, 326.

OPHTHALMIE VÉNÉRIENNE. qui suit la suppression de la gonorrhée, est la plus déplorable des affections vénériennes, 67 ; 313. Observations sur ce sujet, 313 & *suiv.* Produite par défaut de propreté est moins considérable, 317. Provenant de l'infection générale, est quelquefois rebelle, *ibid.* Moyens curatifs, 318.

OPIUM. Dans les injections, pour la guérison des gonorrhées, 60. Pris intérieurement avec le quinquina dans certains cas, 61. Ou dans des lavemens émolliens, *ibid.* Appaise les érections douloureuses, *ibid.* Son usage dans la tumeur vénérienne des testicules, 102

368 TABLE ALPHABÉTIQUE

& *suiv.* Dans l'ischurie vénérienne, 124; 125; 132; dans certains cas de bubons vénériens, 196. On peut le donner avec le précipité *per se*, 217. Dans quels cas il faut l'employer au lieu du mercure, 223. Est un bon correctif pour le précipité *per se*, 265. Est utile dans l'ophthalmie vénérienne, 318; dans les cas d'exostoses douloureuses, 334. L'Auteur ne croit pas qu'il suffise pour guérir les maladies vénériennes, *ibid.*

OR FULMINANT. Proposé pour arrêter la salivation, 293.

ORANGES. Sont salutaires dans le scorbut, 198.

OS. Quels sont les plus sujets à être affectés dans la vérole, 210. Demeurent quelquefois affectés après qu'elle est guérie, 226. Lorsqu'ils sont affectés, il faut jusqu'à soixante-dix frictions pour opérer une guérison radicale, 256. Le sublimé corrosif a été recommandé pour guérir les affections vénériennes des —, 270. Quelques Auteurs ont cru la salivation nécessaires dans ces mêmes cas, 286. On prétend avoir trouvé du mercure dans les —, 331; 332. Sont rarement affectés par le virus vénérien, 333. On ne peut guérir la carie aux —, avant d'avoir désinfecté la masse, *ibid.* Remedes recommandés dans ces cas, *ibid.* Sont le siege des plus affreuses douleurs, 334. Le virus vénérien peut empêcher la réunion de leurs fractures, 335.

P.

PARAPHYMOSIS. Est l'étranglement du gland, 169. Moyen d'y remédier, 170. Précaution à prendre dans les cas de gonorrhée, *ibid.* & dans les cas d'ulceres, 171.

PAULLINI (*le Docteur*). Décoction qu'il administre avec les plus grands succès, 343.

PELLICULE

DES MATIERES. 369

PELLICULE D'ŒUF. Appliquée au gland dans une sup-
pression d'urine, 125.

PHTHYSIE. Les sueurs trop abondantes la procurent,
259. Occasionnée par la salivation, 287. Suit quel-
quefois les affections vénériennes, 336. Guérie par
l'onguent mercuriel, 337. L'Auteur en a guéri plu-
sieurs au moyen d'un traitement mercuriel, 338.

PHYMOSIS. Est le rétrécissement du prépuce, 165. Rai-
sons pour & contre l'incision dans ce cas, 166. Moyen
de reconnoître s'il y a exulcération, 167. Méthode
curative, *ibid.* & *suiv.*

PIERRE A CAUTERE. } Voyez CAUSTIQUE.
PIERRE INFERNALE. }

PLENCK (M.). Son mercure gommeux, 262; 263. A
proposé une liqueur pour guérir les excroissances vé-
nériennes, 328. Et une lotion pour les caries véné-
riennes, 333.

PLUMMER (poudre ou pilules de). Leur composition;
283 & *suiv.* Raisons de ne pas s'y fier, *ibid.* & *suiv.*
300.

POULAIN. Voy. BUBON.

PRÉCIPITÉ PER SE. Mêlé avec l'opium, 217. Donne
des tranchées, 264; on les évite au moyen de l'opium
265. Voy. MERCURE CALCINÉ.

PRÉCIPITÉ ROUGE. Est utile pour les *fulceres* véné-
riens, 157. Mieux appelé *hydrargyrum nitratum ru-*
brum, 241. Son usage, 268; 328.

PRESSAVIN (le Docteur). Sa terre feuilletée mercu-
rielle, 241. En quoi elle consiste, 267.

PROSTATE (glande). Est quelquefois le siege des go-
norrhées habituelles, 89. Remedes indiqués dans ce
cas, 90. Inflammation de la ———, 113. Lorsqu'elle

370 TABLE ALPHABÉTIQUE

suppure, l'usage du mercure est nécessaire, *ibid.* Squirreuse, exige les mêmes remèdes que le squirre des testicules, 114; il faut tâcher d'en procurer la suppuration, *ibid.*

PTYALISME. Voy. SALIVATION.

PURGATIFS. Sont souvent nuisibles dans la gonorrhée virulente, 63; 64. Sont utiles dans certains cas de Bubons vénériens, 191; 195; 205. Nécessaires au commencement du traitement mercuriel, 215; & pour prévenir la salivation, 223; 290; & avant de commencer les frictions mercurielles, 252. Le mercure doux est utile comme ———, 275; 281. Sont utiles pour arrêter la salivation, 292. Et dans les cas d'ophthalmie vénérienne, 317.

Q.

QUINQUINA. Vaut souvent mieux que tous les antiphlogistiques. 61. Est efficace dans quelques gonorrhées habituelles, 84. A l'extérieur dans certains ulcères, 158. A l'intérieur dans d'autres, 159. Dans les ulcères de l'utérus, 161. Dans certains cas de bubons vénériens, 198. Dans les cas de complication avec le scorbut, *ibid.* Dans certains cas de bubons ulcérés, 203. Est utile pour disposer les malades foibles à l'usage du mercure, 219. Nécessité d'en continuer l'usage dans les fièvres intermittentes, 257. On peut l'employer dans le tems des frictions, 260. Est recommandé pour empêcher le mercure de se porter à la bouche, 291. Est utile pour arrêter la salivation, 293. Cas où il est à propos de l'associer au mercure, 303. Est ordonné dans les cas de carie aux os, 334; dans les maladies vénériennes dégénérées, 342.

R.

RANUNCULUS ABORTIVUS. Les Américains en mêlent la racine avec celle de *lobelia syphilitica*, 310.

RÉSINE ÉLASTIQUE. Les sondes qu'on en fait sont les seules qu'on puisse garder dans l'uretère, 127. Règles qu'il faut observer en les appliquant, 128 & *suiv.*

RÉTRECISSEMENS de l'uretère, 115 & *suiv.* Voy. ISCHURIE VÉNÉRIENNE.

S.

SABINE. Est utile dans les cas d'excroissances vénériennes, 328.

SAGES-FEMMES. Peuvent recevoir l'infection vénérienne par les mains, 15; 139.

SAIGNÉE. Sur-tout locale, est quelquefois utile dans les gonorrhées virulentes, 61. Est nécessaire dans certains cas d'ischurie vénérienne, 120; 125. Une ——— copieuse est plus utile que plusieurs petites, 121. Doit précéder l'introduction de la sonde, *ibid.* Est nécessaire dans certains cas de bubons, 191; 195; mais les ——— locales sont préférables, *ibid.* Est quelquefois nécessaire au commencement d'un traitement mercuriel, 216; & lorsqu'il paroît des signes d'inflammation, 223.

SALIVATION. Produite chez des personnes qui avoient fait des frictions mercurielles à d'autres, 254. Ce qu'il faut faire pour l'éviter, 259. L'air libre la prévient, 260. Inconvénient de la ———, 261. On a prétendu que les pilules de Keyser ne l'excitoient jamais, 265. Est encore en usage pour guérir la vérole, & même la gonorrhée, 285. Plusieurs Auteurs en

372 TABLE ALPHABÉTIQUE

ont soutenu la nécessité, *ibid.* L'expérience a montré le contraire, 286. Difficulté de l'arrêter ou de la modérer, *ibid.* Ses mauvais effets, 287. Raisons qu'on allègue en sa faveur, 288. Réponses, *ibid* & *suiv.* Méthode pour la prévenir, 290. Dans quels cas elle s'établit plus facilement, 291. Remèdes qu'on a proposés pour l'éviter, *ibid.* Moyens de la dissiper, 292 & *suiv.* On a recommandé l'or fulminant pour cet effet, 294. Autres moyens, *ibid.* N'évacue pas tout le virus vénérien, 298. Ne fait souvent qu'assoupir la maladie, *ibid.* Cas dans lesquels elle est prompte à s'établir, 305.

SALSEPAREILLE, 273, 311; 342, 343.

SANCHEZ (*le Docteur*). Apporte des raisons en faveur de l'ancienneté de la maladie vénérienne, 8.

SANGSUES. Sont préférables aux saignées générales dans certains cas de bubons, 195. Utiles dans les cas d'ophthalmie vénérienne, 317.

SANTAUX, 311.

SASSAFRAS, 310, 311. Huile essentielle de ———, vantée contre les caries vénériennes, 333.

SAULE BLANC. Son écorce en décoction pour un gargarisme, 293.

SCARIFICATIONS. Sont préférables aux saignées générales, dans certains cas de bubons, 195.

SCHEELE (M.). Son mercure doux préparé par précipitation, 240. Procédé qu'il a publié pour le préparer, 275 & *suiv.*

SCORBUT. Comment influe sur les bubons vénériens, 197. Contr'indique l'usage du mercure dans ces cas, *ibid.* Ainsi que dans les cas de vérole, 218.

SÉDATIFS. Sont utiles à l'extérieur dans certains cas de bubons vénériens, 196.

SELS NEUTRES. Etoient donnés mal-à-propos dans les gonorrhées virulentes, 64.

SERINGUE A INJECTIONS. Forme qu'elle doit avoir pour les hommes, 75. Instructions sur la maniere de s'en servir, *ibid.* & *suiv.* Comment doit être faite pour les femmes, 162.

SHELDON (M.). Ses planches du système lymphatique, 183, *en note.*

SINUS. Voy. FISTULES.

SIROP VÉGÉTAL. Voy. BELLET (*Sirop de*).

SOLANUM. Voy. DOUCE-AMERE.

SONDE ou ALGALIE. Son application est quelquefois impossible, 121. Règles pour en faciliter l'introduction, *ibid.* & *suiv.* Impossibilité de la garder dans l'uretre, 126; à moins qu'elle ne soit faite de résine élastique, 127.

SOUFRE. Proposé pour prévenir & arrêter la salivation, 291; 293.

SOUFRE D'ANTIMOINE. Mêlé avec le calomel, constitue la poudre de Plummer, 283. Objet qu'on s'est proposé dans cette combinaison, *ibid.* Recommandé pour prévenir & arrêter la salivation, 291; 293; 342.

SPASME. Empêche quelquefois l'introduction de la sonde, 122. Universel ou *tetanos*, causé par la suppression de la transpiration, 332.

SQUIRRE des testicules. Est une suite de la tumeur des testicules, 105. Moyens de le guérir, *ibid.* Voy. PROSTATE.

STIMULANS. Voy. IRRITANS.

374 TABLE ALPHABÉTIQUE

STOLL (le Docteur). Prouve que les gonorrhées existent souvent sans ulcère, 28, *en note*.

STRANGURIE VÉNÉRIENNE. Ses causes, 115 & *suiv.*
Voy. ISCHURIE.

SUBLIMÉ CORROSIF. En injection, 75 ; 81. En topique dans les ulcères vénériens, 158. En injection dans les ulcères de la matrice ou du vagin, 161. Dans le phymosis, 167. Sa composition, 240. A été mis en vogue par Van-Swieten, 269. Opinions opposées sur cette préparation, 270. Bons & mauvais effets qu'il produit, *ibid.* Doit sa réputation à la propriété qu'il a d'adoucir promptement les symptômes de la vérole, 271. D'où viennent quelquefois ses mauvais effets, *ibid.* Cas dans lesquels il est indiqué, 272. Contr'indications, *ibid.* Précautions à prendre en le donnant, 273. Est quelquefois sophistiqué avec l'arsenic, 274 ; 297. Manière de découvrir la fraude, 274. Mauvais effets du —, 300. Est utile en gargarisme, 324. Excellent dans les maladies cutanées, 325. Entre dans l'eau caustique de M. Plenck, 328. Dans une lotion du même, 333.

SUCRE DE SATURNE. Ajouté aux cataplasmes, 101.

SUPPURATION. Termine quelquefois la tumeur vénérienne des testicules, 107. Observation relative à cet accident, 108 & *suiv.* De la prostate, exige l'usage du mercure, 113. Il est par fois essentiel de la procurer, 114 ; 137. Préjugés sur la — des bubons vénériens, 181 ; 182. Est excitée par les frictions faites sur les bubons mêmes, 185. N'est pas un moyen d'évacuer le virus, 189. Est quelquefois inévitable, 194. Manière de la traiter, *ibid.* & *suiv.*

SURDITÉ. Est une des suites de la suppression des gonorrhées , 67 ; 318.

SUSPENSOIR. Est utile pour empêcher la tuméfaction des testicules , 62 ; 100 ; est nécessaire pour la cure de cet accident , 102.

SYPHILIS. Voy. VÉNÉRIENNE (*Maladie*).

T.

TEINTURE DE CANTHARIDES. A l'intérieur , 82.

TEINTURE DE GOMME LACQUE. Est utile dans le ptyalisme , 293.

TEINTURE D'IPÉCACUANHA. En injection , 82.

TEINTURE DE FER. Dans l'éther vitriolique , est un bon fortifiant , 220.

TEINTURE DE MASTIC. En injection dans les ulcères de la matrice & du vagin , 161 ; dans ceux de la gorge , 324.

TEINTURE DE MYRRHE. Est utile dans le ptyalisme , 293.

TÉRÉBENTHINE. En pilules , 83. Supplée au baume de Copahu , 84. Il n'en faut point dans l'onguent mercuriel , 249. On l'unit avec le mercure par la trituration , 263. Moyen de favoriser cette union , 264. Cette préparation est sujette à des inconvénients , *ibid.* On pourroit y substituer les baumes de Giléad ou de Canada , *ibid.* Prise à l'intérieur supprime une gonorrhée , 318.

TÉRÉBENTHINE (Huile de). En injection , 82. Favorise l'union du mercure avec la térébenthine , 264.

TETANOS. Voy. SPASME.

THEDEN (M.). Sondes qu'il a inventées , 127.

376 TABLE ALPHABÉTIQUE

TISANE DE LISBONNE. *Voy.* DECOCTUM LUSITANICUM.

TONIQUES. Sont nécessaires dans certains cas d'ulcères vénériens, 324. Employés avec succès contre l'impuissance vénérienne, 330. Utiles contre les douleurs vénériennes, 332. Dans certaines maladies vénériennes dégénérées, 342. *Voy.* FORTIFIANS.

TOPIQUES. Sont nécessaires dans les ulcères vénériens récents, 154 & *suiv.* Recommandés pour résoudre les bubons, 191; 195; 196. Pour les amener à suppuration, 198; 200 & *suiv.* N'ont que très-peu d'effet dans les cas de carie vénérienne, 333.

TUMEUR DES TESTICULES. Comment est produite, 66. Ses causes éloignées, 95. Cause prochaine, 96. Son vrai siège est l'épididyme, *ibid.* Est une affection sympathique, 96; 97. Toute irritation des orifices des canaux de la semence peut l'occasionner, 98. Donne naissance à une fistule à l'anus, *ibid. en note.* Régles à suivre pour l'éviter, 99 & *suiv.* Moyens curatifs, 101. Les symptômes ne se dissipent que lorsque l'écoulement a reparu, 103. Se termine quelquefois par le squirre des testicules, 105. Remèdes pour cet accident, *ibid.* & *suiv.* Provient rarement de l'infection de la masse générale, 107. Elle peut dans ce cas se terminer par la suppuration, *ibid.* Observation sur une — non vénérienne, 108 & *suiv.* On donne le turbith minéral comme vomitif dans les cas de —, 282.

TURBITH MINÉRAL. Est employé comme vomitif, 282. Guérit une affection vénérienne de la peau, 326.

V.

VAN-SWIETEN (*le Baron*). Rapporte des cas de vérole communiquée par une lancette, 16. Donnoit les yeux d'écrevisse avec succès dans les tumeurs squirreuses des testicules, 106. A recommandé le premier l'usage du sublimé corrosif, 269.

VAPEUR DE L'EAU. Est utile dans la tumeur des testicules, 102, 104. Dans l'ischurie vénérienne, 125; 131.

VÉNÉRIEN (*virus*). Effets qu'il produit dans le système animal, 2. Sa nature n'est pas mieux connue que celle du virus de la petite vérole, *ibid.* Exige un certain tems pour produire ses effets, *ibid.* Mais ce tems est indéterminé, 3 & *suiv.* Le mercure a la propriété de le détruire, 3. Attaque différentes parties dans différens sujets, 6. Il est des personnes qui paroissent privilégiées, *ibid.* D'autres semblent être plus sujettes à en être infectées, tout étant égal d'ailleurs, 7. Sa marche varie aussi dans les différens sujets, *ibid.* S'il peut être absorbé dans le système sans avoir produit aucun effet à l'extérieur, 10. S'il infecte quelqu'autre fluide que le mucus & la lymphe, 12. Voies par lesquelles il se communique, 14. Sa nature n'est point adoucie comme on le suppose, 19. Produit la gonorrhée tout comme il produit les autres symptomes vénériens, 31 & *suiv.* Produit des ulcères lorsque les parties ne sont pas défendues par le mucus, 33; & des écoulemens vénériens lorsqu'il y a assez de mucus, 34. Le mucus est le moyen dont la nature se sert pour le délayer & l'évacuer, 39. Ne produit pas la vérole tant qu'il est hors du torrent de

378 TABLE ALPHABÉTIQUE

la circulation, *ibid.* Est absorbé dans la masse lorsqu'il y a exulcération dans l'uretre, 42; ou lorsque l'uretre est blessé accidentellement, *ibid.* 75. N'est pas la cause de toutes les gonorrhées, 46 & *suiv.* Semble quitter son siege naturel dans certaines gonorrhées, 66. Accidens qu'il cause par ses divers déplacemens, *ibid.* & *suiv.* Inoculé par le moyen d'une bougie est efficace pour rétablir la gonorrhée, 68. Est absorbé dans certaines gonorrhées habituelles, 72. Moyen d'éviter qu'il ne soit déplacé par les injections, 77. Ne se porte pas aux testicules, 96 & *suiv.* Lorsqu'il se fixe au col de la vessie, cause la suppression d'urine, 117. Sa marche dans ces cas, *ibid.* Moyen pour le déloger, 131. Est absorbé pendant l'ischurie, 132. Produit des ulceres, principalement sur les parties dénuées de l'épiderme, 138; plus rarement sur les autres, & alors il produit des symptomes plus violens, 139; par quelle raison, 140. N'est pas la cause de tous les ulceres aux parties génitales, 142. Les topiques peuvent empêcher qu'il ne passe des ulceres dans la masse générale, 154 & *suiv.* Produit quelquefois la fistule lacrymale, 164. Produit les bubons, tant par sa présence dans les glandes, que par sympathie, 173. Est quelquefois porté immédiatement aux glandes, *ibid.* Mais le plus communément les bubons sont produits par l'absorption du — des ulceres, quel que soit leur siege, 175 & *suiv.* Certains croient qu'il s'évacue par la suppuration des bubons; mais c'est une erreur, 182. Est porté aux glandes par les vaisseaux lymphatiques, 184. Le mercure l'y pourfuit, 186 & *suiv.* Est absorbé lorsque les bubons suppurent, 189. Effets qu'il produit lorsqu'il est absorbé

dans la masse , 208 & *suiv.* Ses effets sont quelquefois cachés , 210. Il seroit utile d'avoir une pierre de touche pour reconnoître s'il en reste dans le corps , après un traitement mercuriel , 224. L'Auteur a fait des expériences sur ce sujet , *ibid.* Signes pour reconnoître si ses effets ont été corrigés par le mercure , 225. Ne suffisent pas pour nous assurer qu'il soit entièrement déraciné , *ibid.* Quoiqu'il soit déraciné, laisse quelquefois des effets permanens , 226. La cessation des symptomes n'est pas une preuve qu'il soit déraciné , 257. Élude l'action du mercure , lorsque celui-ci occasionne de grandes évacuations , 261 , 341. Peut demeurer long - tems caché dans le corps sans produire aucun effet sensible , 302 , 323. Cause quelquefois l'impuissance , 329. Douleurs attribuées mal-à-propos au ——— , 330. Lorsqu'il est détruit , le mercure est nuisible , 331. Affecte rarement les os , 333. On ne peut guérir les caries avant qu'il soit déraciné , *ibi* ; Empêche la réunion d'une fracture , 335. Produit quelquefois des maladies de poitrine , 336. Il est important de distinguer ses effets de ceux du mercure , 339. Préjugé sur l'impossibilité de le détruire , 345 & *suiv.*

VÉNÉRIENNE (*maladie*). Est produite par le virus vénérien reçu dans le système animal , 1. Prend différens noms dans ses différens degrés , 2. En quel tems a paru pour la première fois en Europe , 7 & *suiv.* Si elle est toujours précédée de symptomes extérieurs , 10. Si on peut la prendre en couchant simplement avec une personne infectée , 11. Si elle se communique au fœtus dans l'acte de la génération , 12 & *suiv.* Comment se communique , 14 & *suiv.* Est facile , & en même-tems difficile à guérir , 17. Étoit autrefois plus

380 TABLE ALPHABÉTIQUE

violente, 18. Par quelle raison, 19. Ses plus fâcheuses modifications sont inconnues à Londres, 20 ; 22. On pourroit l'adoucir, & peut-être même l'extirper, 24. Est quelquefois la suite de la gonorrhée, 42. Observation sur ce sujet, 43. Autre observation, 45. Existe quelquefois avec les gonorrhées habituelles, 74. On risque de la donner ou de la prendre dans les cas de gonorrhée habituelle, 82. Précautions à prendre pour l'éviter dans les cas d'ischurie vénérienne, 123. Les ulcères vénériens récents ne la supposent pas nécessairement, 154. Est préférable à la mortification de la verge, ou même à un bubon, 155. Il faut la guérir pour opérer la guérison des fistules vénériennes, 164. Les meilleurs préservatifs n'empêchent pas de la prendre, 175. Est produite par la suppuration des bubons, 190. Symptômes de la —, 208 & *suiv.* Est quelquefois masquée, 211. Quelquefois combinée avec d'autres maladies, *ibid.* Son remède spécifique est le mercure, *ibid.* Se guérit plus aisément dans les climats chauds, 226 & *suiv.* 311. Combien de frictions il faut pour la guérir, 256. N'est pas guérie dès que les symptômes ont cessé, 257. On ne la traite plus par les fumigations, 261. Les pilules de Keyser manquent quelquefois de la guérir, 265. Le sublimé corrosif la guérit quelquefois, 270. Il en mitige promptement les plus fâcheux symptômes, 271. Le calomel n'est pas un remède assuré contre la —, 274 ; quoiqu'il l'ait guérie quelquefois, 275. Le turbith minéral à petites doses guérit des — de la peau, 282. Les pilules de Plummer sont employées pour le traitement de la —, *ibid.* Raisons de s'en défier, 283. On la traite encore par la salivation, 285.

DES MATIERES. 381

L'Auteur regarde cette pratique comme plus nuisible qu'utile, 286. Les ulcères que la salivation occasionne sont quelquefois plus dangereux que la ~~_____~~ même, 287. Plus elle est ancienne, plus elle résiste au mercure, 302. Circonstances qui la rendent plus opiniâtre, 304; 305. On a employé d'autres remèdes que le mercure pour la guérir, 307. On a défendu d'employer du mercure pour la guérir dans certains Hôpitaux d'Italie, 309, *en note*. Le sublimé corrosif la guérit radicalement dans les climats chauds, 325. Laisse des verrues au visage, 329.

VENTOUSES. Appliquées au périnée sont utiles dans le squirre de la prostate, 90. Appliquées sur les glandes tuméfiées, 191.

VERD-DE-GRIS. En injection, 74. En topique, 158.

VERGE. Il faut y appliquer des cataplasmes émolliens dans la tumeur des testicules, 104.

VÉROLE. *Voy.* VÉNÉRIENNE (*maladie*).

VÉROLE (petite). Produit ses effets au bout d'un tems déterminé, 3. Certaines personnes s'y exposent sans la prendre, 6. Est communiquée par une lancette, 16. Les Kalmoucks exposent ceux qui en sont attaqués, 19.

VÉRUMONTANUM. Est le siège du virus, dans les cas de tumeur vénérienne des testicules, 100.

VÉSICATOIRES. Appliqués au périnée sont utiles dans le squirre de la prostate, 114. Sont utiles dans la retention d'urine, 120; dans le ptyalisme invétéré, 294; dans les cas d'ophtalmie vénérienne, 317.

VINAIGRE LITHARGIRÉ. En cataplasme, 167.

VIRUS. *Voy.* VÉNÉRIEN (*virus*).

382 TABLE ALPHABÉTIQUE

VIRUS GONORRHOIQUE. Est le même que celui de la vérole, 323.

VITRIOL BLANC. En injection, 74.

VITRIOL BLEU. En injection, 74. En topique, 158.

ULCERES VÉNÉRIENS. Se manifestent par fois au bout de douze heures, & quelquefois peu de minutes après le coït impur, 4. Et d'autres fois au bout de plusieurs jours, *ibid.* Attaquent surtout la gorge chez certaines personnes, 6. Précedent presque toujours l'infection générale, 10. Les malades en ignorent quelquefois l'existence, *ibid.* On n'en observe point sur les enfans à l'instant de leur naissance, 13. Produits aux narines, aux paupieres & aux levres par le défaut de propreté des mains, 15 ; 36. Dans la bouche, causé par une dent empruntée, produit de funestes effets, 16. Sont très-rarement causes de la gonorrhée, 27. Preuve qu'en a donné le Docteur Stoll, 28, *en note.* Leur formation est empêchée par le mucus dont certaines parties sont abreuvées, 32 & *s.* Les femmes en ont rarement dans le vagin, & souvent aux grandes levres & aux nymphes, 34. Peuvent être communiqués par la simple gonorrhée, & ne procurer aussi que cette maladie, 35 & *suiv.* Donnent lieu à l'absorption du virus, 42. Sont quelquefois l'effet des purgatifs, 64. Produits par le virus vénérien déplacé, 66 ; 117. Sont quelquefois la cause des gonorrhées habituelles, 69 ; 71 ; 85. Moyens de reconnoître leur existence, 72. Sont quelquefois produits par une cause mécanique, 73. Nécessité de connoître leur siege, *ibid.* Infectent communément la masse des humeurs, 74. Forment des carnosités, des fungus, des bandes dans l'uretre,

DES MATIERES. 383

118. Sont produits par infection , tant primitive que secondaire , 138. Parties qu'ils affectent le plus communément , *ibid.* & *suiv.* Sont ou *locaux* , ou *universels* , 141. Il en est qui ne sont pas vénériens , 142. Importance de cette distinction , *ibid.* & *suiv.* Que le mercure ne guérit point , 143. Observations sur ce sujet , 144. & *suiv.* Distinctions essentielles à faire entre les ——— , 150 & *suiv.* 319. Méthode curative , 153 & *suiv.* Ne sont pas des symptômes de vérole lorsqu'ils sont récents , 154. Sont pris quelquefois mal-à-propos pour cancéreux , 160 & *suiv.* Ceux qui le sont n'admettent pas de guérison radicale , 162. Rendent quelquefois une matiere très-corrosive , 164. Caussent quelquefois le phymosis , 165. Moyens de s'en assurer , 167. Sont communément la cause prochaine des bubons , 175 & *suiv.* Observations sur ce sujet , 176 & *suiv.* Lorsqu'ils commencent à se guérir pendant l'usage du mercure , on est sûr de son effet , 225. On les saupoudre de précipité rouge , 268. La salivation cause des ——— douloureux dans la bouche , dans la gorge , &c. 287. Ceux-là ne sont pas vénériens , & résistent à l'usage du mercure , *ibid.* Comment les Américains guérissent les ——— , 310. Difficulté d'appercevoir les ——— de la gorge , 319. Observations à ce sujet , 310 & *suiv.* Exigent quelquefois des remedes topiques , 324.

UNGUENTUM. *Voy.* ONGUENT.

VOMITIFS. Sont quelquefois utiles dans l'ischurie & dans la tumeur des testicules , 132. Proposés pour procurer la résolution des bubons , 191. Un ——— mercuriel est préféré par quelques-uns dans les cas de tumeur des testicules , 282.

384 TABLE ALPHABÉTIQUE, &c.

W.

WARD (*le Docteur*). Ses gouttes blanches , 241 ;
268.

WERLHOF (*le Docteur*). A observé des fievres intermit-
tentes vénériennes , 338.

Y.

YEUX D'ÉCREVISSES. Van-Swieten les donnoit avec
succès dans le squirre des testicules , 106.

Fin de la Table alphabétique.







